1 艾滋病快速检测的**特点**

艾滋病快速检测仍然是通过检查血液中有无艾滋病抗体来初步判断你是否有可能被艾滋病病毒感染。其操作**简便、准确**，相对于艾滋病的其它检测方法来说所需要**时间更短**，从采血检测开始到出结果仅需**15分钟**的时间。

2 艾滋病快速检测结果**可靠**吗？

我们采取的快速检测试剂是：**雅培快速检测试纸（Determine），**是医学界公认的、世界上最为可靠的艾滋病抗体检测试剂之一，排除窗口期问题，它可以在最短时间内让受检者知道自己是否感染上艾滋病病毒。



3 什么是**窗口期**？

从人体被艾滋病病毒感染到血液中产生足够的，能够被检测出艾滋病抗体的这段时间称之为窗口期 。绝大多数人的窗口期时间为**2-8周**，最长为3个月。

4 快速检测结果为**阴性**（一）时意味着什么？

艾滋病快速检测结果为阴性，表明受检者有可能没有被艾滋病病毒感染。但如果受检者是处在窗口期内，其检测结果仍然不能判断是否感染上艾滋病病毒，需要过了窗口期再来检测。

5 快速检测结果为**阳性**（+）时意味着什么？

艾滋病快速检测结果为阳性，意味四种可能：

- 感染上艾滋病病毒；
- 近一个月内打过流感疫苗或接触过类似的物质；
- 身体本身带有肝炎、严重的肾炎、类风湿性关节炎、系统性红癍狼疮等慢性疾病；
- 身体里含有特殊物质。

以上四种情况均有可能使快速检测结果呈现阳性反应，因此这是一个不确定的结果。在这种情况下，医生会征求受检者的意见，将其血液送到专门的实验室进行艾滋病抗体**确认检测**。

通过确认检测，就能知道是不是感染 上艾滋病病毒。

6 确认检测结果**报告书**的重要性

接受艾滋病病毒抗体确认检测后，如果其结果是阳性，实验室会给受检者提供一份正式的书面检测报告，如果受检者确实被艾滋病病毒感染，这份报告**非常重要**：

- 当你需要接受国家免费抗病毒治疗和检查时，你需要向医疗机构出示这份报告书;
- 艾滋病抗体确认检测报告为全国通用。



7 艾滋病相关知识

艾滋病是一种传染病，通过性、血液、母婴三条途径进行传播，日常生活接触不会造成艾滋病病毒的传播。

艾滋病同时也是一种慢性病，如糖尿病、高血压一样，在适合的时候需长期用药治疗。

感染早期，绝大多数人是没有典型的症状和体征的。

国家对艾滋病病毒感染者和病人提供免费的抗病毒治疗药物。

通过治疗，艾滋病感染者一般可以存活30-40年，甚至更长的时间。

感染者在治疗期间需要定期的到定点医疗机构进行体检和领取抗病毒药物回家服用，中间不影响学习、工作和生活。

艾滋病病毒进入人体后会造成抵抗力下降，从而较容易发生一些机会性感染，机会性感染的治疗是需要自费的。因此，早早知道自己是否感染上艾滋病病毒、适时服用抗病毒药物就可以早一些预防机会性感染，从而减少**经济损失**、**延长生命**、提高**生活质量**。

VCT：艾滋病自愿咨询检测
AIDS：艾滋病（获得性免疫缺陷综合征）
HIV：艾滋病病毒（人类免疫缺陷病毒）

确认是否感染上艾滋病病毒，请到当地疾病预防控制中心接受**免费**、**保密**、**安全**的VCT服务或联系：

昆明市疾病预防控制中心	0871-2242074
昆明市红十字会百合妇女活动中心	0871-5303755
昆明春雨同心活动中心	0871-2970905
个旧市疾病预防控制中心	0873-2126779
个旧市红十字会妇女活动中心	0873-8895222
绿园活动中心	0873-3116976
鹿寨县疾病预防控制中心	0772-6811140
鹿寨县妇女活动中心	0772-6829785

HIV

本材料开发由美国国际发展署TASCIII,Task Order 2 项目支持
家庭健康国际（FHI）制作
项目编号：GHS-1-00-07-00007-00

如需索取，请与美国家庭健康国际（FHI）昆明办公室联系。
电话：86.871.3632.660
传真：86.871.3642.267 转 208
地址：云南省昆明市东寺街158号云南省疾病预防控制中心1号办公楼2楼
邮编：650034

USAID FROM THE AMERICAN PEOPLE

安全、准确、便捷