AIDSTAR-Two – Honduras CAP Report 2010

Published November 2012

5 key words:
1. Behavior Change
2. Transtheoretical Model for Behavior Change
3. NGO interventions
4. MARPS
5. Evaluation

This report was made possible through support provided by the US Agency for International Development, under the terms of Contract Number GHH-1-00-07-00068-01 The opinions expressed herein are those of the author(s) and do not necessarily reflect the views of the US Agency for International Development.

AIDSTAR-Two
Management Sciences for Health
4301 N. Fairfax Drive
Arlington, VA 22203
Telephone: (703) 524-6575
www.msh.org

USAID FROM THE AMERICAN PEOPLE

AIDS Support and Technical Assistance

AIDSTAR-Two
fortaleciendo la capacidad para lograr mayor impacto

Investigación sobre Conocimientos, Actitudes y Prácticas (CAP) relacionadas a la prevención de VIH/SIDA en las poblaciones Garífunas, mujeres trabajadoras sexuales (MTS) y hombres que tienen sexo con otros hombres (HSH) intervenidos por los proyectos de prevención de VIH/ITS ejecutados por Organizaciones No Gubernamentales

AIDSTAR-Two Honduras

Fecha: Diciembre 30, 2010

Esta publicación es posible gracias al generoso apoyo de El Programa Presidencial de Emergencia de Asistencia para el SIDA (PEPFAR, siglas en inglés) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID en siglas en inglés) bajo el contrato No. GHH-I-00-0700068-00. El contenido es la responsabilidad del proyecto AIDSTAR-Two y no reflejan necesariamente las opiniones de USAID o del Gobierno de los Estados Unidos.

Acrónimos

AED	Academy for Educational Development
AHMF	Asociación Hondureña Mujer y Familia
AS-Two	AIDSTAR-Two (AIDS Support and Technical Assistance Resources)
CAP	Conocimientos, Actitudes y Prácticas
CASM	Comisión de Acción Social Menonita
CGSSI	Comunidad Gay Sampedrana para la Salud Integral
COCSIDA	Centro de Orientación y Capacitación en SIDA
COMCAVI	Comunicando Cambio para la Vida
ECOSALUD Atlántida	Ecología y Salud localizado en el Departamento de Atlántida, Honduras
ECVC	Estudio Centroamericano de Vigilancia del Comportamiento
HSH	Hombres que tiene sexo con otros hombres
ITS	Infecciones de transmisión sexual
MSH	Management Sciences for Health
MTS	Mujeres trabajadoras sexuales
NS	No significativo
PEMAR	Poblaciones en más alto riesgo
PRODIM	Programa para el Desarrollo de la Infancia y la Mujer
PVVIH	Personas viviendo con VIH
Sida	Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida
VIH	Virus de Inmunodeficiencia Humana
USAID	Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
UNAH	Universidad Nacional Autónoma de Honduras
INE	Instituto Nacional de Estadísticas

Indice

Introducción 4

Metodología 5

Objetivo de la Investigación 6

Garífunas 10–15 Años de Edad 7

Garífunas 16–24 Años de Edad 11

Garífunas Adultos 15

Hombres que tienen sexo con otros Hombres (HSH) 19

Mujeres Parejas de Hombres Bisexuales 23

Mujeres Trabajadoras Sexuales (MTS) 25

Hombres Parejas de Mujeres Trabajadoras Sexuales 29

Concluisones y Recomendaciones 38

Anexo Comparativo 2009 y 2010 37

Introducción

AIDSTAR-Two (AS-Two) es un proyecto liderado por Management Sciences for Health (MSH), con el financiamiento de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) en Honduras, bajo el contrato No. GHH-I-00-0700068-00.

AS-Two inició sus actividades en Honduras en el 2009, siendo su objetivo principal contribuir a la reducción de la incidencia del VIH/Sida entre las poblaciones en más alto riesgo (PEMAR), incluyendo a hombres que tiene sexo con otros hombres (HSH), mujeres trabajadoras sexuales (MTS) y la comunidad Garífuna, en los departamentos de Francisco Morazán, Comayagua, Cortés, Atlántida y Colón.

Los resultados intermedios previstos para alcanzar este objetivo son:

1) Desarrollar las capacidades de las organizaciones locales para la entrega de servicios de calidad de prevención y cuidado de VIH/Sida;
2) Mejorar el ambiente para facilitar el acceso a servicios de prevención y cuidado de VIH/Sida; y
3) Establecer la infraestructura necesaria de manejo de fondos, para ofrecer servicios prevención y cuidado de VIH/Sida a través de organizaciones locales.

Las intervenciones realizadas por las ONGs que AS-Two apoya en Honduras cuentan con una línea base con la cual comparar el efecto e impacto de las mismas en las poblaciones intervenidas. Como línea base para esta investigación se utilizaron los resultados de las encuestas CAP 2009, realizadas por el proyecto Comunicando Vida y Comunicando Cambio para la Vida (COMCAVI/AED), el cual intervino las mismas organizaciones, así como poblaciones y áreas geográficas similares a las de AS-Two.

Metodología

Diseño del Estudio

El presente estudio es descriptivo y transversal realizado en el período de Septiembre y Octubre 2010, en los departamentos de Francisco Morazán, Comayagua, Cortés, Atlántida y Colón.

Las ONGs apoyadas por AIDSTAR-Two que desarrollaron los proyectos evaluados con este estudio son:

A. En Población Garífuna :

- Ecología y Salud (ECOSALUD)
- Comisión de Acción Social Menonita (CASM)

B. En Población de Hombres que tienen sexo con otros Hombres (HSH)

- Comunidad Gay Sampedrana para la Salud Integral (CGSSI)

C. En Población de Mujeres Trabajadoras sexuales (MTS):

- Asociación Hondureña Mujer y Familia (AHMF).
- Centro de Orientación y Capacitación en SIDA (COCSIDA)
- Programa para el Desarrollo de la Infancia y la Mujer (PRODIM)

Muestra

Para esta investigación se encuestó a toda la población directamente intervenida por los proyectos, un total de 1,752 personas. Además, se tomó una muestra no probabilística de conveniencia de 1,118 personas en la población indirectamente intervenida. Para calcular la muestra de la población indirecta se utilizó la subrutina Stat Calc de Epi Info. En total se aplicaron 2,870 encuestas.

Total de Encuestas por Población Meta CAP 2010

Población	No. de Personas Encuestadas, 2010
Población Garífuna (10-15 años de edad)	359
Población Garífuna (16-24 años de edad)	504
Garífunas (25 años o más)	730
HSH (18 años o más)	442
Mujeres parejas estables de hombres con prácticas bisexuales (18 años o más)	50
MTS (18 años o más)	697
Maridos de MTS (18 años o más)	88
Total Encuestas Aplicadas	**2,870**

Recolección de Datos

La recolección de datos se realizó por medio de encuestas individuales, utilizando cuestionarios con preguntas cerradas y de respuestas espontáneas, diseñados para cada población estudiada.

La información fue recolectada por personal externo capacitado y contratado por las ONGs. Cada ONG era responsable de contratar y supervisar el equipo de encuestadores seleccionados y capacitados.

Para la realización de este estudio, AS-Two contó con el trabajo de un consultor externo encargado de la capacitación de los encuestadores, la elaboración y limpieza de las bases de datos, el análisis de los datos y el desarrollo del informe final.

Consideraciones Éticas

El protocolo de investigación contó con la aprobación del Comité de Investigación Biomédica de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), así como de la Secretaría de Salud y de USAID/Honduras.

Objetivo de la Investigación

El objetivo principal de esta investigación es evaluar el cambio de los conocimientos, actitudes y prácticas, en relación a la prevención del VIH/Sida/ITS en HSH, MTS y garífunas intervenidos directa e indirectamente, con estrategias para el cambio de comportamiento implementadas por los siete proyectos de las ONGs que AS-Two/USAID/Honduras ha apoyado, durante el período de octubre 2009 a octubre 2010.

1. Garífunas 10–15 Años de Edad

A. Datos Socio-demográficos

En la encuesta participaron 361 garífunas: 161 intervenidos por CASM en las comunidades de Bajamar, Travesía, Chifia y El Estero; y 200 intervenidos por ECOSALUD (88 provenientes de las comunidades de Corozal, Sambo Creek, Nueva Armenia y Río Esteban, por ECOSALUD Atlántida, y 112 de las comunidades de Ciriboya, Cusuna, Iriona, Punta Piedra y San José de la Punta, ECOSALUD Colón).

Hubo un predominio del sexo femenino con un 61%. El promedio de edad fue de 12.7 años, con una mediana de 13 y una moda de 12 años. El 99.7% de los encuestados sabía leer y escribir.

B. Conocimientos sobre el VIH/ITS

- Un 65% conocían tres o más formas de transmisión del VIH, siendo las más frecuentes: tener relaciones sexuales (95%), de una mujer embarazada a su hijo (62%), compartiendo agujas o jeringas usadas, o tatuajes, (37%), y por transfusiones de sangre (37%).
- 90% no mencionó ninguna forma errónea de transmisión del VIH.
- 70% conocían tres o más formas de prevención del VIH, siendo las más frecuentes: no tener relaciones sexuales (100%), usar protección (70%), y ser fiel (41%).
- 40% reconoce tres o más señales de una ITS, siendo mencionadas más frecuentemente: flujo/secreción de pus por la vagina/pene (52%), ronchas/granos/llagas en genitales (44%), y úlceras, en genitales (24%). Además, mencionaron dolor/ardor al orinar (59%) y mal olor en los genitales (31%).
- 60% mencionaron dos o más derechos que tienen las personas viviendo con VIH (PVVIH), siendo los más frecuentes: recibir atención médica (71%), recibir educación (55%) y tener un trabajo (40%).
- Sólo un 12% no mencionaron algún derecho que tienen las PVVIH. 90% de los participantes manifestaron que cuidarían a un familiar si se enfermara de sida;
- 89% afirmaron que no se puede decir a simple vista si una persona tiene el VIH.

C. Actitudes y Prácticas

De los que han tenido relaciones sexuales.

- De los 359 entrevistados, 11% (38) afirmaron haber tenido relaciones sexuales alguna vez en la vida.

- En cuanto a la edad en que tuvieron su primera relación sexual, 55% la tuvo entre 12 y 13 años, 34% entre los 14 y 15 y 11% a los 9-10 años de edad.

- 58% se consideraban en riesgo de adquirir el VIH.

- 55% reportó haber tenido su última relación sexual en un lapso mayor de 7 meses, 21% de 2-6 meses y 26% un mes o menos.

- 50% utilizó protección cuando tuvo relaciones sexuales.

De los que <u>no</u> han tenido relaciones sexuales (321)

- 90% no se consideraba en riesgo.

- 7% afirmaron que si le proponían tener relaciones sexuales aceptaría.

- Entre las razones más frecuentes que tendrían para tener relaciones sexuales se mencionan: estar enamorado (73%), porque le gusta (54%), por curiosidad (15%), y porque si no lo hace le deja su novio/novia (8%). No hubo diferencias significativas por sexo.

- Las razones que tendrían para no tener relaciones sexuales fueron, en orden descendente: los consejos de los padres (55%), querer estudiar (52%), temor de infectarse de VIH u otras ITS (49%), por la información recibida (33%), no querer tener relaciones sexuales (27%), consejos de los maestros (24%), para no salir embarazada (19%), conversaciones con los amigos (8%) y principios religiosos (7%). Solo se encontró una diferencia significativa por sexo en el no querer salir embarazada (28% en mujeres y 3% en hombres, $p < 0.05$).

Etapas del Modelo Transteórico para el Cambio de Comportamiento en Garífunas 10-15 Años de Edad

Comportamientos de los garífunas 10-15 años de edad que SÍ han tenido relaciones sexuales

Según el modelo transteórico para cambio de comportamiento, la población Garífuna 10-15 años de edad que ha tenido relaciones sexuales ***se encuentra en la etapa de Pre-contemplación***



Esta grafica muestra que la población Graifuna de 10-15 años se encuentra en la etapa de pre contemplacion , recalcando que los resultados obtenidos en las tres Ongs son similares, lo que nos indica que hay que analizar las intervenciones y curriculas que se utilizan sea las indicada para esta población ya que el segundo período en que se interviene la zona de cortes y Atlántida, pues Colon era nueva en trabajarse con esta población y no hay diferencias significativos en los resultados obtenidos

Comportamientos de los garífunas 10-15 años de edad que <u>NO</u> han tenido relaciones sexuales

Según el modelo transteórico para cambio de comportamiento la población Garífuna 10-15 años de edad que **<u>NO</u>** ha tenido relaciones sexuales ***se encuentra en la etapa de Pre contemplación***



1. *Garífunas 16–24 Años de Edad*

A. Datos Socio-demográficos

En la encuesta participaron 505 garífunas: 167 intervenidos por CASM y 338 por ECOSALUD. Las comunidades participantes de CASM son Bajamar, Chifia, El Estero y Travesía. Las comunidades participantes de ECOSALUD Atlántida (227) son Corozal, Sambo Creek, Nueva Armenia y Río Esteban y las comunidades participantes de ECOSALUD Colón (111) son Ciriboya, Cusuna, Iriona, Punta Piedra y San José de la Punta.

Hubo un predominio del sexo femenino en los participantes (56%). El promedio de edad y la mediana fue de 19 años y la moda fue de 16 años. El 99% de los encuestados sabía leer y escribir. En relación a su estado civil: 76% eran solteros, 19% estaban en unión libre, 4% eran casados y 1% estaban separados.

B. Conocimientos sobre el VIH/ITS

- 77% de los encuestados conocían tres o más formas de transmisión del VIH, siendo las más frecuentes: tener relaciones sexuales (98%), de una mujer embarazada a su hijo (70%), transfusiones de sangre (62%), y por compartir agujas o jeringas usadas (61%).
- 96% no mencionó ninguna forma incorrecta de transmisión.
- 71% conocían tres o más formas de prevención del VIH, siendo las más frecuentes: usar condón (97%), ser fiel (62%), no tener relaciones sexuales (55%), tener menos parejas (20%), evitar utilizar jeringas o agujas usadas o tatuarse (15%), y no tener relaciones sexuales aunque ya se haya tenido (14%). No se observaron diferencias significativas al comparar conocimientos entre hombres y mujeres.
- 53% reconoce tres o más señales de una ITS, siendo las más frecuentemente mencionadas: flujo/secreción de pus por la vagina/pene (73%), ronchas/granos/llagas en genitales (61%), secas o golondrinas/ganglios inflamados (25%), verrugas/condilomas caballitos (9%). Además, mencionaron picazón en los genitales (47%) y dolor/ardor al orinar (64%). No hubo diferencias por sexo.
- 96% de los participantes manifestaron que cuidarían a un familiar si se enfermara de sida.
- 95% afirmaron que no se puede decir a simple vista si una persona tiene el VIH.

C. Actitudes y Prácticas

- 57% de los participantes refirieron haber tenido relaciones sexuales en los últimos doce meses.

  La siguiente tabla hace referencia a la percepción o acción del encuestado respecto al tipo de pareja con la que tuvo relaciones sexuales en los últimos tres.

Tabla No.1: Actitud o práctica del encuestado según tipo de pareja sexual

Acción	Pareja Estable	Pareja Ocasional
Percepción de riesgo	31%	30%
Propuesto el uso del condón	56%	48%
Usaron condón la última vez que tuvieron relaciones sexuales	53%	41%
Usaron condón en los últimos tres meses	47%	44%

ITS

7% de los participantes reportó haber tenido una señal de ITS en los últimos doce meses. Las acciones que tomaron al darse cuenta que presentaban esas señales fueron: visitar el Centro de Salud (75%), auto-medicarse (19%), visitar una clínica privada (17%), y visitar una farmacia (6%).

Prueba de VIH y Auto-cuidado

45% se ha hecho la prueba de VIH en el último año y, de ellos, el 76% recibió consejería pre y post prueba. Del total que se hicieron la prueba, 58% se la ha realizado en una de las ONGs que AS-Two apoya, y, de ellos, 89% recibió consejería pre y post prueba. No se encontraron diferencias significativas en la realización de pruebas por sexo.

Etapas del Modelo Transteórico para el Cambio de Comportamiento en Garífunas 16-24 Años de Edad

Comportamientos de los Garífunas 16-24 Años de Edad que Han Tenido Relaciones Sexuales con Pareja Estable

Según el modelo transteórico para cambio de comportamiento la población Garífuna 16-24 años, en relación al uso del condón con su pareja estable, se encuentra ***en la etapa de Pre contemplación***

La población de 16-24 años se encuentra en la etapa de Pre-contemplación, y esto de manera individual es igual a los resultados que se han obtenido en las tres Ongs , siendo Colon el área nueva de intervención , lo que podría ser un periodo de adaptación de la población , pero es un llamado de atención para la población de Puerto Cortes y especialmente mente Atlántida que han sido intervenida en años anteriores , esto nos indica que hay que revisar que está pasando en esta zona , y retomar las actividades anteriores de manera de que puedan pasar a otra escala. Además hay que revisar el censo de manera de verificar si es que estos jóvenes eran en su mayoría nuevos o si se mantienen.



Comportamientos de los Garífunas 16-24 Años de Edad que Han Tenido Relaciones Sexuales con Pareja Ocasional

Según el modelo transteórico para cambio de comportamiento la población Garífuna 16-24 años, en relación al uso del condón con su pareja ocasional, se encuentra ***en la etapa de pre contemplación-***



1. Garífunas Adultos

A. Datos Socio-demográficos

En la encuesta participaron 735 Garífunas; 243 intervenidos por CASM y 492 por ECOSALUD. Los 243 participantes de CASM provenían de las comunidades de Bajamar, Chifia, El Estero y Travesía. Los 275 intervenidos por ECOSALUD Atlántida provenían de las comunidades de Corozal, Sambo Creek, Nueva Armenia y Río Esteban, mientras que 217 de ECOSALUD Colón eran de las comunidades de Ciriboya, Cusuna, Iriona, Punta Piedra y San José de la Punta.

Hubo un predominio del sexo femenino en los participantes (58%). El promedio de edad fue de 36.2 años, con una mediana de 32 y una moda de 25 años. El 97% de los encuestados sabía leer y escribir. En relación al estado civil: 40% estaban en unión libre, 20% casados, 32% solteros, 5% separados y 2% viudos.

B. Conocimientos sobre el VIH/ITS

- 70% conocían tres o más formas de transmisión del VIH, siendo las más frecuentemente mencionadas: tener relaciones sexuales (91%), compartir agujas o jeringas usadas o tatuajes (65%), transfusiones de sangre (52%), de una mujer embarazada a su hijo (47%), y mediante la leche materna (34%).
- 97% no mencionó ninguna forma errónea de transmisión.
- 65% conocían tres o más formas de prevención del VIH, siendo las más frecuentes: usar condón (96%), ser fiel (69%), no tener relaciones sexuales (29%), evitar utilizar jeringas o agujas usadas o tatuarse (18%), y tener menos parejas (15%). Se observó una proporción significativamente alta en los conocimientos sobre formas de transmisión y de prevención del VIH en las mujeres.
- 44% reconoce tres o más señales de una ITS siendo las más frecuentemente mencionadas: flujo/secreción de pus por la vagina/pene (65%), ronchas/granos/llagas en genitales (50%), secas o golondrinas/ganglios inflamados (18%), y verrugas/condilomas/caballitos (12%). Entre otras mencionaron dolor/ardor al orinar (59%), mal olor en los genitales (46%) y picazón en los genitales (44%).
- 88% de los participantes manifestaron que cuidarían a un familiar si se enfermara de sida.
- 78% afirmaron que no se puede decir a simple vista si una persona tiene el VIH

C. Actitudes y Prácticas

- 80% de los participantes refirieron haber tenido relaciones sexuales en los últimos doce meses.

La siguiente tabla muestra la percepción o acción según tipo de pareja de los participantes que refirieron haber tenido relaciones sexuales en los últimos doce meses

Tabla No.2: Actitud o práctica de los participantes según tipo de pareja sexual

Acción	Pareja estable	Pareja ocasional
Percepción de riesgo	47%	36%
Propuesto el uso del condón	56%	48%
Usaron condón la última vez que tuvieron relaciones sexuales	53%	55%
Usaron condón en los últimos tres meses	55%	52%

ITS

14% de los participantes reportó haber tenido una señal de ITS en los últimos doce meses. Las acciones que tomaron fueron: visitar el Centro de Salud (65%), visitar una clínica privada (19%), auto-medicarse (11%), y consultar un educador (4%).

Prueba de VIH

63% se ha hecho la prueba de VIH en el último año y, de ellos, el 69% recibió consejería pre y post prueba. Del total que se hicieron la prueba, 75% se la ha realizado en la ONG, y, de ellos, 83% recibió consejería pre y post prueba.

Etapas del Modelo Transteórico para el Cambio de Comportamiento en Garífunas Adultos (25 Años de Edad o Más)

Comportamientos de los Garífunas Adultos que Han Tenido Relaciones Sexuales con Pareja Estable

Según el modelo transteórico para cambio de comportamiento, en relación al uso del condón con su pareja estable, la población Garífuna adulta se encuentra ***en la etapa de pre contemplación***

Los resultados obtenidos por población nos indica que las tres Ongs , han obtenido resultados bajos , llamando la atención ya que hay gente de seguimiento en la zona de Atlántida y Cortes , es preocupante que en datos generales son más altos los de las mujeres que las de los hombres. Es de revisar todas las intervenciones y metodologías utilizadas, retomar las que se estaban utilizando, reforzar los conocimiento incluyendo percepción de riesgo, y trabajar en nuevo material que le de seguimiento a la revisa HIñaru, revisar como están manejando los diarios de vida.



Comportamientos de los Garífunas 25 Años de Edad o Más que Han Tenido Relaciones Sexuales con Pareja Ocasional

Según el modelo transteórico para cambio de comportamiento, en relación al uso del condón con su pareja ocasional, la población Garífuna 16-24 años se encuentran ***en la etapa de pre contentemplacion***



2. *Hombres que tienen sexo con otros Hombres (HSH)*

A. Datos Socio-demográficos

En la encuesta participaron 443 HSH, provenientes de las comunidades de Chamelecón (86), Choloma (85), El Progreso (96), La Lima (68) y San Pedro Sula (108).

El promedio de edad fue de 23.3 años, con una mediana de 22 y una moda de 22 años. El 100% de los encuestados sabía leer y escribir. En cuanto al estado civil, 93% eran solteros, 5% estaban en unión libre y 1% eran casados.

B. Conocimientos sobre el VIH/ITS

- 88% conocían tres o más formas de transmisión del VIH, siendo las más frecuentes: tener relaciones sexuales (98%), transfusiones de sangre (83%), compartir agujas o jeringas usadas o tatuajes (82%), y de una mujer embarazada a su hijo (76%).
- 99% no mencionó ninguna forma errónea de transmisión.
- 85% conocían tres o más formas de prevención del VIH, siendo las más frecuentes: usar condón (99%), ser fiel (81%), no compartir agujas o jeringas usadas o tatuajes (75%), no tener relaciones sexuales (70%), y masturbación (5%).
- 81% reconocieron dos o más señales de una ITS siendo las más frecuentemente mencionadas: flujo/secreción de pus por la vagina/pene (86%), ronchas/granos/llagas en genitales (83%), secas o golondrinas/ganglios inflamados (74%), verrugas/condilomas/caballitos (72%). Además, identificaron picazón en los genitales (50%), dolor/ardor al orinar (49%), y mal olor en genitales (36%).
- 99% afirmaron que no se puede decir a simple vista si una persona tiene el VIH.

C. Actitudes y Prácticas

- En relación a con quiénes ha tenido relaciones sexuales en los últimos 12 meses los HSH respondieron: con hombres y mujeres (57%), solo con hombres (42%) y solo con mujeres (1%).
- En relación al número de parejas estables en los últimos doce meses: 42% afirmó tener una, 47% dos y 7% tres o más.
- En relación al número de parejas ocasionales en los últimos doce meses: 20% reportó tener una, 38% dos y 41% tres o más.

La siguiente tabla hace referencia de la percepción/acción de los HSH en relación a su pareja estable y ocasional

Tabla No.3.: Actitud o práctica de los participantes de acuerdo al tipo de pareja sexual

Acción	Pareja estable	Pareja ocasional
Percepción de riesgo	95%	98%
Propuesto el uso del condón	93%	95%
Usaron condón la última vez que tuvieron relaciones sexuales	92%	95%
Usaron condón en los últimos tres meses	94%	97%
Usaron condón en los últimos doce meses	95%	99%

- Los HSH que tienen relaciones sexuales con mujeres, usaron el condón siempre (56%), a veces (1%), no lo usa (0.2%), o no lo práctica (42%).

- 8% reportó haber tenido relaciones sexuales en los últimos doce meses con un trabajador sexual, y 88% reportó haber usado condón. en la última relación sexual

ITS

- 2%reportó haber tenido una señal de ITS en los últimos doce meses.
- Las acciones que tomaron fueron: visitar el Centro de Salud (4), dejar de tener relaciones sexuales (2), auto-medicarse (1), consultar un educador (1), y visitar una farmacia (1).

Prueba de VIH

- 97% se ha hecho la prueba del VIH en el último año, el 96% recibió consejería pre y post prueba.
- Del total que se hicieron la prueba, 95% se la ha realizado en una ONG, y, un 97% recibió consejería pre y post prueba.

Etapas del Modelo Transteórico para el Cambio de Comportamiento en HSH

Comportamientos de los HSH que Han Tenido Relaciones Sexuales con Pareja Estable

Según el modelo transteórico para cambio de comportamiento en relación al uso del condón con su pareja estable la población HSH se encuentra ***en la etapa de Acción a Mantenimiento***



Comportamientos de los HSH que Han Tenido Relaciones Sexuales con Pareja Ocasional

Según el modelo transteórico para cambio de comportamiento, en relación al uso del condón con su pareja ocasional, la población HSH se encuentra ***en la etapa de Acción a Mantenimiento***



2. *Mujeres Parejas de Hombres Bisexuales*

A. Dato Socio-demográficos

En la encuesta participaron 51 mujeres parejas de hombres bisexuales que son intervenidas por la Comunidad Gay Sampedrana para la Salud Integral (CGSSI), de las comunidades de Chamelecón (12), Choloma (10), El Progreso (10), La Lima (8) y San Pedro Sula (11). El promedio de edad fue de 26 años, con una mediana y una moda de 25 años. El 100% de las encuestadas sabía leer y escribir. En cuanto al estado civil, 80% estaban en unión libre, 12% eran casadas, y 8% eran solteras.

B. Conocimientos sobre el VIH/ITS

- 99% conocían tres o más formas de transmisión del VIH, siendo las más frecuentes: de una mujer embarazada a su hijo (100%), al tener relaciones sexuales (100%), compartir agujas o jeringas usadas o hacerse tatuajes (96%), mediante la leche materna (94%), y las transfusiones de sangre (92%).
- 99% conocían tres o más formas de prevención del VIH, siendo las más frecuentes: usar condón (100%), ser fiel (100%), no tener relaciones sexuales (96%), no compartir agujas o jeringas usadas o hacerse tatuajes (90%), evitar transfusiones de sangre (86%) y disminuir el número de parejas (28%).
- 100% conocían dos o más formas de prevención de la transmisión de VIH de madre a hijo, siendo las más frecuentes: ponerse en control de embarazo/visitar al doctor (98%), tomar ARV (80%), y hacer una cesárea (84%).
- 98% reconoce tres o más señales de una ITS, siendo las más frecuentemente mencionadas: flujo/secreción de pus por la vagina/pene (100%), ronchas/granos/llagas en genitales (98%), verrugas/condilomas/caballitos (96%), secas o golondrinas/ganglios inflamados (94%). Además, mencionaron dolor/ardor al orinar (67%), picazón en los genitales (53%), mal olor en los genitales (51%), y dolor en el vientre (39%).
- 100% afirmaron que no se puede decir a simple vista si una persona tiene el VIH.

C. Actitudes y Prácticas

- 98% se consideraban en riesgo de adquirir el VIH con su pareja estable
- 96% le ha propuesto el uso del condón a su marido o pareja estable.
- 65% utilizó condón la última vez que tuvo relaciones sexuales con su pareja estable o marido.
- En los últimos tres meses, 63% utilizó siempre el condón y 37% a veces usó el condón con su pareja estable o marido.
- Ninguna de las encuestadas reportó haber tenido señales de ITS en el último año.

Prueba del VIH

- 100% se ha hecho la prueba del VIH en el último año, todas en la ONG y todas recibieron consejería pre y post prueba.

Etapas del Modelo Transteórico para el Cambio de Comportamiento en Mujeres de HSH Bisexuales

Comportamientos de Mujeres Parejas de HSH Bisexual en Relación a su Pareja Estable

Según el modelo transteórico para cambio de comportamiento en relación al uso del condón con su pareja estable, las Mujeres Parejas de HSH Bisexual se encuentran ***en la etapa de Preparación a Acción.***



3. *Mujeres Trabajadoras Sexuales (MTS)*

A. Datos Socio-demográficos

En la encuesta participaron 702 MTS, 319 fueron intervenidas por la Asociación Hondureña Mujer y Familia (AHMF) en las ciudades de San Pedro Sula, Puerto Cortés y Comayagua, 168 por el Centro de Orientación y Capacitación en SIDA (COCSIDA) en el municipio de Tela, Departamento de Atlántida y 215 por el Programa para el Desarrollo de la Infancia y la Mujer (PRODIM) en Comayagüela y Tegucigalpa.

El promedio de edad fue de 31 años, con una mediana de 28 y una moda de 23 años. El 80% de las encuestadas sabía leer y escribir. En relación al estado civil, 57% estaban en unión libre, 37% solteras, 5% casadas, 1% viudas y 0.3% divorciadas.

B. Conocimientos sobre el VIH/ITS

- 89% conocían tres o más formas de transmisión del VIH, siendo las más frecuentes: tener relaciones sexuales (98%), compartir agujas o jeringas usadas o hacerse tatuajes (85%), transfusiones de sangre (84%), de una mujer embarazada a su hijo (68%), y mediante la leche materna (45%).
- Un 99% no mencionó ninguna forma incorrecta de transmisión.
- 73% conocían tres o más formas de prevención del VIH, siendo las más frecuentes: usar condón (99%), no compartir agujas o jeringas usadas (68%), ser fiel (51%), no tener relaciones sexuales (47%), y disminuir el número de parejas (35%).
- 82% conocían dos o más formas de prevención de la transmisión de VIH de madre a hijo, siendo las más frecuentes: ponerse en control de embarazo/visitar al doctor (89%), hacer una cesárea (77%), y tomar ARV (68%).
- 75% reconoce dos o más señales de una ITS, siendo las más frecuentemente mencionadas: flujo/secreción de pus por la vagina/pene (90%), ronchas/granos/llagas en genitales (70%), mal olor en los genitales (66%), secas o golondrinas/ganglios inflamados (48%), y verrugas/condilomas/caballitos (29%). También identificaron picazón en los genitales (74%) y dolor/ardor al orinar (71%).
- 92% afirmaron que no se puede decir a simple vista si una persona tiene el VIH.

C. Actitudes y Prácticas

La siguiente tabla hace referencia a la percepción/acción de las MTS, según tipo de pareja

Tabla No.4.: Actitud o práctica de las MTS encuestadas según tipo de pareja sexual

Uso del condón	Pareja estable/marido	Pareja ocasional/cliente
Percepción de Riesgo	39%	58%
Propuesto el uso del condón	59%	98%
Usaron condón la última vez que tuvieron relaciones sexuales	47%	94%
Usaron condón en los últimos tres meses	45%	97%

ITS

- 12% de las participantes reportó haber tenido una señal de ITS en los últimos doce meses.
- Las acciones que tomaron al darse cuenta que presentaban señales de una ITS fueron: tomarse todo el tratamiento (75%), visitar el Centro de Salud (71%), visitar una clínica privada (24%), usar condón (17%), dejar de tener relaciones sexuales (14%), llevar al marido/pareja estable al médico (13%), auto-medicarse (10%), consultar un educador (5%), y acudir a la farmacia (2%).

Prueba del VIH

- 95% se ha hecho la prueba de VIH en el último año y de ellas, el 88% recibió consejería pre y post prueba.
- 73% se ha realizado la prueba de VIH en una ONG, y 95% recibió consejería pre y post prueba.

Etapas del Modelo Transteórico para el Cambio de Comportamiento en MTS

Comportamientos de MTS con Pareja Estable

Según el modelo transteórico para cambio de comportamiento, en relación al uso del condón con su pareja estable, las MTS se encuentran ***en la etapa de pre Contemplación a contemplación***



Comportamientos de las MTS con su cliente/pareja ocasional

Según el modelo transteórico para cambio de comportamiento, en relación al uso del condón con su cliente /pareja ocasional, las MTS se encuentran ***en la etapa de Acción a Mantenimiento***



3. *Hombres Parejas de Mujeres Trabajadoras Sexuales*

A. Datos Socio-demográficos

En la encuesta participaron 90 hombres parejas MTS. De este total, 26 fueron intervenidos por la AHMF en las ciudades de San Pedro Sula, Puerto Cortés y Comayagua, 44 por COCSIDA en Tela, Atlántida, y 20 por el Programa para el Desarrollo de la Infancia y la Mujer (PRODIM) en Comayagüela y Tegucigalpa.

El promedio de edad de los participantes fue de 32 años, con una mediana de 30 años y una moda de 27 años. El 72% de los encuestados sabía leer y escribir. En relación al estado civil: 84% estaban en unión libre, 11% eran solteros, y 3% eran casados.

B. Conocimientos sobre el VIH/ITS

- 92% conocían tres o más formas de transmisión del VIH, siendo las más frecuentes: tener relaciones sexuales (93%), compartir agujas o jeringas usadas o hacerse tatuajes (91%), transfusiones de sangre (91%), de una mujer embarazada a su hijo (86%), y mediante la leche materna (60%).
- 100% no mencionó ninguna forma errónea de transmisión.
- 88% conocían tres o más formas de prevención del VIH, siendo las más frecuentes: usar condón (100%), no compartir agujas o jeringas usadas (83%), ser fiel (80%), no tener relaciones sexuales (67%), y disminuir el número de parejas (54%).
- 82% reconoce tres o más señales de una ITS siendo las más frecuentemente mencionadas: flujo/secreción de pus por la vagina/pene (88%), ronchas/granos/llagas en genitales (84%), secas o golondrinas/ganglios inflamados (74%), dolor/ardor al orinar (78%), mal olor en los genitales (74%), y picazón en los genitales (73%), y verrugas / condilomas / caballitos (54%).
- 96% afirmaron que no se puede decir a simple vista si una persona tiene el VIH.

C. Actitudes y Prácticas

- 90% de los participantes respondieron que en los últimos doce meses tuvieron una pareja fija.
- 68% se considera en riesgo de adquirir el VIH; 19% afirmó no considerarse en riesgo debido a que usaban condón; mientras que 11% afirmó que no se consideraba en riesgo de adquirir el VIH.

La siguiente tabla hace referencia de la percepción/acción en Hombres Parejas de MTS

Tabla No.5.: Actitud o práctica del encuestado de acuerdo al tipo de pareja sexual

Uso del condón	Pareja estable/fija	Pareja ocasional
Percepción de riesgo	49%	62%
Propuesto el uso del condón	75%	81%
Usaron condón la última vez que tuvieron relaciones sexuales	36%	62%
Usaron condón en los últimos tres meses	72%	85%

ITS

- 12% reportó haber tenido una señal de ITS en los últimos doce meses.
- Las acciones que tomaron fueron: tomarse todo el tratamiento (10), visitar una clínica privada (7), usar condón (6), visitar el Centro de Salud (2), consultar a un amigo (2), y dejar de tener relaciones sexuales (1).

Prueba de VIH

88% se ha hecho la prueba de VIH en el último año, con consejería pre y post, todos en una ONG.

Etapas del Modelo Transteórico para el Cambio de Comportamiento Hombres Pareja de MTS

Comportamientos de Hombres Parejas MTS (en relación al uso del condón con pareja estable)

Según el modelo transteórico para cambio de comportamiento en relación al uso del condón con su pareja estable, los Hombres Pareja de MTS se encuentran ***en la etapa de Preparación a Acción.***



En relación al uso al uso del condón en los últimos tres meses y ultimas vez se concluye que el 72% lo estaba utilizando en los últimos tres meses, mas sin embargo solamente el 36% manifestó haberlo utilizado en su última relación sexual al encuestarlo .
Lo que significa que el uso del condón no es consistente, lo que indica que hay que reforzar el usos con condón en toda relación sexual .

Comportamiento de Hombres Parejas MTS (en relación al uso del condón con pareja ocasional)

Según el modelo transteórico para cambio de comportamiento en relación al uso del condón con su pareja ocasional, los Hombres Pareja de MTS se encuentran ***en la etapa de preparación a acción***



Conclusiones Y Recomendaciones

I. Conocimientos	
Conclusiones	**Recomendaciones**
La población que reporta mayor porcentaje en conocimientos son los HSH, y MTS	Se debe de seguir dando prioridad al área de conocimientos en la población garífuna. Con la población HSH Y MTS es necesario seguir trabajando conocimientos y percepción de riesgo para que no haya una recaída.
En población garífuna 16-24 se obtuvo el más alto nivel en conocimientos de VIH/ITS en relación a la población de 10-15 y de adultos, mientras que el nivel más bajo de conocimientos se reportó en la población garífuna de 10-15 años. En los tres grupos se notó un menor conocimiento en identificar las principales señales de las ITS, en tanto que el mayor se obtuvo en las formas de prevención del VIH	Se debe de seguir fortaleciendo los conocimientos de VIH/ITS con los niños de 10-15 años, y la población mayor de 25 años, y con los jóvenes de 16-24 sobre todo en las principales señales de las ITS.
En la población garífuna adulta la intervenciones han sido dirigidas a formación de lideresas con grupos de mujeres, no así con grupos de hombres	Iniciar un proceso de formación de líderes con grupos de hombres garífunas, como se ha venido trabajando con las mujeres.
II. Actitudes y prácticas	
En población garífuna adulta no se observa un grado significativo en percepción de riesgo, proposición y uso de condón en relación a pareja estable y pareja ocasional.	Se deben de desarrollar intervenciones con la población garífunas adulta donde se fortalezca la percepción de riesgo, la negociación y uso del condón con sus parejas estables, e identificar las barreras en la negociación del uso del condón con sus parejas fijas.
Se reportan ITS en los últimos doce meses en los garífunas: de 0% en el grupo de 10-15 años de edad, 7% de 16-24 años y 14% en adultos	Se debe de reforzar al conocimiento sobre ITS y el uso consistente y adecuado del condón tanto con sus parejas estables como ocasionales.
Se observó la multiplicidad de parejas ocasionales y estables en HSH.	Desarrollar estrategias de prevención orientadas a disminuir el riesgo de infección a través de la reducción del número de parejas sexuales
Alrededor de un 60% de los HSH encuestados refieren haber tenido relaciones sexuales con	Se debe de trabajar en intervenciones donde se

hombres y mujeres	incremente la negociación y el uso del condón con parejas tanto hombres como mujeres. Además seguir trabajando en percepción de Riesgo, negociación y uso del condón con el grupo de mujeres parejas de hombres bisexuales
Es de hacer notar que se tienen altos porcentajes de percepción de riesgo, proposición y uso de condón en las relaciones de HSH entre hombres.	Seguir trabajando con intervenciones dirigidas y de manera sistemática con mujeres parejas de HSH, de manera que ellas propongan el uso de condón a sus parejas fijas.
Se observo que los HSH utilizan el condón con sus parejas hombres estables y ocasionales, pero muy poco lo utilizan con su pareja mujer.	Se tienen que hacer intervenciones donde se refuerce el uso del condón con sus parejas femeninas, ya que los HSH se sienten en más riesgo con sus parejas hombres.
Se observó una reducción en la proposición y uso de condón en MTS con su pareja estable. El uso inconsistente del condón con pareja estable se ve reflejado en el porcentaje de MTS que reportaron una señal de ITS en el último año.	Realizar intervenciones que eviten recaídas , como ser relaciones de apoyo, o formar grupos de auto apoyo dentro del grupo y seguir trabajando en el control de estimulo.
En el grupo de las MTS se observó un bajo porcentaje en uso del condón con parejas fijas, no así con clientes o parejas ocasionales.	Realizar intervenciones con las MTS orientadas a desarrollar habilidades para la negociación y uso del condón con sus parejas estables y el manejo de sentimientos Además, seguir reforzando con los grupos de los maridos la percepción de riesgo y uso de condón con sus parejas, con metodologías de acuerdo a las características de la población
III. Áreas según la etapa de comportamiento en la que se encuentran las poblaciones según el modelo transteórico	
Se observa según los datos de este CAP que la población garífuna, adulta, 16-24, 10-15 , han tenido una recaída según el modelo transteorico según los datos del 2009, ya que ahora se ubican en la etapa de pre contemplación.	
➢ **Población Garífuna de 10-15 años de edad que si han tenido relaciones sexuales se encuentran en la etapa de pre contemplación**	
Cuenta con bajo nivel de conocimiento y bajo nivel de abstinencia	Continuar reforzando el conocimiento sobre el VIH/ITS y desarrollar sistemas de apoyo de manera de concientizarlos aumentar, su perciben en riesgo de adquirir el VIH.
➢ **Población Garífuna de 10-15 años de edad que No han tenido relaciones sexuales se encuentran en la etapa de pre contemplación a contemplación**	
Cuentan con un nivel bajo de conocimientos y percepción de riego ,pero un alto grado de intención de postergación y de postergación	Con este grupo se tiene que reforzar conocimientos , las situaciones de riesgo y además enfocar las actividades en las ventajas de postergar el inicio de las relaciones sexuales , y las desventajas de iniciar a tener relaciones sexuales a su edad se podría n trabajar en planes de vida .

	Se deben de trabajar en prevención de abuso infantil mediante el diseño de curricula y actividades
➢ **La población sexualmente activa de 16-24 años de edad en relación al uso del condón con su pareja estable como con su pareja ocasional se encuentra en la etapa de pre contemplación**	
Hubo una recaída en comparación al CAP 2009 en relación al uso del condón con su pareja estable y ocasional.	Continuar reforzando el conocimiento sobre VIH/ITS y la percepción de riesgo de esta población. Continuar el trabajo de exploración de miedos, barreras y factores que les impide adoptar un cambio de comportamiento y el desarrollo de planes de vida para superar esos temores
A pesar de esta recaída, el estudio CAP 2010 refleja un pequeño aumento en el nivel de conocimientos sobre las formas de prevención de la transmisión del VIH e ITS.	Se tienen que seguir trabajando en conocimientos en relación al VIH/ITS.
➢ ***La* población garífuna de más de 25 años en relación al uso del condón con su pareja estable como con su pareja ocasional se encuentra en la etapa de pre contemplación**	
Se refleja un pequeño aumento en conocimientos en relación al 2009 pero una disminución de percepción de riesgo y uso del condón en relación a su pareja estable y su pareja ocasional.	Continuar reforzando su percepción de riesgo y negociación y uso del condón, trabajar con los grupos de hombres en intervenciones continuas enfatizando en situaciones de riesgo, y trabajar juegos de roles. Además enfatizar aparte del uso del condón la fidelidad mutua. Concientizarlos de lo que pueden ganar o perder si no toman una decisión de protegerse ante las situaciones de riesgo que se presente.
En la Garífunas se observa un mayor grado en conocimientos, actitudes, percepción de riesgo, proposición y uso de condón y realización de pruebas de VIH en las mujeres.	Se debe de realizar intervenciones dirigidas a los hombres de acuerdo a su entorno y necesidades.
➢ **Población HSH se mantiene en la misma etapa del CAP 2009, entre acción y mantenimiento.**	
Se mantienen en la misma etapa del CAP 2009, la cual es de acción y mantenimiento	Continuar trabajando con la estrategia de mantenimiento de los mentores existentes y el desarrollo de nuevos mentores. Desarrollar actividades e intervenciones para evitar recaídas, como por ejemplo historias personales

	donde ellos visualicen los cambios y lo que han logrado para crear un sentimiento de orgullo. Reforzando/actualizando sus conocimientos sobre el VIH/ITS.
➢ **Mujeres parejas de hombres bisexuales se encuentran de preparación a acción**	
En esta población se refleja una recaída. En el 2009 se encontraban en las etapas de acción a manteniendo. a pesar de que hubo una recaída esta no se considera una etapa en el modelo transteorico si no que se considera una etapa normal del cambio, esto se considera un lapso donde las personas han vuelto a la conducta anterior . .	Se deben de retomar las intervenciones o experiencias anteriores utilizadas antes de la recaída de manera que visualicen la importancia de haber adoptado un cambio de comportamiento y el reforzar lo orgullosas que deben sentirse de haberlo logrado. Retomar el desarrollo de planes de vida con el fin de valorar los pros y contras de haber adoptado un cambio de comportamiento en relación a la prevención del VIH.
En comparación al CAP 2009, este grupo aumentó su nivel de conocimientos sobre formas de prevención y transmisión del VIH y señales de ITS	
➢ **Las MTS en relación a sus clientes se encuentran en las etapas de acción a mantenimiento**	
Se encuentran en las etapas de acción a mantenimiento, igual a las que se encontraban en el CAP 2009. No hubo recaída	Se tiene que seguir reforzando la percepción de riegos , y trabajar en intervenciones orientadas a la liberación social, equilibrio de decisiones , de manera de hacerles ver la importancia del uso del condón con sus clientes , para que continúen utilizando hasta ahora y manteniéndose en esta etapa, y además apoyarse de un grupo de mentoras de manera que sirvan como apoyo al momento que sientan una duda.
➢ **MTS en relación a su pareja estable se ubican en las etapas de pre contemplación a contemplación**	
Esta población tuvo una recaída en relación a pareja estable ya que *se encontraban de acción a mantenimiento en el 2009*	Continuar reforzando su percepción de riesgo. Retomar el desarrollo de planes de vida con el fin de valorar los pros y contras de haber adoptado un cambio de comportamiento en relación a la prevención del VIH con sus parejas estables. Desarrollar habilidades para poder manejar las barreras en relación al uso de condón con su pareja estable
➢ ***Hombres parejas de MTS se encuentran entre preparación y acción.***	
Esta población tuvo una recaída en relación a su	Se deben de formar los grupos de hombre para

pareja estable ya que se encontraban de acción a mantenimiento en el 2009	seguir un proceso de formación y así hagan efecto multiplicador Se debe reforzar sobre técnicas para la negociación del uso del condón e incrementar el compromiso del uso del condón con sus parejas, tanto estables como ocasionales
Esta población propone el uso del condón a sus parejas, pero no lo usan consistentemente con sus parejas estables. No así con su pareja ocasional	

ANEXO 1

Cuadro comparativos CAP 2009 y resultados 2010

1. **Población Garífuna de 10-15 años:**

Población Garífuna 10 – 15 años de edad	CAP 2009	CAP 2010	Valor p
Conocimientos			
Conoce tres o más formas correctas de transmisión de VIH	69%	65%	NS
Conoce tres o más formas correctas identificadas de prevención de VIH	55%	70%	< 0.01
Conoce tres o más señales de ITS	49%	40%	NS
Actitudes			
¿Cuidaría a un familiar si se enfermara de SIDA?			
• **Si**	93%	90%	NS
¿Con ver una persona se puede saber si está infectada con el VIH?			
• **Si**	6%	9%	NS
Riesgo de Adquirir el VIH			
¿Ha tenido relaciones sexuales alguna vez?			
• **Si**	5%	11%	< 0.01
¿Ha tenido una señal de ITS en los últimos tres meses?			
• **Si**	1%	0.0%	NS
¿Qué hace Usted para cuidarse de no infectarse de VIH o de una ITS?			
• **Nunca he tenido relaciones sexuales**	91%	84%	< 0.01
Intención de Tener Relaciones Sexuales			
¿Si le proponen tener relaciones sexuales aceptaría?			
• **Si**	0.0%	7%	NS

1. **Población Garífuna de 16-24 años:**

Población Garífuna 16 – 24 años de edad	CAP 2009 N=413	CAP 2010 N=505	Valor p
Conocimientos			
Conoce tres o más formas correctas de transmisión de VIH	69%	77%	< 0.01
Conoce tres o más formas correctas de prevención de VIH	62%	71%	< 0.01
Conoce tres o más señales de ITS	53%	53%	NS
No mencionan formas erróneas de transmisión de VIH	99%	96%	NS
Actitudes			
¿Cuidaría a un familiar si se enfermara de SIDA?			
• **Si**	93%	96%	0.04
¿Con ver una persona se puede saber si está infectada con el VIH?			
• **No**	85%	95%	< 0.01
Riesgo de Adquirir el VIH			
Haber tenido una señal de ITS en los últimos doce meses	6%	7%	NS
Haber tenido relaciones sexuales en últimos doce meses	58%	57%	NS
Percepción de riesgo con pareja estable	66%	31%	< 0.01
Propuso el uso del condón a pareja estable	96%	56%	< 0.01
Usó condón en última relación sexual con pareja estable	88%	53%	< 0.01
Usó condón en últimos tres meses con pareja estable	82%	47%	< 0.01
Percepción de riesgo con pareja ocasional	78%	30%	< 0.01
Propuso uso del condón a pareja ocasional	99%	48%	< 0.01
Usó condón en última relación sexual con pareja ocasional	79%	41%	< 0.01
Usó condón en últimos tres meses con pareja ocasional	80%	44%	< 0.01
Realización de Prueba de VIH			
Se ha hecho la prueba de VIH en el último año	41%	45%	NS
Recibió consejería pre y post prueba	72%	76%	NS
Se ha realizado la prueba del VIH en una ONG	64%	58%	NS
Se ha realizado la prueba del VIH en una ONG y recibió consejería pre y post prueba	95%	89%	0.06

1. **Población Garífuna adulta (más de 25 años):**

Población Garífuna Adulta	CAP 2009	CAP 2010	Valor p
Conocimientos			
Conoce tres o más formas correctas de transmisión de VIH	61%	70%	< 0.01
Conoce tres o más formas correctas de prevención de VIH	65%	65%	NS
Conoce tres o más señales de ITS	49%	44%	NS
No mencionan formas erróneas de transmisión de VIH	100%	97%	NS
Actitudes			
¿Con ver una persona se puede saber si está infectada con el VIH?			
• **Si**	24%	22%	NS
Riesgo de Adquirir el VIH			
Haber tenido una señal de ITS en los últimos doce meses	9%	14%	0.02
Haber tenido relaciones sexuales en últimos doce meses	77%	80%	NS
Percepción de riesgo con pareja estable	67%	47%	< 0.01
Propuso condón a pareja estable	65%	56%	< 0.01
Usó condón en última relación sexual con pareja estable	52%	53%	NS
Usó condón en últimos tres meses con pareja estable	51%	55%	NS
Percepción de riesgo con pareja ocasional	67%	36%	< 0.01
Propuso condón a pareja ocasional	67%	48%	< 0.01
Usó condón en última relación sexual con pareja ocasional	59%	55%	NS
Usó condón en últimos tres meses con pareja ocasional	55%	52%	NS
Realización de Prueba de VIH			
Se ha hecho la prueba de VIH en el último año	47%	63%	< 0.01
Se ha realizado la prueba de VIH en la ONG *	69%	75%	NS
Se ha realizado la prueba de VIH en la ONG y recibió consejería pre y post prueba *	96%	85%	< 0.01

** Comparando solo los encuestados por ECOSALUD Atlántida.*

2. **Hombres que tienen sexo con otros Hombres (HSH)**

Población HSH	CAP 2009	CAP 2010	Valor p
Conocimientos			
Conoce tres o más formas correctas de transmisión de VIH	86%	88%	NS
Mencionan alguna forma errónea de transmisión de VIH	0%	1%	NS
Conoce tres o más formas correctas identificadas de prevención de VIH	82%	85%	NS
Conoce dos o más señales de ITS	92%	81%	< 0.01
Actitudes			
¿Con ver una persona se puede saber si está infectada con el VIH?			
• **Si**	0%	1%	NS
Riesgo de Adquirir el VIH			
Haber tenido una señal de ITS en los últimos doce meses	3%	2%	NS
Percepción de riesgo con pareja estable	85%	95%	< 0.01
Propuso condón a pareja estable	87%	93%	< 0.01
Usó condón en última relación sexual con pareja estable	98%	92%	< 0.01
Usó condón en últimos tres meses con pareja estable	99%	94%	< 0.01
Percepción de riesgo con pareja ocasional	96%	98%	0.07
Propuso condón a pareja ocasional	97%	95%	NS
Usó condón en última relación sexual con pareja ocasional	93%	95%	NS
Usó condón en últimos tres meses con pareja ocasional	94%	97%	0.02
Realización de Prueba de VIH			
Se ha hecho la prueba de VIH en el último año	95%	97%	NS
Recibió consejería pre y post prueba	98%	96%	NS

2. **Mujeres Parejas de Hombres Bisexuales**

Población Mujeres Parejas de Hombres Bisexuales	CAP 2009	CAP 2010	Valor p
Conocimientos			
Conoce tres o más formas correctas de transmisión de VIH	93%	99%	NS
Conoce tres o más formas correctas identificadas de prevención de VIH	73%	99%	< 0.01
Conoce tres o más señales de ITS	88%	98%	NS
Actitudes			
Haber tenido una señal de ITS en los últimos doce meses	0%	0%	NS
Percepción de riesgo con pareja estable	100%	98%	NS
Propuso condón a pareja estable	84%	96%	NS
Usó condón en última relación sexual con pareja estable	80%	65%	NS
Usó condón en últimos tres meses con pareja estable	84%	63%	0.06
Realización de Prueba de VIH			
Se ha hecho la prueba de VIH en el último año	88%	100%	NS
Recibió consejería pre y post prueba	96%	100%	NS

3. **Mujeres Trabajadoras Sexuales (MTS)**

Población MTS	CAP 2009	CAP 2010	Valor p
Conocimientos			
Conoce tres o más formas correctas de transmisión de VIH	88%	89%	NS
Conoce tres o más formas correctas de prevención de VIH	69%	73%	NS
Conoce dos o más señales de ITS	93%	75%	< 0.01
Actitudes			
¿Con ver una persona se puede saber si está infectada con el VIH?			
• **Si**	1%	8%	< 0.01
Riesgo de Adquirir el VIH			
Reporta haber tenido una señal de ITS en los últimos doce meses	14%	12%	NS
Haber tenido una señal de ITS en los últimos doce meses	14%	12%	NS
Percepción de riesgo con pareja estable	92%	39%	< 0.01
Propuso condón a pareja estable	96%	59%	< 0.01
Usó condón en última relación sexual con pareja estable	70%	47%	< 0.01
Usó condón en últimos tres meses con pareja estable	72%	45%	<0.01
Percepción de riesgo con cliente	89%	58%	< 0.01
Propuso condón a cliente	99%	98%	NS
Usó condón en última relación sexual con cliente	95%	94%	NS
Realización de Prueba de VIH			
Se ha hecho la prueba de VIH en el último año	95%	95%	NS
Se ha realizado la prueba de VIH en la ONG y recibió consejería pre y post prueba	99%	95%	< 0.01

3. Hombres Parejas de Mujeres Trabajadoras Sexuales

Población Hombres Pareja de MTS	CAP 2009	CAP 2010	Valor p
Conocimientos			
Conoce tres o más formas correctas de transmisión de VIH	83%	92%	0.01
Conoce tres o más formas correctas identificadas de prevención de VIH	63%	88%	0.0007
Conoce tres o más señales de ITS	85%	82%	0.03
Riesgo de Adquirir el VIH			
Haber tenido una señal de ITS en los últimos doce meses	7%	12%	NS
Propuso condón a pareja estable	91%	75%	< 0.001
Usó condón en última relación sexual con pareja estable	91%	36%	< 0.001
Usó condón en últimos tres meses con pareja estable	91%	72%	< 0.001
Propuso condón a pareja ocasional	80%	81%	NS
Usó condón en última relación sexual con pareja ocasional	69%	62%	NS
Usó condón en últimos tres meses con pareja ocasional	69%	85%	0.04
Realización de Prueba de VIH			
Se ha hecho la prueba de VIH en el último año	72%	88%	0.02
Se ha realizado la prueba de VIH en la ONG y recibió consejería pre y post prueba	100%	100%	NS