

SDSH Results: Planification Familiale

L'expérience de la Clinique La Fanmyi

This report was made possible through support provided by the US Agency for International Development, under the terms of Contract No. GHS-I-00-07-00006-00. The opinions expressed herein are those of the author(s) and do not necessarily reflect the views of the US Agency for International Development.

Santé pour le Développement et la Stabilité d'Haiti (SDSH)
Management Sciences for Health
784 Memorial Drive
Cambridge, MA 02139
Telephone: (617) 250-9500
www.msh.org



Planification familiale: Dynamiser l'offre de ligature des trompes L'expérience de la Clinique La Fanmyi



DÉFIS

- Vaincre les barrières limitant l'utilisation de la ligature
- Encourager d'autres institutions à pratiquer la ligature comme moyen de lutte contre la surpopulation.

STRATÉGIES MISES EN OEUVRE

- Etude rétrospective de l'utilisation de ce service de planification familiale sur 5 années, de 2004 à 2009, et présentation des résultats via des conférences au niveau du département et au niveau national
- Sensibilisation et mobilisation de la communauté sur la méthode permanente de ligature des trompes
- Mobilisation du réseau communautaire pour le recrutement des clientes à domicile
- Offre des services de ligature au quotidien et en postpartum.

LEÇONS APPRISES

- En général, les femmes attendent d'avoir plus 35 ans et plus de 4 enfants avant d'accepter la ligature
- Les femmes au niveau de formation académique moins élevé sont plus susceptibles d'accepter la ligature des trompes
- L'utilisation est plus grande quand la contribution des femmes au coût du service est faible


PERSPECTIVE

- Recherche de partenariats et de ressources pour la mise en place d'une équipe mobile départementale pouvant assurer l'offre de services de Contraception Chirurgicale Volontaire (CCV) dans le Sud.




Résultats de l'étude


Répartition selon le groupe d'âges des femmes



Répartition selon le niveau de formation académique des femmes




Répartition selon la Gravida des femmes



91% ont eu au moins 4 grossesses antérieures

Répartition des interventions par période



89% des interventions ont été réalisées dans la période d'intervalle du post-partum