

# COMMENT PARLER AVEC LA MÈRE/PARENT

AIDE  
MEMOIRE  
POUR  
VACCINATEURS

## LA COMMUNICATION INTERPERSONNELLE

Cette fiche est utile pour encourager les personnes qui s'occupent des enfants à les amener à se faire vacciner, jusqu'à ce qu'ils reçoivent tous les vaccins dont ils ont besoin.

### Occasions de communication interpersonnelle dans le PEV :

- Entre les agents de santé qui assurent les services de vaccination et les personnes qui s'occupent des enfants et qui les emmènent se faire vacciner ;
- Entre les animateurs (ASC, Relais) et les personnes qui s'occupent des enfants.

### Pour une communication interpersonnelle efficace lors des séances de vaccination, il faut que le prestataire de service :

- Assure un bon accueil des utilisateurs en les mettant à l'aise ;
- Parle simplement en utilisant des mots faciles à comprendre ;
- Informe sur le(s) vaccin(s) et le prochain rendez-vous (le(s) vaccin(s) et date d'administration) ;
- S'assure de la bonne compréhension et répond aux questions des utilisateurs.

## M Maladies

Informez la mère, la femme en âge de reproduction (FAR), la femme enceinte (FE) des maladies contre lesquelles elle ou son enfant ont été vaccinés.

## E Effets secondaires

Informez la mère, la FAR, FE sur les effets secondaires possibles et lui indiquez comment agir.

## R Rendez-vous

Précisez la date à laquelle elle doit revenir elle-même ou avec son enfant pour la prochaine vaccination.

## C Carte de vaccination

Recommandez à la mère, la FAR ou la FE d'apporter la carte de vaccination avec son enfant chaque fois qu'elle vient à la structure sanitaire pour elle-même ou pour son enfant.

## I Immunisation complète

Chaque enfant doit être vacciné 5 fois avant l'âge de 12 mois. Chaque FAR doit être vaccinée 5 fois. Rappeler à la mère ou la FAR qu'une seule ou 2 vaccinations ne protègent pas complètement.

# Calendrier vaccinal

## 1 - Enfant de 0 à 11 mois

| Age         | Vaccins                                    | Maladies  | Intervalle |
|-------------|--|---|------------|
| Naissance   | BCG/Polio 0                                | Tuberculose<br>Poliomyélite   |            |
| 6 semaines  | - Pentavalent 1<br>- polio 1<br>- Pneumo 1 | Diphtérie<br>Tétanos<br>Coqueluche<br>Hépatite B<br>Infections à HIB<br>Poliomyélite<br>Pneumonie | 4 semaines |
| 10 semaines | - Pentavalent 2<br>- polio 2<br>- Pneumo 2 | Diphtérie<br>Tétanos<br>Coqueluche<br>Hépatite B<br>Infections à HIB<br>Poliomyélite<br>Pneumonie |            |
| 14 semaines | - Pentavalent 3<br>- polio 3<br>- Pneumo 3 | Diphtérie<br>Tétanos<br>Coqueluche<br>Hépatite B<br>Infections à HIB<br>Poliomyélite<br>Pneumonie | 4 semaines |
| 9 mois      | Anti-rougeoleux<br>Anti-amaril             | Rougeole<br>Fièvre jaune  |            |

## 2 - Femme de 15 à 49 ans

| Vaccins | Période                |   |
|---------|------------------------|---|
|         | FE                     | FAR                                     |
| VAT 1   | A la 1ère CPN          | 1er contact avec la structure sanitaire |
| VAT 2   | 4 semaines après VAT 1 | 6 mois après VAT 1                      |
| VAT 3   | 6 mois après VAT 2     | 6 mois après VAT 2                      |
| VAT 4   | 1 an après VAT 3       | 1 an après VAT 3                        |
| VAT 5   | 1 an après VAT 4       | 1 an après VAT 4                        |