

Guía

de las aves del

RÍO LA NOVIA



Iniciativa para la Conservación
en la Amazonía Andina - ICAA



Guía

de las aves del

Río LA NOVIA



CORBIDI



MABO
SINFRON

Créditos

Cómo citar este libro: Fernando Angulo Pratonlongo (2015). Guía de las aves del Río LA NOVIA. CORBIDI y Consorcio Purús-Manu: WWF, CARE Perú, ProNaturaleza, ProPurús, Sociedad Zoológica de Fráncfort, ORAU. Lima, noviembre de 2015.

Angulo Pratonlongo, Fernando

Guía de las aves del Río LA NOVIA / Autor: Fernando Angulo Pratonlongo; Colaboradores: Jorge Novoa Cova, Cynthia Zurita Cervera, Igor Lazo Paredes, Carlos Cruz Trujillo, Heidi Rubio Torgler, Jose Luis Mena Álvarez: WWF Perú; 2015.

Primera edición: 2015

© WWF Perú

Razón social: World Wildlife Fund Inc.

Domicilio: Av. Trinidad Morán 853, Lince

Teléfono: (511) 440-5550

CORBIDI

Calle Sta. Rita 105 Oficina 202

Urb. Los Huertos de San Antonio - Surco, Lima.

Impreso en Ediciones Nova Print S.A.C.

Av. Ignacio Merino 1546 Lince

1000 ejemplares

Autor: Fernando Angulo Pratonlongo

Fotografías: Jorge Novoa Cova, Fernando Angulo, Igor Lazo Paredes

Ilustraciones: Oscar Vilca, Fernando Zavala; y dibujos tomados del libro Aves de Perú: Schulenberg, T. S., D. F. Stotz, D. F. Lane, J. P. O'Neill and T. A. Parker III 2010. Aves de Perú. Centro de Ornitología y Biodiversidad CORBIDI, Lima, Perú, Serie Biodiversidad Corbidi 01.

Diseño y diagramación: Jorge Novoa Cova (jojunoco@yahoo.es)

Producido en Perú, 2015

Esta publicación ha sido posible gracias al apoyo del Pueblo de los Estados Unidos de América a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Las opiniones aquí expresadas son las del autor(es) y no reflejan necesariamente la opinión de USAID ni del Gobierno de los Estados Unidos.

Contenido

1. Presentación
2. Agradecimientos
3. Introducción
 - La concesión para conservación Río La Novia
 - El corredor de conservación Purús-Manu
 - La Reserva Comuna Purús
 - Sobre las aves de la Concesión para Conservación Río La Novia
4. Descripción ecológica y hábitats
5. ¿Cómo usar la guía de aves?
6. Notas sobre taxonomía
7. Consideraciones sobre la presente guía de identificación
8. Descripción de las especies
9. Glosario de términos
10. Bibliografía
11. Lista de las aves del río La Novia

Presentación

Muchos coinciden en que las aves son el grupo más carismático del mundo animal. De diversidad manejable, de todos los colores, tamaños y comportamientos, son además un excelente indicador y representantes idóneos de la fauna de un lugar. La asociación “Manejo de Bosques Sin Fronteras del Río La Novia” (MABOSINFRON) también así lo ha entendido. Con los inventarios de aves dan uno de los primeros pasos firmes en la consolidación de la recién creada estación biológica hacia la ardua e importantísima tarea de administrar la concesión para conservación del río La Novia.

Resultado de este paso, nace una primera herramienta: la guía de aves del río La Novia. Esta guía es producto de investigaciones hechas desde la flamante estación en los meses de Agosto y Septiembre del 2015. La lista de aves que se conoce para la zona irá creciendo conforme se siga investigando. Así también seguirán otros grupos como los mamíferos, los reptiles, las ranas, los peces, los árboles, las orquídeas, etc.

Se dice que solo se cuida lo que se conoce. Así también, mientras más se conoce, con mayor eficiencia y sostenibilidad se pueden manejar los recursos. Los invitamos a conocer algo de los variados recursos naturales que conforman esta maravillosa área. Los principales involucrados en el uso sostenible de estos recursos deberán ser los pobladores locales que a través de la investigación, la cooperación y el turismo de naturaleza, entre otros, lograrán sus objetivos.

CORBIDI está entusiasmado en participar en iniciativas que como esta, generen conocimiento a través de la investigación; y ansiosos de ver como esa información permite un manejo sostenible de los recursos naturales. Agradecemos haber podido participar en este proceso y esperamos poder seguir aportando.

Thomas Valqui, Ph.D.
Presidente
CORBIDI



Socios de MABOSINFRON involucrados en el estudio de aves en el río La Novia.



La Monjita de Barbilla Leonada (*Nonnula sclateri*) es un ave poco común en la Amazonia del sur del Perú, y se puede encontrar en los bosques del río La Novia.



Agradecimientos



Queremos agradecer en primer lugar a los socios de la concesión para conservación de la asociación “Manejo de Bosques Sin Fronteras del Río La Novia” (MABOSINFRON) por las gestiones realizadas para crear la concesión, y por abordar la tarea de manejarla. También queremos agradecer a la World Wildlife Fund (WWF), quien nos dio la oportunidad de explorar el área del río La Novia, en especial a José Luis Mena Alvarez, Max Villacorta y a Heidi Rubio Torgler.

Por la invaluable ayuda en el campo, queremos agradecer a Jorge Novoa e Igor Lazo, ornitólogos que estuvieron en la expedición a La Novia. Asimismo, al personal de MABOSINFRON que nos apoyaron con la logística en campo, entre ellos Amancio Flores Lomas, Miguel Ruiz Pérez, Juan José Villanueva Saavedra, Deivis Meléndez Pacaya, Cesar Bardales Roque, Roy Ríos Rodríguez, Marco Meléndez Pacaya, Royer Campos Pinedo, Richard Meléndez López y Julio Minauro Salas. Asimismo, queremos agradecer al SERNANP y en especial a la jefatura y personal de la Reserva Comunal Purús, por permitirnos usar sus instalaciones para las evaluaciones en campo. Por trabajar en el diseño y contenido de la guía quiero agradecer a Jorge Novoa y Cynthia Zurita.

Institucionalmente queremos agradecer a CORBIDI y Thomas Valqui por el apoyo brindado. Asimismo, a las instituciones que han participado del proyecto Conservación del corredor Purus Manu , WWF, Sociedad Zoológica de Frankfurt, Pronaturaleza, Organización Regional AIDSESP Ucayali (ORAU), Care y Pro Purús; y a USAID quien a dado el apoyo financiero.



Vista del río La Novia en época seca.

INTRODUCCIÓN


Esta guía de campo de las aves de La Novia, contiene la descripción y dibujos de las especies registradas en la concesión para conservación de la asociación “Manejo de Bosques Sin Fronteras del Río La Novia” (MABOSINFRON). Dicha concesión tiene una extensión de 6700 hectáreas y se encuentra ubicada en la cuenca del río La Novia, el cual drena al río Purús. Políticamente está ubicada en el distrito y provincia de Purús, en el departamento de Ucayali. Las coordenadas y altura de la estación biológica que allí se encuentra son $9^{\circ}55'48.15''S$ / $70^{\circ}42'10.87''O$, a 261 metros sobre el nivel del mar.

Surcando el río La Novia en época seca con tangana.



La concesión para conservación Río La Novia


La concesión fue otorgada en el año 2012 por el Gobierno Regional de Ucayali y fue la primera concesión de conservación en la provincia de Purús. Cubre bosque de tierras bajas que limitan con la Reserva Comunal Purús y con tierras indígenas tituladas (ProPurús 2012). MABOSINFRON está impulsando la investigación como una de las principales acciones a realizar en la concesión y así asegurar el mantenimiento de la concesión y la conservación de especies de flora y fauna vulnerable. MABOSINFRON está integrada por líderes mestizos del cercano Puerto Esperanza, quienes se han comprometido a trabajar con los funcionarios de la Reserva Comunal Purús así como también con comunidades indígenas vecinas para proteger al área de la continua tala ilegal de otras amenazas (ProPurús 2012).



Evaluación de aves en el río La Novia.

Estación Biológica río La Novia al atardecer.







LEYENDA

- Puerto Esperanza
- Ríos
- Límites departamentales
- Concesión para la Conservación Río La Novia
- Reserva Comunal Purus
- Comunidades Nativas
- Parque Nacional Alto Purus
- Territorios Indígenas Brasil
- Área Natural Protegida Brasil

El corredor de conservación Purús-Manu

La concesión de MABOSINFRON se encuentra formando parte del corredor de conservación Purús-Manu, el cual comprende parte de los departamentos de Madre de Dios, Ucayali y Cusco. Este corredor representa la mayor extensión de Amazonía conservada en el Perú; es decir 10 millones de hectáreas de bosques. Los corredores de conservación favorecen la conservación de especies que requieren grandes superficies de bosques para su supervivencia, así como el mantenimiento de servicios ecosistémicos (Rubio *et al.* 2014).

Este corredor de conservación tiene dentro de su territorio a cinco áreas naturales protegidas: el Parque Nacional Alto Purús, la Reserva Comunal Purús, el Parque Nacional del Manu, además de cuatro reservas territoriales para indígenas en aislamiento.

En esta región nacen cuatro de las más importantes cuencas hidrográficas de la Amazonía: Yurúa, Purús, Acre y Sepahua (esta última es el nacimiento del río Ucayali), las cuales son fuente de agua para las poblaciones locales dentro de territorio peruano (en Madre de Dios y Ucayali), así como en territorio brasileño (Rubio *et al.* 2014).

En el río La Novia, cerca de su desembocadura en el río Purús está asentado el pueblo de San Jose.





Los pobladores locales usan el río La Novia como medio de transporte.

La Reserva Comuna Purús

La Reserva Comunal Purús fue creada en el año 2004 con una extensión de 202,033.21 hectáreas (SERNANP 2012). Es un área protegida de Uso Directo y se ubica en el distrito de Purús, provincia de Purús, Región de Ucayali. Su objetivo de creación es conservar la diversidad biológica del área y el manejo sostenible de los recursos para beneficio de las poblaciones locales que se encuentran en el área de influencia (ProPurús 2013). Además, la Reserva Comunal Purús conforma parte de la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Alto Purús.

La reserva busca adicionalmente fortalecer las capacidades locales en la gestión y conservación del área, a fin de que las comunidades nativas se involucren plenamente en las actividades de manejo, control y vigilancia de los recursos naturales.

Al interior de esta se fomenta la reproducción de tortugas, el desarrollo de actividades sostenibles como el manejo del paiche (*Arapaima gigas*), la cosecha de semillas de caoba (*Swietenia macrophylla*), entre otras actividades que aseguran el manejo sostenible de la diversidad biológica (SERNANP 2015).

102128 193111

204456 386222

306784 579334

409112 772

9024106 328664


8929115 308812

8834123 372860

8739132 640909

8644141 307769

8549149 074703




102128 193111

204456 386222

306784 579334

409112 772



MAPA DE UBICACIÓN



LEYENDA

- Corredor de Conservación Purús-Manu
- Cap departamento
- Interoceánica
- Lotes de hidrocarburos
- Límite internacional
- Límite departamental
- Ríos
- Petitorios y concesiones mineras
- Predios agrícolas
- Concesiones para castaña
- Concesiones para ecoturismo
- Concesiones de reforestación
- Concesiones forestales maderables
- Concesiones para conservación
- Comunidades nativas
- Reservas territoriales
- Territorios Indígenas Brasil
- Área Natural Protegida de Uso Directo
- Área Natural Protegida de Uso Indirecto
- Zona Reservada
- Área Natural Protegida Brasil

Sobre las aves de la Concesión de Conservación Río La Novia

La presente guía basa su contenido en el informe de Angulo (2015), que registró preliminarmente 335 especies representando 22 órdenes y 58 familias luego de una fase de campo en la concesión de conservación de MABOSINFRON. Dicha fase de campo duró 18 días y se dio entre los días 26 de Julio y 12 de agosto de 2015.

Del total de especies registradas, cuatro especies están categorizadas como amenazadas (categoría: Vulnerable) a nivel global (BirdLife International 2015) y dos a nivel nacional (DS.004-2014-MINAGRI). Solo una especie está amenazada según ambas categorizaciones: El Guacamayo de Cabeza Azul (*Primolius couloni*). No se registró ninguna especie endémica del Perú (Plenge 2015).

Se han registrado seis especies endémicas del Área de Endemismo de Aves (EBA) (Stattersfield *et al.* 1998) Tierras bajas del sureste peruano (literalmente: South-east Peruvian lowlands). Con respecto a la estacionalidad de las especies, se registró tres especies migratorias boreales y dos australes (Plenge 2015).

Asimismo, se han registrado 25 especies asociadas al bambú o paca (*Guadua* sp.) en mayor o menor grado (especialista obligado o facultativo), según Kratter (1997), Lebbin (2007) y Harvey *et al.* (2014).



La Monja de Frente Blanca (*Monasa morphoeus*) es un ave vistosa que puede ser vista en las ramas medias de los árboles, en busca de insectos para alimentarse.

Se ha encontrado además, tres especies que debido a su rareza (baja densidad) y uso como especies paraguas (P) (que justamente por baja densidad, a través de su conservación se benefician un grupo mayor de especies), así como porque el nombre específico hace referencia al área del río Purús (RP), es importante resaltar su presencia. Estas son: Paujil Común (*Mitu tuberosum*) (especie paraguas), Águila Harpia (*Harpia harpyja*) (especie paraguas) y el Jacamar del Purús (*Galbalcyrrhynchus purusianus*) (su nombre específico).

La imponente Águila Harpia (*Harpia harpyja*) es un depredador de monos y mamíferos grandes, que necesita áreas extensas de territorio para sobrevivir. Se le puede ver en el río La Novia



El Jacamar de Garganta Blanca (*Brachygalba albogularis*) se puede encontrar cazando mariposas en grupos pequeños en las orillas del río La Novia.



El Paujil Común (*Mitu tuberosum*), es un ave rara en muchos sitios de la amazonia peruana, debido a su constante cacería.

Descripción ecológica y hábitats

El área de estudio se encuentra en la margen derecha del Río La Novia. De acuerdo a Cornejo (2015), el terreno es disectado por innumerables quebradas y la fisiografía es de colinas. En el área se observa Paca o Bambú (*Guadua* sp.) en casi toda el área, pero sin formar unidades densas (pacaes). Cornejo (2015) encontró que el bosque en toda el área estudiada, desde la orilla de las quebradas hasta las partes más altas de las colinas, formaron una sola unidad fisiográfica. El sotobosque es dominado en toda el área por el arbusto Canilla de vieja (*Rinorea viridifolia*) y por el arbolillo *Paussandra trianae*. Cornejo (2015) no observó dominancia de alguna especie ni tampoco observó asociaciones vegetales.

De acuerdo a Cornejo (2015), las especies de ár-

boles más comunes son: Caucho (*Castilla ulei*), Estoraque (*Myroxylon balsamun*), Lupuna Negra (*Ceiba samauma*), Lupuna Blanca (*Ceiba pentandra*), Huimba (*Pseudobombax septenatum*), Lupuna colorada (*Cavanillesia umbellata*), Lupuna (*Chorisia integrifolia*), Zapote (*Matisia cordata*), Chemicua (*Pseudolmedia laevis*), Ubos (*Spondias mombin*), Remo Caspi (*Aspidosperma megaphyllum*), Tahuari (*Tabebuia serratifolia*), Yacushapana (*Terminalia oblonga*), Copaiba (*Copaifera reticulata*), Ishpingo (*Amburana cearensis*) y Manchinga (*Brosimum alicastrum*). Las especies de palmeras más comunes son Pona (*Iriartea deltoidea*), Huicungo (*Astrocaryum murumuru*), Shapaja (*Attalea butyracea*) y Yarina (*Phytelephas macrocarpa*).



Hábitats

Las especies de aves pueden ser encontradas en una gran variedad de hábitats. Algunas pueden estar restringidas a tan solo uno o dos hábitats en particular, pero también, hay aves más generalistas que no muestran preferencias por algunos de estos ambientes.

En función a lo encontrado referente a la vegetación, se han determinado los siguientes hábitats:

- Bosque de colinas bajas (B): Es la gran mayoría de la concesión del río La Novia. Se refiere al bosque en general, tanto a la parte alta y baja de las colinas, las laderas y aéreas planas. Tal como se describe arriba, no se han hallado mayores diferencias con respecto a los tipos de bosque al interior de este.

- Áreas con presencia de Paca o Bambú (*Guadua* sp.) (P): Si bien en el área no existen Pacales, es decir, aéreas extensas cubiertas de este bambú, si existen aéreas donde hay presencia de la especie, especialmente a lo largo de las quebradas grandes.

- Áreas abiertas (A): Sitios abiertos (sin vegetación), como el área del campamento y claros deforestados, como aquel que se ubica en el límite norte de la concesión, de aproximadamente dos hectáreas.

- Vegetación ribereña (R): Se refiere a la vegetación adyacente al río La Novia que se encuentra al lado de este, en las playas dejadas por el río y el río mismo.

- Todos los hábitats (G): Se usa esta clasificación para aquellas especies que pueden ser encontradas prácticamente en cualquiera o en todos los hábitats descritos. Así también, se incluye en este hábitat a especies que suelen tener largos vuelos planeando en el aire o que son extremadamente abundantes.

Para cada especie se detalla en qué hábitat existe la mayor posibilidad de encontrarla. Finalmente, se detalla cual es la evidencia de la presencia de cada especie. Si es foto (F), observado (O), grabado (G) o capturado en redes (C).



Vista aérea del bosque cerca del río Purús época seca.

¿Cómo usar la guía de aves?

Una guía de identificación de aves tiene la función de ser una herramienta de ayuda para identificar a las aves observadas en un lugar determinado. Una guía específica para un lugar incluye la lista de especies registradas en ese sitio y, de manera paralela, describe las especies en función al resto de las presentes en el lugar escogido. Es decir, si en un lugar determinado existen cinco especies de garzas, de las 20 que hay en el Perú, la descripción de estas se hace de tal manera que se pueda lograr diferenciar cada una de las cinco garzas presentes en el área y de esta manera determinar en qué hábitats se les encuentra para facilitar su observación.

Esto facilita el proceso de identificación, el cual puede ser complicado para un ojo poco entrenado y novato en el tema. Una guía específica de un lugar filtra la información de las aves del Perú para ofrecerle al usuario un conjunto reducido de opciones, donde existen altas probabilidades que el observador de aves encuentre la especie en cuestión. En el caso de que existan una o más especies que pueden ser confundidas con otras similares, se hace hincapié en los detalles que ayudan a diferenciarla de estas, tales como el tamaño, los colores, las formas, las proporciones, los hábitos de comportamiento, etc.

Para los observadores de aves, tanto expertos como novatos, es una ventaja poder contar con una guía de identificación específica de un lugar, ya que les facilita la identificación de especies, lo cual, muchas veces, puede ser muy difícil. Asimismo, es necesario anotar que estas guías de campo son poderosas herramientas para la educación ambiental, debido a que proporcionan



Ornitólogos y pobladores locales durante la evaluación de aves en el río La Novia.

información relevante para entender cómo está compuesto el ecosistema y cuáles son las especies que de él dependen.

Esta guía está elaborada de tal manera que facilita la rápida identificación de las especies presentes. De manera general se observan las siguientes secciones: 1) Nombre del ave; 2) Categoría de Amenaza; 3) Endemismo; 4) Estacionalidad; 5) Descripción del ave; y 6) Hábitat. Para algunas especies, cuando existe la información disponible, se ha considerado alimentación. Estas secciones se describen a continuación:



1. Nombre del ave

El nombre de cada ave tiene inicialmente el nombre en español, luego científico entre paréntesis y luego el nombre en inglés. Para los nombres en castellano, en inglés y científicos, se ha utilizado la nomenclatura propuesta por Plenge (2015) en la Lista de Aves del Perú. Dicha lista usa la última versión de la taxonomía vigente según el South American Classification Committee de la American Ornithologists' Union (Remsen *et al.* 2015). La secuencia en que se presenta las especies de aves corresponde al orden taxonómico.

2. Categoría de Amenaza


Se detalla a través de códigos con letras, si la especie está amenazada a nivel nacional y/o global y en qué categoría de amenaza se encuentra (ver sección de Sobre las aves de la Concesión para Conservación Río La Novia). La categoría de amenaza de las especies se determina principalmente en función al tamaño y tendencia de su población, y del tamaño de su área de distribución. Mientras más pequeños sean estos parámetros, más amenazada estará una especie. La categoría de mayor amenaza es "Peligro Crítico", seguida de "En Peligro", y al

final, esta la categoría de "Vulnerable". La jerarquía completa de las categorías de amenaza de las especies se explica usando el Cuadro N° 1 (UICN 2012).

Dentro de la Concesión para Conservación Rio La Novia se han reportado únicamente especies en la categoría Vulnerable (VU). Las especies que no están dicha categoría están consideradas como de "Preocupación Menor" (LC).

Cada especie consigna primero su categoría de amenaza para Perú y luego global, de la siguiente manera: (Perú / Global). En el caso de especies que estén únicamente categorizadas como amenazadas globalmente, estas presentan la siguiente anotación: (*).

Para mayor detalle de los criterios usados para determinar si una especie está incluida dentro de una categoría de amenaza, se sugiere revisar el documento "Categorías y Criterios de la Lista Roja de la UICN: Versión 3.1" (UICN 2012).



Cuadro N° 1. Categorías de Amenaza de la IUCN. Fuente: UICN (2012). Categorías y Criterios de la Lista Roja de la UICN: Versión 3.1. http://www.iucnredlist.org/documents/redlist_cats_crit_sp.pdf

Nótese que las siglas no siempre coinciden con el nombre en español. Esto se debe a que las siglas provienen del inglés.

3. Endemismo

Se indica con la denominación “EBA” si la especie es endémica del Área de Endemismo de aves “Tierras bajas del sureste peruano (literalmente: South-east Peruvian lowlands)”. Las aves endémicas son especies que habitan exclusivamente en una región del planeta. La gran mayoría de ellas tienen requerimientos ecológicos especiales (alimento, hábitat, clima), por lo que dependen de lugares muy singulares para sobrevivir. Su rango de distribución está normalmente restringido a un área menor a los 50,000 km². Las regiones donde estas especies habitan se llaman “Áreas de Endemismo” (EBA, por sus siglas en inglés Endemic Bird Areas).

Las aves endémicas de las Áreas de Endemismo fueron identificadas según la lista de Stattersfield *et al.* (1998). Se puede encontrar mayor información sobre esta EBA en la página web de BirdLife International (2015) <http://www.birdlife.org/datazone/ebafactsheet.php?id=55>.

4. Estacionalidad

Se señala si un ave es estacional o migrante. Existen especies que son residentes, es decir, se encuentran ahí durante todo el año. Otras especies son migratorias y se les registra únicamente durante una parte del año. Existen dos tipos de migratorias: boreales (B) y australes (A). Las especies que no están señaladas como estacionales, son residentes.

Los migrantes boreales arriban desde el hemisferio norte (Estados Unidos, Alaska, Canadá) entre agosto y noviembre y permanecen en el área hasta mayo – abril, momento en que retornan al hemisferio norte para reproducirse.

Las migratorias australes se reproducen en la parte sur del continente americano entre diciembre y febrero y migran hacia el norte entre marzo y octubre.

5. Descripción del ave

Se hace referencia de su coloración y forma, resaltando las características más notorias que ayudan a su identificación en campo. La mayoría de veces se describe al macho adulto y, en caso que la hembra adulta y el juvenil son iguales al macho adulto, no se hace mención de estos. Sin embargo, si la hembra y el juvenil son diferentes, se describe sus respectivos plumajes. Para la descripción se utiliza términos generales y de común dominio, sin embargo, muchos de ellos son técnicos y para una mejor familiarización han sido esquematizados en el dibujo “Partes de un ave” y/o descritos en la sección “Glosario de Términos”.

6. Hábitat

Según la descripción hecha en la sección de hábitat.



El Saltarín de Cola Bandeada (*Pipra fasciicauda*) es un ave del interior del bosque que realiza elaborados cortejos y bailes de apareamiento.

Notas sobre taxonomía

Al final de la guía se presenta la lista anotada de la avifauna, con claves (letras), resumiendo la información de cada descripción. El orden que presenta la lista es taxonómico y señala las familias a las que pertenecen las especies de aves descritas como se detalla en el cuadro N° 2.

NOMBRE EN CASTELLANO	NOMBRE CIENTIFICO	NOMBRE EN INGLES	Amenaza IUCN
Orden			
Fam			
Perdiz Gris	<i>Tinamus tao</i>	Gray Tinamou	VU

La lista de aves presentada en esta guía está actualizada con la última versión de la lista de aves del Perú (Plenge 2015). Es decir, tiene la taxonomía que se usa actualmente. Sin embargo, dado que en los últimos años ha surgido un acelerado avance en el conocimiento de la taxonomía de las aves, debido al reciente desarrollo de la filogenética molecular que utiliza técnicas nuevas que incluyen el estudio de la estructura genética (ADN), tal situación ha conllevado a que se den muchos cambios que se reflejan en los nombres científicos de las aves.

Estos cambios están referidos al género o al nombre de la especie en algunas aves, cambios completos del nombre científico en otras; e incluso, en algunos casos, hasta cambios en la familia en la que estaban incluidas.

Por esta razón, se ha creído conveniente incluir un cuadro donde se hace una recopilación de estos cambios recientes y donde se lista los sinónimos de los nombres usados en esta guía. Los nombres usados han cambiado en los últimos 15 años, por ende, los sinónimos son nombres con los que bien podría conocerse una especie en otra publicación, guía, manual, etc.

Un ejemplo de ello es el siguiente; en muchos trabajos y guías pasadas, el nombre científico del Gavilán Pizarroso figura como *Buteogallus schistaceus*. Estudios recientes (Raposo do Amaral *et al.* 2009) han confirmado que el género correcto para esta especie es *Leucopternis*. Por consiguiente, actualmente su nombre científico correcto es *Leucopternis schistaceus*. En el Cuadro N° 3 se lista los casos similares con las aves presentes en la concesión Río La Novia.

Cuadro N° 3. Casos de cambios en los nombres científicos de aves presentes en el Río La Novia.

Nombre científico (correcto)	Sinónimo (antiguo e incorrecto)
<i>Mitu tuberosum</i>	<i>Crax tuberosa</i> , <i>Mitu tuberosa</i>
<i>Ardea alba</i>	<i>Ardea alba</i> , <i>Casmerodius alba</i>
<i>Buteogallus schistaceus</i>	<i>Leucopternis schistaceus</i>
<i>Rupornis magnirostris</i>	<i>Buteo magnirostris</i>
<i>Pseudastur albicollis</i>	<i>Leucopternis albicollis</i>
<i>Sternula superciliaris</i>	<i>Sterna superciliaris</i>
<i>Patagioenas plumbea</i>	<i>Columba plumbea</i>
<i>Patagioenas subvinacea</i>	<i>Columba subvinacea</i>

Amenaza PERU	Endemismo	Migratoria	Abundancia	Hábitat	Evidencia
TINAMIFORMES					
Familia TINAMIDAE					
			C	B	G

Cuadro N° 2. Forma en que se presenta la lista de aves de La Novia.

Nombre científico (correcto)	Sinónimo (antiguo e incorrecto)
<i>Megascops watsonii</i>	<i>Otus watsonii</i>
<i>Pseudoscops clamator</i>	<i>Rhinoptynx clamator</i> , <i>Asio clamator</i>
<i>Antrostomus sericocaudatus</i>	<i>Caprimulgus sericocaudatus</i>
<i>Trogon ramonianus</i>	<i>Trogon violaceus</i>
<i>Megaceryle torquata</i>	<i>Ceryle torquata</i>
<i>Ibycter americanus</i>	<i>Daptrius americanus</i>
<i>Pyrilia barrabandi</i>	<i>Pionopsitta barrabandi</i>
<i>Orthopsittaca manilatus</i>	<i>Ara manilatus</i> , <i>Ara manilata</i>
<i>Primolius couloni</i>	<i>Ara couloni</i>
<i>Ara chloropterus</i>	<i>Ara chloroptera</i>
<i>Psittacara leucophthalmus</i>	<i>Aratinga leucophthalmus</i>
<i>Epinecophylla leucophthalma</i> M	<i>Myrmotherula leucophthalma</i>
<i>Epinecophylla ornata</i>	<i>Myrmotherula ornata</i>
<i>Hypocnemis subflava</i>	<i>Hypocnemis cantator</i>
<i>Cercomacroides serva</i> C	<i>Cercomacra serva</i>
<i>Willisornis poecilinotus</i>	<i>Hylophylax poecilinotus</i>
<i>Syndactyla ucayalae</i>	<i>Simoxenops ucayalae</i>
<i>Clibanornis rubiginosus</i>	<i>Automolus rubiginosus</i>
<i>Empidonomus aurantioatrocristatus</i>	<i>Griseotyrannus aurantioatrocristatus</i>
<i>Sirytes albocinereus</i>	<i>Sirytes sibilator</i>
<i>Ceratopipra chloromeros</i>	<i>Pipra chloromeros</i>
<i>Tunchiornis ochraceiceps</i> H	<i>Hylophilus ochraceiceps</i>
<i>Pachysylvia hypoxantha</i>	<i>Hylophilus hypoxanthus</i>
<i>Pheugopedius genibarbis</i>	<i>Thryothorus genibarbis</i>
<i>Myiothlypis fulvicauda</i>	<i>Phaeothlypis fulvicauda</i>

Consideraciones sobre la presente guía de identificación

La lista presentada incluye las especies registradas a la fecha y ha sido elaborada de tal manera que sea lo más completa posible. No obstante, es probable que en el futuro se registre en el lugar especies no incluidas en esta lista.

Si el usuario de esta guía de identificación logra registrar alguna especie nueva, se recomienda documentarla de la mejor manera posible (fotos, grabaciones de canto, descripción detallada del ave, lugar del registro, hábitat, fecha, hora, circunstancia, etc.) y comunicarse con la administración de la concesión para proporcionarle esta valiosa información. De esta manera, se colaborará con el conocimiento del área y se ayudará a enriquecer futuras versiones de la guía.

Monja de Frente Negra (*Monasa nigrifrons*) es un ave que puede ser vista en las ramas medias de los árboles, en el río La Novia.



Ornitólogos y pobladores locales fotografiando las aves capturadas en las redes.



En las descripciones de las especies de aves no se ha incluido sus cantos, salvo en contadas excepciones. Para oír los cantos de las especies presentes, se recomienda usar Schulenberg et al. (2000a,b,c), Boesman (2009), Coopmans et al. (2004) y los archivos de la Macaulay Library of Natural Sounds de la Universidad de Cornell (<http://macaulaylibrary.org>) y de Xeno-Canto (<http://www.xeno-canto.org>). Indudablemente, las vocalizaciones de las aves son de extraordinaria ayuda para su identificación, por lo que se recomienda complementar la información de esta guía con cantos.

Ermitaño Rojizo (*Phaethornis ruber*), uno de los colibrís más pequeños de la selva.



El Shansho o Hoazín (*Opisthocomus hoazin*) es un ave de apariencia primitiva, que se alimenta de hojas y siempre está cerca de cuerpos de agua, como el río La Novia.



Perdiz gris

(*Tinamus tao*)

Gray Tinamou

-- / VU

43 - 46 cm

Nombre local

Grande, con cabeza negruzca y pecas blancas detrás de los ojos. Pico gris y semicurvado. Iris rojo. Plumaje marrón-grisáceo, oscuro en la base del cuello y parte dorsal y castaño claro en la parte ventral y anal. Cola corta. Patas grises. Canto crepuscular de intervalos largos, sonando como "juuuu". A veces emite un solo silbido tembloroso, pero no en serie. Se le encuentra dentro del bosque.



Perdiz grande

(*Tinamus major*)

Great tinamou

38 - 43 cm

Nombre local

Medianamente grande, con cabeza pequeña y cuello muy delgado, ambos de color rufo. Plumaje gris - castaño, garganta blancuzca. Espalda y alas, con barras y algunas manchas negras; y vientre más claro. Patas de color gris. Canto crepuscular, a manera de silbidos temblorosos, emitidos normalmente en serie de 4, asemejándose al ritmo del corte de un serrucho. Se le encuentra dentro del bosque.



Perdiz cinérea

(*Crypturellus cinereus*)

Cinereous tinamou

30 - 30,5 cm

Nombre local

De tamaño mediano, color uniforme y oscuro. Plumaje marrón oscuro a marrón ceniza gris. Corona y nuca marrón rojizo y garganta barreada. Pico gris amarillento y patas amarillo opaco. Solos o en pareja. El canto es un silbido claro y nivelado, repetido a intervalos regulares de 5 segundos o más. Suena como "pan-gua-na". Se le encuentra en bosque ribereño, siempre cerca de áreas abiertas y de los ríos y quebradas.





30 - 30,5 cm

Perdiz chica
(*Crypturellus soui*)
Little tinamou

Nombre local

Pequeña y rechoncha, tiene el dorso café grisáceo sin marcas, y vientre canela brillante. Corona más oscura. Cuello pardusco, con garganta blanquecina. Iris naranja y patas gris amarillento opaco. Hembras más brillantes. Canto es crepuscular, una serie de silbidos vibrantes, de tono ascendente, que van acelerándose. Se le encuentra dentro del bosque.

Perdiz parda
(*Crypturellus obsoletus*)
Brown tinamou

25,5 cm

Nombre local

De tamaño mediano y plumaje castaño. Cabeza y cuello grises, más oscuro en la corona. Garganta gris clara. Pecho, espalda y alas castaño rufo, con un tono beige más claro vientre y flancos. Iris marrón, pico ligeramente curvo, negro azulado. Patas amarillo opaco. Hembras más grandes y más rufas. Rara de observar, pero fácil de oír. El canto es una larga serie de frases timbrantes de tono ascendente, que se aceleran casi hacia el final: "rrrrrrrrrrrio...rrrio...rrrio rrrio, rrri-rrri-rrri'rrri ¿riii? Se le encuentra dentro del bosque.

Perdiz ondulada
(*Crypturellus undulatus*)
Undulated tinamou

25,5- 26,5 cm

Nombre local

Mediana, de color oscuro y barreada. Cabeza y cuello café, corona gris oscura, pico negro y garganta blanca moteada. Espalda gris pardusco con finas barras transversales negras. Vientre claro, gris ocre. Cola gris pardusca con estrías negras. Patas gris verdosas. El nombre deriva de su silbido, que son 3 o 4 notas silbantes profundas. Se le encuentra en bosque ribereño, cerca de áreas abiertas y de los ríos y quebradas.

Perdiz de gorro negro

(*Crypturellus atrocapillus*)

Black-capped tinamou

Nombre local

Es una perdiz pequeña con corona negra, a manera de gorra, que contrasta con la garganta y abdomen que son canela rufo. Pecho gris oscuro, espalda, alas y rabadilla marrón con barrado negro. Vientre beige. Pico castaño oscuro o negro. Patas rojo brillante. Hembra más barrada y de colores más apagados. Se les puede encontrar en áreas donde predomina el Bambú.

28,5 - 31 cm



Perdiz abigarrada

(*Crypturellus variegatus*)

Variegated tinamou

Nombre local

Pequeña, de marcado barrado y plumaje vivo. Cabeza negruzca y garganta blanca. Espalda marrón oscuro con densas barras negras, contrastando con el pecho y cuello que son rufo brillante, haciéndose más claro en el vientre. Rabadilla y alas negras con barras amarillentas. Patas verde grisáceo, pico negro con base blanquecina amarillenta. Se le encuentra dentro del bosque.

25,5 - 26,5 cm



Perdiz de Bartlett

(*Crypturellus bartletti*)

Bartlett's tinamou

Nombre local

Perdiz pequeña de color variado. Algunos opacos y marrones y otros leonado brillante. Corona negruzca, espalda, alas y rabadilla marrón con barrado negro, garganta y vientre blanco, cuello y pecho rufo. Flancos barrados de negro. Patas amarillentas. Se le encuentra en bosque ribereño, cerca de áreas abiertas y de los ríos y quebradas.

23 - 24 cm





84 - 91,5 cm

Gritador unicornio - Camungo

(*Anhima cornuta*)

Horned screamer

Nombre local

Ave robusta y grande, con un cuerno largo que sobresale hacia adelante desde la corona, y espolones en las alas. Plumaje gris o negro y se va desvaneciendo en un vientre blanco. Cuello largo y la parte superior de las alas blanco moteado. Pico corto, marrón o negro. Iris naranja brillante. Tarsos de color gris. Vive en parejas o grupos familiares. Descansa sobre árboles altos. Su canto es inconfundible, se oye a grandes distancias y suena como su nombre común "camungo".



76 - 84 cm

Pava de Spix

(*Penelope jacquacu*)

Spix's guan

Nombre local

Cuello largo, piel desnuda alrededor del ojo azul grisáceo. Garganta y barbilla de color rojo brillante. De color marrón olivo con manchas pálidas en la cabeza, cuello, pecho y espalda. Parte baja del pecho y vientre pardo rufo. Patas de color rojo. Se alimenta de frutas, actuando como dispersor de semillas. Se le puede encontrar en las copas de los árboles del bosque.



49,5- 52 cm

Chachalaca jaspeada

(*Ortalis guttata*)

Speckled chachalaca

Nombre local

Tiene la cabeza, cuello y pecho castaño oscuro con manchas pequeñas más claras. Espalda, alas y las cuatro plumas centrales de la cola, pardo oliváceo. Vientre grisáceo. La piel desnuda alrededor del ojo es negra, la garganta y la barbilla son rojo brillante. La cola es larga y ancha. Patas rojas. Canto bullicioso, que suena como "ma-na-ca-ra-co".

Pava de garganta azul

(*Pipile cumanensis*)

Blue-throated piping-guan

68,5 - 73,5 cm

Nombre local

De color negro brillante, con el pico blanco en la base y azul en la punta. Garganta azul, piel alrededor del ojo, plumas de la cresta y la nuca, blanco. Alas y pecho salpicados de blanco. Patas rojo intenso, cola larga y negra. Se le ve solitaria o en parejas en las copas de los árboles dentro del bosque y en las orillas de los ríos y quebradas.



Paujil común

(*Mitu tuberosum*)

Razor-billed curassow

83 - 89 cm

Nombre local

Esta garza tiene una variedad de colores que la hace verse bastante vistosa. La cabeza es gris celeste en la corona y negro a los lados, el cuello es rufo y el cuerpo verdoso en la espalda y alas y rufo en el pecho. Las patas son amarillas y el pico gris. Se le ve solitaria en quebradas.



Codorniz enmascarada

(*Odontophorus stellatus*)


Starred wood-quail

24 - 26,5 cm

Nombre local

Pequeña y de plumaje moteado. Nuca, garganta y espalda gris, con márgenes castaños en el dorso. Vientre marrón rufo con barreado negruzco y manchas blancas en el pecho. Cola negruzca; alas pardas con puntos blancos. La piel desnuda alrededor del ojo amarilla. Cresta rojiza en el macho y castaño en la hembra. Iris anaranjado, pico negro y patas grises. Se le ve caminado por el suelo en grupos pequeños. Su canto suena como "Po-ro-to-huan-co".





Garza tigre colorada

(Tigrisoma lineatum)

Rufescent tiger-heron

Nombre local

Esta garza tiene el cuello grueso y de color ladrillo, con una línea blanca desde la garganta al pecho. El cuerpo es rechoncho y marrón por encima y grisáceo por debajo. El pico es oscuro y tiene amarillo en la cara. Su canto, que se escucha al amanecer suena como un resoplido grave. Se le ve sola o en parejas en las orillas de los ríos y quebradas.



-- / VU

63,5 - 71 cm

Garza de pecho castaño

(Agamia agami)

Agami heron

Nombre local

Esta garza tiene una variedad de colores que la hace verse bastante vistosa. La cabeza es gris celeste en la corona y negro a los lados, el cuello es rufo y el cuerpo verdoso en la espalda y alas y rufo en el pecho. Las patas son amarillas y el pico gris. Se le ve solitaria en quebradas.



56 - 61 cm

Huaco común

(Nycticorax nycticorax)

Black-crowned night-heron

Nombre local

Esta garza es mayormente nocturna. Tiene el cuello corto y cuerpo abultado. La corona y espalda son negras, las alas gris claro y el resto blanco. Tiene dos plumas largas en la cabeza. El pico es negro y las patas amarillas. El juvenil es marrón con pintas cremas, con pecho y vientre cremas con pintas marrones.

Garza cuca

(*Ardea cocoi*)

Cocoi heron

Nombre local

Es una garza grande, de cuerpo gris, cuello y pecho blancos, patas negras, pico amarillo y con una máscara y corona gris oscuro. En la parte delantera del cuello tiene una línea segmentada gris oscuro que baja de la garganta al pecho. Se le ve buscando alimento en las playas de los ríos. Al volar, encoge el cuello, dando la impresión de ser más pequeña.

104 - 127 cm



Garza grande

(*Ardea alba*)

Great egret

Nombre local

Es una garza grande, completamente blanca, con el pico largo, en punta y amarillo y las patas grises. Se le ve buscando alimento en las playas de los ríos, especialmente en playas grandes. Al volar, encoge el cuello.

91,5 - 99 cm



Garcita blanca

(*Egretta thula*)

Snowy egret

Nombre local

Es muy parecida a la garza grande, ya que también completamente blanca, pero es más pequeña, con el pico negro, patas negras y los pies amarillos. Se le ve buscando alimento en las playas de los ríos, especialmente en playas grandes.

24 - 26,5 cm





53,5 - 58,5 cm

Garza pileada (*Pilherodius pileatus*) Capped heron

Nombre local

Es una garza mediana, con el cuerpo blanco humo, el cuello amarillento, la corona negra, y la cara celeste. Las patas son grises y en la cabeza tiene dos plumas largas que sobresalen por la nuca. Se le ve solitaria en la orilla de ríos y quebradas.



56 - 58,5 cm

Ibis verde (*Mesembrinibis cayennensis*) Green ibis

Nombre local

Es negro con tonos verdes iridescentes. La garganta y la parte delantera de la cabeza son gris mate, al igual que la piel alrededor del ojo y la barbilla, ambas desnudas. Pico verde, largo y curvo. Iris marrón pálido. Lados del cuello, espalda, rabadilla y alas son brillantes de color verde esmeralda. Vientre negro mate. Patas cortas verdes grisáceas. Se le ve caminando en el cauce de las quebradas o pasando al vuelo.



60 - 65 cm

Gallinazo de cabeza negra (*Coragyps atratus*) Black vulture

Nombre local

Su plumaje es de color marrón negruzco. Cabeza pequeña y desnuda, de color rojo, con una franja blanco azulada en la parte posterior del cuello. Pico corto, ganchudo, de color marfil. El iris es marrón-grisáceo. Patas rosadas, aunque a menudo con manchas blancas. La cola y las alas son largas y estrechas. Se alimentan de animales muertos, los cuales encuentran por el olor.

Gallinazo de cabeza roja

(*Cathartes aura*)

Turkey vulture

60 - 70 cm

Nombre local

Es negro verdoso brillante. La garganta y las partes laterales de la cabeza no tienen plumas. La piel de la cabeza tiene un color que varía desde amarillo oscuro hasta naranja pálido. La corona es de color azul grisáceo. La nuca y la cera son rosadas. La cola es redondeada y relativamente larga, y se extiende más allá de la punta del ala cerrada. Se alimentan de animales muertos, los cuales encuentran por el olor.



Gallinazo de cabeza amarilla Mayor

(*Cathartes melambrotus*)

Greater Yellow-headed Vulture

68 - 75 cm

Nombre local

Es de color negro lustroso. La cabeza y cuello son desnudos, de piel arrugada y color gris oscuro. Las alas son anchas, relativamente cortas. Su cola es corta y cuadrada. Las fosas nasales son perforadas. El iris es marrón oscuro. El pico largo y delgado, es negro, con punta de marfil. Sus tarsos son color blanco grisáceo, dedos largos, con pequeñas bandas en sus bases. Se alimentan de animales muertos. Se le puede ver solitario hasta en grandes grupos, mayormente planeando en el cielo.



Gallinazo rey

(*Sarcoramphus papa*)

King vulture

70 - 75 cm

Nombre local

Es grande y blanco, matizado de rosa-amarillo. Las coberturas de las alas, las plumas de vuelo y la cola son gris oscuro / negro, como el collar del cuello. Cabeza y cuello sin plumas; la piel tiene tonos rojo y morado en la cabeza, naranja profundo en el cuello y amarillo en la garganta. Tiene una notable cresta. Pico naranja con base negra. Cola corta, ancha y cuadrada. Iris blanco, rodeado de rojo brillante. Se alimentan de animales muertos.





52 - 62 cm

Elanio tijaereta (*Elanoides forficatus*) Swallow-tailed kite

Nombre local

Rapaz mediana con la cabeza, cuello, pecho, nuca, el forro de las alas y vientre es blanco. Las alas son largas y puntiagudas, bordeadas de negro. La cola es larga y profundamente bifurcada. El iris es color café oscuro. El pico y cera, azul. Las patas cortas, color azul grisáceo. Se le suele ver al vuelo, donde es notoria su cola larga como una tijera.



VU / --
89 - 102 cm

Aguila harpía (*Harpia harpyja*) Harpy eagle

Nombre local

Águila grande y robusta. Cabeza y cuello gris pálido, cresta negra larga y eréctil que se divide en dos. Pecho, espalda y alas negros. Vientre blanco con barreado negro en los calzones, flancos y región anal. La cola gris, bandeada en blanco y negro. El iris café. La cera y el pico, fuertemente enganchado, es grueso, de color negro. Las patas son amarillas y bastante grandes y fuertes. Se alimenta principalmente de monos y osos perezosos.



60 - 66 cm

Aguila negra (*Spizaetus tyrannus*) Black hawk-eagle

Nombre local

Tiene plumaje negro brillante y una cresta negra con bases blancas. El pecho tiene rayas marrones y el vientre es moteado en blanco y negro. Alas inferiores barradas en blanco. Espalda marrón grisácea. Cola larga, barrada en color gris oscuro. Tarsos y calzones emplumados, con un barreado blanco. El iris es naranja brillante, la cera, negruzca y el pico, negro azulado. Se le ve a menudo planeando y cantando cerca del mediodía.

Aguila penachuda

(*Spizaetus ornatus*)

Ornate hawk-eagle

56 - 62 cm

Nombre local

Águila grande, con la cabeza, nuca, lados del cuello y pecho son de color canela. Barbilla y garganta blancas, delineadas por una línea malar negra. Espalda pardo oscuro, alas negras satinadas. Vientre y calzones blancos barreteados de negro. La cola tiene tres bandas color café. Las patas son emplumadas. El iris es color ámbar con un anillo orbital gris oliva. Se le ve a menudo planeando y cantando cerca del mediodía.



Elanio bidentado

(*Harpagus bidentatus*)

Double-toothed kite

29 - 35 cm

Nombre local

Una rapaz mediana, generalmente gris ceniza, con la espalda y rabadilla de color negro. Las alas largas y puntiagudas, negras, tienen un parche rojizo vistas por debajo. Cola negra con dos bandas blancas. El iris es rojo brillante. Cera negra, patas naranja rojizo. Se le suele ver planeando en el cielo o posada en bordes de bosque o ríos.



Elanio plumizo

(*Ictinia plumbea*)

Plumbeous kite

34,5 - 37cm

Nombre local

Esta garza tiene una variedad de colores que la hace verse bastante vistosa. La cabeza es gris celeste en la corona y negro a los lados, el cuello es rufo y el cuerpo verdoso en la espalda y alas y rufo en el pecho. Las patas son amarillas y el pico gris. Se le ve solitaria en quebradas.





36 - 37cm

Gavilán bicolor

(*Accipiter bicolor*)

Bicolored hawk

Nombre local

Corona, nuca, espalda y alas gris pizarra oscuro. Garganta y el pecho superior son de color gris claro. Vientre gris claro a gris blanquecino. Tiene calzones rufos y la cola bastante larga, negra con tres barras grises. Iris amarillo intenso. La, cera y los tarsos son de color amarillo y el pico color negro. Es bastante rápida y difícil de ver. Se alimenta de aves pequeñas.



42 - 46 cm

Gavilán zancón

(*Geranospiza caerulescens*)

Crane hawk

Nombre local

Gris azulado, de cabeza pequeña. Iris de color rojo carmesí, cera y pico negro, pequeño y delgado. El vientre, calzones y parte de las alas tienen un barrado blanco muy fino, con tonos más claros que en el pecho. La cola, color negro, con dos bandas blancas anchas, y la banda basal más amplia entre los dos. Sus tarsos son largos y delgados, color rojo naranja. Se le ve en borde de bosque o planeando.



45 - 48cm

Gavilán pizarroso

(*Buteogallus schistaceus*)

Slate-colored hawk

Nombre local

Grande y robusto, de plumaje gris pizarra. La cabeza es más oscura que el resto del cuerpo. La cola, delgada y corta, negra con una sola banda subterminal blanca. El iris es de color amarillo, cera de color naranja. El pico, curvado, es negro con base de naranja. Patas naranja. Se le suele ver en el bosque al borde de ríos y quebradas.

Gavilán negro

(*Buteogallus urubitinga*)

Great black hawk

55 - 63 cm

Nombre local

Gavilán de textura robusta y color negro, con alas muy anchas. La cola es corta, blanca con una amplia banda subterminal negra. El iris café oscuro, cera amarillo opaco y el pico amarillo con punta negra. Los tarsos son largos, de color amarillo. Se le suele ver en el bosque al borde de ríos y quebradas.



Aguilucho Caminero

(*Rupornis magnirostris*)

Roadside hawk

34 - 40cm

Nombre local

Cabeza, garganta y espalda gris parduzco, pecho, vientre y calzones beige, con un barrado marrón y blanco con tonos rufo. Alas muy cortas y redondeadas, con un parche rufo. Cola larga, con la base blanca con barrado hacia el final. Tiene dos rayas negras altamente visibles en el extremo de la cola. Iris y cera amarillo claro. Pico amarillo con punta negra. Tarsos amarillos. Bastante común en sitios abiertos.



Gavilán blanco

(*Pseudastur albicollis*)

White hawk

47 - 50 cm

Nombre local

De color general blanco con antifaz negro. La nuca es manchada de negro. Espalda y hombros negros. La cola es corta con banda subterminal negra y las alas anchas. Iris café oscuro. La cera es gris y el pico tiene la base de color gris claro, la punta gris oscuro a negro. Patas amarillas. Se le suele ver en borde de bosque.





45 - 52 cm

Trompetero de ala blanca

(*Psophia leucoptera*)

Pale-winged trumpeter

Nombre local

De color general negro, con el cuerpo rechoncho y aspecto jorobado. La espalda es negra y termina en una prominente rabadilla de color blanco. Cuello largo con tonos púrpura brillantes. Alas superiores negras con tonos azul verdosos brillantes y en la parte inferior son blanco pálido. Pico amarillo, corto y puntiagudo. Patas largas y grises. Se le encuentra en grupos de 3 a 10 individuos dentro del bosque.



33 - 38 cm

Rascón-montés de cuello gris

(*Aramides cajaneus*)

Gray-necked wood-rail

Nombre local

Cabeza y cuello grises con la corona posterior y nuca marrón. Espalda pardo olivo. Garganta blanca; pecho, flancos y vientre son canela rufo. Rabadilla, calzones y cola negros. El iris es color rojo, el pico es amarillo verdoso brillante y las patas son rojo coral. Se le puede encontrar en y cerca de las quebradas.



20,5 - 21 cm

Gallineta unicolor

(*Amaurolimnas concolor*)

Uniform crake

Nombre local

El plumaje general es pálido, de color rojizo. Los lados de la cabeza son color café grisáceo, tornándose en café oliváceo hacia la nuca y espalda. Pecho y vientre rojizos, más claro en garganta. Iris y patas rojos. El pico relativamente corto, sin brillo, verde amarillento. Se le encuentra dentro del bosque.

Tigana

(*Eurypyga helias*)

Sunbittern

Nombre local

De postura elegante, cabeza pequeña, negra, con líneas superciliar y malar blancas. Pico amarillo, largo y puntiagudo. Cuello delgado y largo, pecho y hombros marrones con líneas negras. Espalda marrón con barrado canela. Vientre y garganta blancos. Patrón solar llamativo en tonos dorados, castaños y grisáceos, al abrir el ala y la cola tiene dos líneas marrones bordeadas de negro. Patas naranjas y largas. Se le puede encontrar en las quebradas.

43 - 48 cm



Ave de sol americana

(*Heliornis fulica*)

Sungrebe

Nombre local

De cuerpo delgado y pequeño. Espalda y alas café oliváceo, más claro en el pecho. Garganta y vientre blancos. Cuello, largo, junto con la cabeza, con líneas blancas y negras y las mejillas varían de beige en la hembra y blanco en el macho. La cola negra, con puntas blancas anteadas. Patas amarillas con líneas negro brillante. Largo pico rojo. Se le puede encontrar en las quebradas.

28 - 31 cm



Chorlo acollarado

(*Charadrius collaris*)

Collared plover

Nombre local

Chorlo pequeño, único en la Amazonia. Frente ancha blanca, bordeada por una barra negra hacia la corona y una raya negra en la cera. Parte de la corona, mejilla y nuca son castaños. Espalda marrón, más oscura hacia la cola. Tiene una banda negra, a manera de collar, en el pecho. Vientre blanco, pico negro y patas rosadas. Se le puede encontrar en las playas en quebradas y ríos.

14 - 16 cm



B

19 - 21 cm

Playero solitario

(*Tringa solitaria*)

Solitary sandpiper



Nombre local

Cabeza oscura, cuello y pecho pardo, finamente rayados de gris. Espalda café olivácea y las alas marrones, con pequeños puntos blancos. Anillo ocular, garganta y vientre, de color blanco. Rabadilla y el centro de la cola de color oscuro, con bordes blancos, y barrado negro, distintivo en vuelo. Pico recto, negro y patas oliváceas. Se le puede encontrar en las playas que dejan las quebradas y ríos.

20 - 24 cm

Gallito de agua de frente roja

(*Jacana jacana*)

Wattled jacana



Nombre local

Inconfundible por tener enormes tarsos, con dedos largos y delgados, amarillo grisáceo. Plumaje negro brillante, con tonos púrpura. Espalda, cola y alas castaño, mostrándose en vuelo, verde amarillento. Tiene carúncula bifida grande en la frente y otra pequeña a cada lado del pico, rojo magenta. El pico es naranja amarillento. Se le puede encontrar en las quebradas.

23 - 25 cm

Gaviotín de pico amarillo

(*Sternula superciliaris*)

Yellow-billed tern



Nombre local

Tiene la corona, nuca y la línea ocular negras. Espalda y alas gris pálido, con borde exterior negro. Frente, garganta, pecho y vientre blancos y cola gris, corta y ligeramente bifurcada. Patas amarillo opaco. Se le puede encontrar en las playas que dejan las quebradas y ríos.

Paloma plumiza

(*Patagioenas plumbea*)

Plumbeous pigeon

-- / VU

29,5 - 32 cm

Nombre local

Gris plumizo, casi uniforme. Cabeza y cuello con tinte púrpura y garganta más pálida. Espalda y alas son marrón oliváceo brillante. Cola larga y redondeada, sin marcas. Pico negro y anillo alrededor del ojo rosa pálido e iris blanquecino. Se le encuentra dentro del bosque, normalmente en las copas de los arboles.



Paloma rojiza

(*Patagioenas subvinacea*)

Ruddy pigeon

28 - 30,5 cm

Nombre local

Color vino opaco. La garganta pálida y espalda castaño oscuro, con tonos púrpuras hacia la rabadilla. Alas y cola café oliváceo. Iris rojo vino y anillo alrededor del ojo, rojo. Pico y cera negros. Patas magenta. La hembra es más apagada y oscura. Se le encuentra dentro del bosque, normalmente en las copas de los arboles.



Paloma-perdiz rojiza

(*Geotrygon montana*)

Ruddy quail-dove

21,5 - 24 cm

Nombre local

De color castaño en las alas y cola. Espalda con tonos purpura brillante. Los lados de la cabeza y la garganta son beige rosáceo con dos bandas castañas purpúreas. Pecho canela vinoso y abdomen beige. Cera y pico rojo oscuro. Iris naranja castaño. Anillo alrededor del ojo, lores y patas color magenta. La hembra es más apagada y oscura. Se le encuentra dentro del bosque, normalmente en el suelo.



Paloma de frente gris

(*Leptotila rufaxilla*)

Gray-fronted Dove

26 - 27,5 cm

Nombre local

Frente gris azulado pálido, siendo más oscura en la corona, nuca y lados del cuello, que tiene tonos púrpura. Cara beige con tonos rosa, hacia el cuello y pecho. Garganta blanquecina. Espalda y alas marrón oliváceo. Vientre, blanco rosáceo. Cola oscura, con las puntas blancas. Pico negro, iris amarillo y el anillo alrededor del ojo rojo. Patas rojas. Se le encuentra dentro del bosque, normalmente en el suelo o en ramas bajas.

Hoazín

(*Opisthocomus hoazin*)

Hoatzin

61 - 68,5 cm

Nombre local

Tiene una cresta en forma de abanico, larga y desigual, marrón rojizo. La cara no tiene plumas y es azul brillante. Cabeza, nuca y espalda castañas con franjas beige. El cuello, la garganta y pecho beige canela. Las alas, muy anchas, y el vientre son castaño rufo. De cola larga pardo rojiza con las puntas anchas beige. Iris rojos. Se le ve en grupos grandes (más de 30 individuos) en el río La Novia, aguas arriba de la estación biológica.

Cuco Ardilla

(*Piaya cayana*)

Squirrel cuckoo

40,5 - 46cm

Nombre local

Grande y estilizado. Cabeza, nuca y espalda castaño rojizo, más claro y con tonos vinoso en la garganta y pecho superior. Pecho y vientre gris. Flancos y calzones negruzcos. Cola negra, muy larga, con las puntas blancas, rojiza en la parte central. Pico amarillo, iris y piel desnuda alrededor del ojo rojos. Se le puede ver tanto en el bosque como en áreas abiertas. Su canto suena como "chi-cua".

Garrapatero de pico liso

(*Crotophaga ani*)

Smooth-billed ani

33 - 35,5 cm



Nombre local

De color general negro uniforme, con iridiscencias bronce y violeta sobre el pecho y espalda. Pico negro, ancho y curvo, sin surcos ni protuberancias, con una joroba en la parte superior, cerca de la base. Cola larga. Iris marrón. Se le puede ver en grupos en áreas abiertas.

Cuco faisán

(*Dromococcyx phasianellus*)

Pheasant cuckoo

37 - 41 cm



Nombre local

Cabeza pequeña con cresta marrón. Cara, lados del cuello y el pecho beige con estrías café. Línea detrás del ojo beige claro. Nuca, espalda y alas, castaño oscuro, con los bordes pardos. Cola larga y amplia, castaño oliva con puntas blancas. Vientre blanco. Iris amarillo y anillo alrededor del ojo desnudo, amarillo verdoso. Se le encuentra dentro del bosque.

Cuco pavonino

(*Dromococcyx pavoninus*)

Pavonine cuckoo

21,5 - 24 cm



Nombre local

Presenta la corona, cara y cresta color castaño rojizo, con una línea superciliar beige profunda que se extiende hasta la nuca. La espalda y las alas son color marrón grisáceo oscuro, con las puntas blancas. La garganta y el pecho son rufos, sin marcas. El vientre es blanco. La cola negra con pequeñas manchas blancas en las puntas. Se le encuentra dentro del bosque o donde hay matas de Bambú.



23 - 25 cm

Lechuza de vientre leonado

(*Megascops watsonii*)

Tawny-bellied screech-owl

Nombre local

Plumaje variable en tonos marrón. Tiene "orejas" alargadas oscuras. Disco facial y cejas marrón beige con líneas irregulares negras muy pálidas. Las partes inferiores son canela leonado pálidas, con marcas blancas y líneas negras delgadas en el pecho. Existen formas de plumaje grisáceo y castaño rojizo. El iris varía de ámbar a marrón. Se le encuentra dentro del bosque. Su canto suena como "urcu-tucu".



40 - 42 cm

Búho penachudo

(*Lophotrix cristata*)

Crested owl

Nombre local

Plumaje café oscuro, finamente estriado. Pecho, más claro, se torna ocre hacia el vientre, con barras café oscuro. Hombros y alas beige con manchas blancas. Cola larga, finamente moteada de café. Frente y cejas, junto a las "orejas" largas, blancas. Disco facial rufo con bordes negros. Se le encuentra dentro del bosque.



43 - 48 cm

Búho de anteojos

(*Pulsatrix perspicillata*)

Spectacled owl

Nombre local

Plumaje café oscuro. Vientre y calzones beige amarillento, con barrado oscuro en flancos. Las alas y cola son café grisáceo barrado. Disco facial café, cejas, cera y mejillas forman anteojos incompletos y junto a la garganta, son blancos. Iris y pico amarillos. Se le encuentra dentro del bosque.

Búho café
(*Ciccaba virgata*)
Mottled owl

30,5 - 34,5 cm



Nombre local

No tiene "orejas". Cejas y bordes del disco facial son blancos. Espalda café oscuro con barras y estrías beige y gris. Garganta, pecho y vientre son beige con moteado marrón y rayas negras. La cola oscura, barrada de café y gris claro. Iris oscuro y pico amarillo. Se le encuentra dentro del bosque.

Lechucita amazónica
(*Glaucidium hardyi*)
Amazonian pygmy-owl

14 - 15 cm



Nombre local

Cabeza pequeña y gris, finamente moteada de blanco. Cejas y mejillas beige claro. Cuello, espalda y alas café. Garganta, pecho y vientre blancos, con bandas café que desaparecen hacia el vientre. Cola corta, oscura con algunas barras blancas. El iris, amarillo y pico amarillo grisáceo. Se le encuentra dentro del bosque.

Lechucita ferruginosa
(*Glaucidium brasilianum*)
Ferruginous Pygmy-Owl

16 - 18 cm



Nombre local

Plumaje castaño rojizo con rayas café claro. Cabeza con motas blancas. Disco facial castaño con pequeñas marcas blancas y cejas beige claro. Garganta rojiza, barbilla y pecho beige con bandas castaño rojizo hacia el vientre. Alas cortas, barradas de blanco. Cola larga café oscuro con barrado claro. Se le encuentra dentro del bosque y en areas abiertas. Su canto suena como "paca-paca-paca".



35,5 - 38 cm

Búho Listado (*Pseudoscops clamator*) Striped owl

Nombre local

Plumaje con "listas", presenta "orejas" largas dobladas hacia atrás, castaño oscuro. El disco facial es blanco con borde oscuro. Iris café, cera, gris claro y pico negro. Cabeza, nuca, espalda, alas y cola son castaño leonado y la garganta es blanca. El pecho y vientre son canela con finas rayas verticales café oscuro. Cola larga, oscura con barrado negro. Se le encuentra dentro del bosque.



48 - 53,5 cm

Nictibio grande (*Nyctibius grandis*) Great potoo

Nombre local

De plumaje críptico color beige, que se torna blanco hacia el vientre. Completamente barrado y moteado de coloraciones oscuras. Pecho con manchas negras. Alas y cola moteados de canela y gris. Iris café oscuro. Pico negro con borde verde gris. Se le encuentra dentro del bosque, posado de forma vertical en troncos secos. Su canto suena como un grito ronco "guaaaaaaa".



48 - 53,5 cm

Nictibio de cola larga (*Nyctibius aethereus*) Long-tailed potoo

Nombre local

Plumaje críptico leonado con manchas beige y rayas negruzcas. Cabeza, nuca, espalda y rabadilla marrón rojizo; pecho, flancos y vientre superior, pardo grisáceo. Barbilla y garganta grises con pintas marrones. Vientre inferior ocre oscuro con estrías marrones. Alas y cola, marrón con estrías oscuras. Se le encuentra dentro del bosque, posado de forma vertical en troncos secos. Su canto suena como un grito agudo "aaaaaauiuuu".

Nictibio común

(Nyctibius griseus)

Common potoo

Nombre local

Plumaje críptico. Cabeza y espalda café grisáceo, con líneas finas negras y estrías beige. Garganta blanca anteada con listas oscuras escasas. Pecho café grisáceo con moteado beige y un doble collar de puntos negros. Vientre, más claro, y cola son de color gris, listado. Se le encuentra en áreas abiertas y bordes de bosque, posado de forma vertical en troncos secos. Su canto suena como "a-yay-ma-ma".

35,5 - 40,5 cm



Chotacabras común

(Nyctidromus albicollis)

Common pauraque

Nombre local

La corona y nuca son color café grisáceo, con estrías negras y las mejillas canela rufo. Garganta beige, con una mancha blanca y el pecho gris, ambos barreados de negro y castaño. Espalda, hombros y alas pardo oscuro, con manchas negras y bordes beige. El vientre es beige opaco, con barreado negro. Cola muy larga. Se le encuentra dentro del bosque. Su canto suena como "toa-yo".

26,5 - 28 cm



Chotacabras ocelado


(Nyctiphrynus ocellatus)


Ocellated poorwill

Nombre local

Plumaje marrón tiznado, barreado de castaño leonado. Garganta y cara, rojiza oscura con una ancha banda blanca que la separa del pecho. Hombros con manchas negras y bordes beige. Vientre negro con manchas blancas. Alas y cola negras con barrado blanco. Hembra más rufa, manchas del vientre poco definidas. Se le encuentra dentro del bosque. Su canto suena como "rrrauuu".

21 - 22,5 cm





24 - 30 cm

Chotacabras cola de seda

(Antrostomus sericocaudatus)

Silky-tailed nightjar

Nombre local

Es marrón con moteado y barrado canela. Frente, corona y nuca con moteado blanco grisáceo. Cuello beige con barrado marrón y garganta blanca. Pecho con manchas beige y blancas. Vientre y flancos beige, barreteado de marrón y manchas blancas. Cola oscura con puntas laterales blancas. Se le encuentra dentro del bosque.



10,5 - 12 cm

Vencejo de lomo gris

(Chaetura cinereiventris)

Gray-rumped swift

Nombre local

Cabeza, nuca y espalda opacos, color azul grisáceo. Garganta y rabadilla distintivas, de color gris claro. Pecho y vientre grises. La cola es larga, gris oscuro. Pico y patas negros. Se le ve normalmente volando en el cielo.



13,5 cm

Vencejo de lomo pálido

(Chaetura egregia)

Pale-rumped swift

Nombre local

Similar al anterior pero sin tonos azules. Es más bronceado en cabeza, nuca y espalda. La garganta, más clara que el pecho; rabadilla y cola son claras, color blanco grisáceo, contrastantes. Se le ve normalmente volando en el cielo.

Vencejo de cola corta

(*Chaetura brachyura*)

Short-tailed swift

Nombre local

De cola corta característica. Alas largas y anchas, algo exageradas. Su plumaje es negro, con la rabadilla y la cola gris claro, contrastante con el cuerpo. Se le ve normalmente volando en el cielo.



Vencejo tijereta de palmeras

(*Tachornis squamata*)

Fork-tailed palm-swift

Nombre local

Cabeza, nuca y espalda son negro oscuro, con tonos marrones. Garganta y pecho blanco grisáceo. Vientre pálido, de color marrón. Alas largas y delgadas. Cola delgada, muy larga, presenta dos puntas, a manera de horquilla. Se le ve normalmente volando en el cielo.




Colibrí de nuca blanca


(*Florisuga mellivora*)

White-necked jacobin

Nombre local

El macho tiene la cabeza, cuello y garganta azul brillante. El pecho, espalda y cola, verde brillante. La nuca y el vientre, blancos. Las partes laterales de la cola son blancas, puntas negra. Hembra con cabeza y partes superiores verde brillante, garganta y pecho, opacos, verde azulado con muchas escamas blancas. El vientre es blanco. La cola, verde con puntas blancas. Pico corto y grueso.





11 - 12 cm


Ermitaño de pecho canela

(*Glaucis hirsutus*)

Rufous-breasted hermit

Nombre local

Cabeza, espalda y rabadilla verde bronceado, con la cara marrón. Garganta y pecho canela rufo, tornándose gris en el vientre. Cola verde, con los lados rufos, y banda terminal blanca. Pico largo, negro con base amarilla. Hembra más pálida. Pico corto y curvado. Se le puede ver en grupos en áreas abiertas.



11 - 12 cm

Ermitaño de cola pálida

(*Threnetes leucurus*)

Pale-tailed barbtthroat

Nombre local

Cabeza, nuca, espalda y rabadilla verde bronceado. Garganta negra con borde blanco en la zona malar y banda rojiza en la base. Pecho superior verde bronceado oscuro, tornándose beige hacia el vientre, que finalmente es gris. Cola beige claro, con bordes negros. La hembra es más pálida. Pico largo, ligeramente curvado, color negro. Patas rosadas. Se le encuentra dentro del bosque.



13,5 - 14,5 cm

Ermitaño de barba blanca

(*Phaethornis hispidus*)

White-bearded hermit

Nombre local

Cabeza, espalda y alas verde bronce oscuro. Las líneas detrás y debajo del ojo son blancas. Mejillas negras. Pecho y vientre gris, con una franja blanca delgada en el centro de la garganta. Rabadilla y cola gris con puntas blancas. Se le encuentra dentro del bosque.

Ermitaño rojizo


(*Phaethornis ruber*)

Reddish hermit

Nombre local

Corona, espalda y alas verde cobrizo. Los lados de la cabeza negros, con una franja blanca debajo del ojo. Garganta beige claro. El pecho, vientre y rabadilla, naranja rufa, con una delgada banda negra a la altura del pecho. Cola marrón bronceado, redondeada con puntas blancas delgadas. Hembra más pálida, sin banda negra y la cola más larga y puntiaguda. El pico negro, curvado. Se le encuentra dentro del bosque.

8,5 cm



Ermitaño de pico grande

(*Phaethornis malaris*)

Great-billed hermit

Nombre local

Cabeza, nuca y espalda verde grisáceo, tornándose bronce hacia la rabadilla. Las líneas superciliares y debajo del ojo, beige, y mejillas oscuras. Pecho y vientre beige. Cola negra con puntas blancas. El pico es largo y curvado. Se le encuentra dentro del bosque.

15,5 - 16,5 cm



Esmeralda de cola azul

(*Chlorostilbon mellisugus*)

Blue-tailed emerald

Nombre local

Plumaje uniforme color verde brillante. Los calzones son blancos y cola azul metálico en forma de horquilla. Pico negro, corto y recto. La hembra difiere por ser blanco grisáceo en la garganta, pecho y vientre. Mejillas negruzcas, línea superciliar blanca y puntas extremas de la cola blancas. Se le puede ver en grupos en áreas abiertas.

7,5 - 8 cm





11 - 12 cm


Ala de sable de pecho gris

(Campylopterus largipennis)

Gray-breasted sabrewing

Nombre local

Tiene las alas torcidas, con aspecto de sable. Cabeza, nuca, espalda, rabadilla y cola superior verde brillante. Garganta, pecho y vientre gris oscuro uniforme. Tiene una pequeña mancha detrás del ojo de color blanco. Los lados de la cola son azul oscuro con las puntas anchas blancas. Patas negras. Se le encuentra dentro del bosque.



11 - 12 cm


Ninfa de cola ahorquillada

(Thalurania furcata)

Fork-tailed woodnymph

Nombre local

Cabeza, espalda y alas verde oscuro. Garganta y cuello, verde metálico. Pecho y vientre azul púrpura brillante. La cola es oscura ahorquillada con puntas blancas delgadas. La hembra difiere con la parte ventral gris.



13,5 - 14,5 cm

Colibrí de pecho zafiro

(Amazilia lactea)

Sapphire-spangled emerald

Nombre local

Cabeza, espalda y flancos verde brillante oscuro. Cola y parte de las alas, con tonos azul oscuro. Cuello y pecho son azul púrpureo resplandeciente. El vientre y calzones son blancos, con una línea clara que divide el pecho. Pico recto.

Trogón de cola negra

(*Trogon melanurus*)

Black-tailed trogon

30,5 - 32 cm

Nombre local

Corona, cuello, pecho y espalda verde metálico, con una banda blanca que separa al vientre, que es muy rojo. Cara y garganta negros, con el anillo alrededor del ojo rojo y el iris café. Alas barradas de blanquinegro en la parte superior. Cola negra y larga. Hembra gris, sin banda en el pecho y de vientre rojo. Se le encuentra dentro del bosque.



Trogón amazónico

(*Trogon ramonianus*)

Amazonian trogon

22,5 - 23cm

Nombre local

Cabeza, nuca y pecho azul y vientre amarillo dorado. Cara y barbilla negras. Espalda verde que se torna azul en la rabadilla. Alas negras con estrías blancas. Cola con barreado blanquinegro. Pico grueso y gris. El anillo alrededor del ojo amarillo, blanco en la hembra, que tiene la cabeza, nuca y pecho grises. Se le encuentra dentro del bosque.



Trogón de corona azul

(*Trogon curucui*)

Blue-crowned trogon

24 - 25,5 cm

Nombre local

La corona, cuello y pecho son de color azul, con una banda blanca que separa al vientre rojo. La cara y garganta son negras con el anillo ocular color naranja. La espalda es azul verdoso brillante. La cola es negra, con finas estrías blancas. La hembra difiere en lo blanco del pecho y lo gris de las partes superiores. Se le encuentra dentro del bosque.





11 - 12 cm

Trogón acollarado

(Trogón collaris)

Collared trogon

Nombre local

Cabeza, cuello, pecho y espalda verde metálico, con una ancha banda blanca que separa al vientre, que es rojo. Cara y garganta negras y anillo alrededor del ojo apagado. Cola verde con barreado blanquinegro. Hembra marrón en partes superiores, vientre más opaco. Cola rufa opaca con puntas negras. Anillo alrededor del ojo blanco con cera negra. Se le encuentra dentro del bosque.



30,5 - 32 cm

Martín pescador grande

(Megaceryle torquata)

Ringed kingfisher

Nombre local

Cabeza, espalda, alas y cola azul grisáceo. Cresta grande y dispereja. Garganta y el cuello blancos. Pecho y vientre rufos. Tiene manchas blancas delante y detrás de los ojos. Cola blanca con barreado azul grisáceo. Hembra con pecho azul grisáceo y una línea blanca delgada que la separa del vientre. Se le ve posado en ramas secas a los lados de ríos y quebradas.



28 - 29 cm

Martín pescador amazónico

(Chloroceryle amazona)

Amazon kingfisher

Nombre local

Cabeza, espalda, alas y cola verdes. Cresta grande y peinada. Garganta, cuello y vientre blancos. Pecho rufo intenso, con marcas blancas encima y debajo del ojo. La cola es corta y verde, con manchas blancas. La hembra difiere por la banda verde delgada e incompleta en el pecho. Se le ve posado en ramas secas a los lados de ríos y quebradas.

Martín pescador verde


(*Chloroceryle americana*)

Green kingfisher

Nombre local

Cabeza, espalda, alas y cola son verde metálico oscuro. Cresta grande y peinada. La garganta, cuello y vientre son blancos, este con manchas verdes. Pecho rufo intenso. Tiene manchas blancas en alas y tonos blancos conspicuos en la cola. La hembra tiene dos bandas verdes en el pecho, la segunda incompleta en la base. Se le ve posado en ramas secas a los lados de ríos y quebradas.

18,5 - 20,5 cm



Relojero de pico ancho

(*Electron platyrhynchum*)

Broad-billed motmot

Nombre local

Cabeza, cuello y pecho rufo canela. Tiene un antifaz negro en la cara y una mancha negra en el pecho. Espalda verde, barbilla, alas, vientre y cola son verde azulado. Cola es muy larga y fina, la punta en forma de raqueta. El pico es ancho y plano. Se le encuentra dentro del bosque. Su canto suena como "bua!!".

33 - 35,5 cm



Relojero rufo


(*Baryphthengus martii*)

Rufous motmot

Nombre local

Cabeza, cuello y pecho rufo canela, más intenso hacia el vientre superior. Con máscara negra ancha en la cara y una mancha negra en el pecho. Espalda, alas y flancos verde oscuro. Vientre posterior y calzones azul verdoso. Parte inferior de las alas y la cola, azul oscuro. Ésta presenta raquetas pequeñas o ausentes. Se le encuentra dentro del bosque. Su canto suena como "bub-pup".

43 - 46 cm





39 - 41 cm

Relojero amazónico

(*Momotus momota*)

Amazonian motmot

Nombre local

Corona negra con bordes anchos celeste brillante, violáceo por detrás. La máscara y la mancha pequeña en el pecho, negras con bordes delgados azules. Nuca, pecho, cuello y vientre color rufo. Espalda, alas, calzones y cola color verde azulada, igual en garganta y alas inferiores, brillantes. Cola con raquetas y puntas negras. Se le encuentra dentro del bosque. Su canto suena como "bub-pup".



20 cm

Jacamar del Purús

(*Galbalcyrhynchus purusianus*)

Purus jacamar

Nombre local

De plumaje general castaño, con la frente, corona, bigotes, barbilla, alas y cola negro brillante. La piel alrededor del ojo y el pico, fuerte y largo, son rosados. Iris rojo. Patas rosadas. Recibe su nombre justamente por el río Purús. Se le ve en los árboles en la orilla de ríos y quebradas.



15 - 16 cm

Jacamar de garganta blanca

(*Brachygalba albugularis*)

White-throated jacamar

Nombre local

Plumaje general pardo apagado, más oscuro en espalda, alas y cola. La cara y la garganta son blancas, con tonos beige. El vientre tiene una mancha castaña en el centro. De cola corta. La piel desnuda alrededor del ojo y el pico son amarillos. Iris negro. Se le ve en los árboles en la orilla de ríos y quebradas.

Jacamar de frente azulada

(*Galbula cyanescens*)

Bluish-fronted jacamar

Nombre local

El plumaje general es verde brillante. Frente, corona, garganta y alas inferiores con iridiscencias azules. Vientre y parte inferior de la cola beige rufo, pálido en las hembras. La piel alrededor del ojo gris oscuro. Iris negro. Pico largo, recto y puntiagudo, color negro. Se le ve tanto dentro del bosque como en áreas abiertas.

20 - 23 cm



Buco de gorro castaño

(*Bucco macrodactylus*)

Chestnut-capped puffbird

Nombre local

Corona canela rufo y una mancha ocre en la nuca. Máscara negra con ceja superciliar blanca delgada y larga. Cuello ocre con una banda blanca, por encima del collar negro que la separa del pecho claro. Espalda, alas y cola marrones. Vientre beige con barras finas oscuras. Cola estrecha y corta. Se le encuentra dentro del bosque y donde hay matas de Bambú.

EBA

16 - 16,5 cm



Buco acollarado

(*Bucco capensis*)

Collared puffbird

Nombre local

Rechoncho, con la cabeza, espalda, alas y cola castaño rufo con estrías negras. La garganta y pecho son blancos y un collar negro ancho que lo separa del vientre beige. El pico grande, es rojizo con la parte superior oscura. Se le encuentra dentro del bosque.

18,5 - 19 cm





20 - 21 cm

Buco estriolado

(*Nystalus striolatus*)

Striolated puffbird

Nombre local

De colores crípticos, con los lados de la cabeza beige con franjas oscuras. Corona marrón oscuro con tonos rufos. Cera, barbilla y garganta blancos. Espalda, alas y cola marrón oscura moteada. Vientre beige con rayas negras. Pico grueso pálido. Iris amarillo. Se le encuentra dentro del bosque.



18 - 19 cm

Buco semiacollarado

(*Malacoptila semicincta*)

Semicollared puffbird

Nombre local

Plumaje general marrón oscuro con estriado blanco. Tiene semi-collar blanco en el pecho. Nuca rufa, cera, bigotes y barbilla blancas. Vientre y cola grises. Pico naranja con la punta negra. Se le encuentra dentro del bosque.



14 - 14,5 cm

Monjita de barbilla leonada

(*Nonnula sclateri*)

Fulvous-chinned nunlet

Nombre local

Marrón leonado apagado con los lados de la cara grises y la piel alrededor del ojo roja. Cera, garganta y pecho ocre leonado. Vientre blanco amarillento. La cola es esbelta y blanca. Pico largo y grueso, negro. Se le encuentra dentro del bosque.

Monja de frente negra

(*Monasa nigrifrons*)

Black-fronted nunbird

Nombre local

Plumaje uniforme gris oscuro brillante. Cabeza, alas y cola son negras, más oscuro en la cera. Vientre gris claro. Pico rojo coral brillante. Se le ve tanto dentro del bosque como en áreas abiertas.

26 - 27,5 cm



Monja de frente blanca

(*Monasa morphoeus*)

White-fronted nunbird

Nombre local

Plumaje gris oscuro. Cera y barbilla blancas. Cabeza negra opaca. Alas y cola son más oscuras, vientre gris más claro. Pico grueso, rojo naranja. Iris café. Se le encuentra dentro del bosque.

25 - 26 cm



Buco golondrina

(*Chelidoptera tenebrosa*)

Swallow-wing

Nombre local

Plumaje general negro con tonos azulados en cabeza y alas. Rabadilla, parte inferior de las alas y base de la cola blancas. Vientre rufo, cola corta y pico ligeramente curvado hacia abajo. Se le ve en los arboles en la orilla de ríos y quebradas.

16,5 cm





17 - 18 cm

Barbudo brillante

(*Capito auratus*)

Gilded barbet

Nombre local

Frente, corona y barbilla naranja dorado con línea superciliar amarilla. Máscara negra y garganta ocre. Espalda y alas negras con puntas doradas. Vientre color amarillo pálido con pequeños puntos negros en flancos y varias manchas en la hembra. Pico grueso negro. Se le ve tanto dentro del bosque como en áreas abiertas.



14 - 14,5 cm

Barbudo de garganta limón

(*Eubucco richardsoni*)

Lemon-throated Barbet

Nombre local

Corona, máscara y barbilla rojo carmesí. Garganta y nuca amarillo limón, con banda rojiza difusa en el pecho. Vientre y flancos amarillos con franjas oscuras. Espalda, alas y cola verde oliva. La hembra con frente y garganta gris claro. Cera y máscara gris oscura y corona verde. Pecho amarillo con franja naranja. Se le encuentra dentro del bosque.



EBA
15,5 - 16 cm

Barbudo de Capucha Escarlata

(*Eubucco tucinkae*)

Scarlet-hooded Barbet

Nombre local

Cabeza, garganta y pecho rojo sangre. Barbilla negra y lados del pecho grises. Nuca verde con parche amarillo dorado. Espalda, alas y cola verde olivo. Vientre amarillo con estriado gris. La hembra tiene la corona y mejillas rojo y pecho amarillo con una banda beige que separa del vientre. Se le encuentra dentro del bosque.

Perico Tui

(Brotogeris sanctithomae)

Tui parakeet

18 - 19 cm



Nombre local

Plumaje general verde, con tono amarillento en el vientre. Frente y corona amarillo brillante. Pico naranja oscuro. Alas oscuras con un tono azul en los bordes. Cola puntiaguda. Se le puede ver volando o posado en la copa de los arboles.

Perico de ala cobalto

(Brotogeris cyanoptera)

Cobalt-winged Parakeet

19 - 20,5 cm



Nombre local

Esta garza tiene una variedad de colores que la hace verse bastante vistosa. La cabeza es gris celeste en la corona y negro a los lados, el cuello es rufo y el cuerpo verdoso en la espalda y alas y rufo en el pecho. Las patas son amarillas y el pico gris. Se le ve solitaria en quebradas.

Loro de mejilla naranja

(Pyrilia barrabandi)

Orange-cheeked Parrot

24 - 25,5 cm



Nombre local

Plumaje general verde. Cabeza negra, con una mancha naranja en las mejillas. Garganta y pecho amarillo oliva. Alas con un patrón de colores amarillo, naranja, rojo y azul; notable en vuelo. Cola con puntas azules y parte interna verde amarillento. Se le puede ver volando o posado en la copa de los arboles cerca de ríos y quebradas.



24,5 - 27 cm

Loro de cabeza azul

(*Pionus menstruus*)

Blue-headed Parrot

Nombre local

Plumaje general verde. Cabeza, cuello y pecho azules. Base del pico y garganta salpicados de rosa. Rabadilla y cola ventral son rojas, notables en vuelo. Los hombros y bordes del ala, con tono oliva, bordeados de amarillo. La cola tiene la punta de color azul. Se le puede ver volando o posado en la copa de los arboles cerca de ríos y quebradas.



33 - 36 cm

Loro de corona amarilla

(*Amazona ochrocephala*)

Yellow-crowned Parrot

Nombre local

Plumaje general verde, con corona y frente amarillas. El borde del hombro y centro del ala de color rojo, notable en vuelo. El anillo alrededor del ojo es claro y sin plumas. Se le puede ver volando o posado en la copa de los arboles.



38 - 41 cm

Loro harinoso

(*Amazona farinosa*)

Mealy Parrot

Nombre local

Plumaje general verde con tono grisáceo en la cabeza, espalda, alas y cola, y tonos azulados hacia el pecho. El borde externo del ala es color rojo y la cola tiene dos intensidades de verde, más claro hacia las puntas, ambas notables en vuelo. El anillo alrededor del ojo es claro, ancho, y sin plumas. Se le puede ver volando o posado en la copa de los arboles.

Loro de vientre blanco

(*Pionites leucogaster*)

White-bellied Parrot

Nombre local

Corona y nuca anaranjadas. Los lados de la cara y garganta son amarillos. Pecho y vientre blancos, contrastantes con la espalda y cola verdes. Los calzones son amarillos. Se le puede ver volando o posado en la copa de los arboles.

21 - 22,5 cm



Perico de gorro negro

(*Pyrrhura rupicola*)

Black-capped Parakeet

Nombre local

Plumaje general verde, corona negra, lados de la cara y mejillas verde oliva. Presentan un escamado blanquinegro en el pecho, que se torna beige hacia el vientre, que tiene algunas plumas rojas. Alas centrales rojas y puntas azuladas, oscuras. Se le puede ver volando o posado en la copa de los arboles.

23,5 - 25 cm



Cotorra de cabeza oscura

(*Aratinga weddellii*)

Dusky-headed Parakeet

Nombre local

Plumaje general verde. Cabeza negra, con una mancha naranja en las mejillas. Garganta y pecho amarillo oliva. Alas con un patrón de colores amarillo, naranja, rojo y azul; notable en vuelo. Cola con puntas azules y parte interna verde amarillento. Se le puede ver volando o posado en la copa de los arboles cerca de ríos y quebradas.

23,5 - 27 cm



Guacamayo de vientre rojo

17 - 18 cm
(*Orthopsittaca manilatus*)
Red-bellied Macaw



Nombre local

Plumaje general verde. Frente y alas superiores con tono azulado. La cara es desnuda color amarillo. El vientre es rojo, poco visible. La parte interna de alas y cola son amarillo opaco. Se le puede ver volando o posado en la copa de los arboles.

Guacamayo de cabeza azul

VU / VU
14 - 14,5 cm
(*Primolius couloni*)
Blue-headed Macaw



Nombre local

Plumaje general verde, con la cabeza y alas azules. Cera y piel alrededor del ojo desnudas, color gris. La cola superior, con base marrón, una mancha verde y otra azul. La parte interna de alas y cola con tonos amarillento. Pico gris metálico e iris blanco. Se le puede ver volando o posado en la copa de los arboles..

Guacamayo azul y amarillo

15,5 - 16 cm
(*Ara ararauna*)
Blue-and-yellow Macaw



Nombre local

Grande, de cola larga y vistosa coloración. Corona, nuca, espalda y cola azules. Pecho y vientre son amarillo dorado, igual que la parte interna de alas y cola. Frente verde. La cara es blanca, con la piel desnuda alrededor del ojo con pequeñas plumas negras. Garganta azul oscuro. Se le puede ver volando o posado en la copa de los arboles.

Guacamayo esmeralda

(*Ara macao*)

Scarlet Macaw

18 - 19 cm

Nombre local

Grande, de plumaje general rojo esmeralda. Las alas presentan tres colores: rojo, amarillo al centro y azul intenso en los extremos. La rabadilla y base de la cola son azules. La cara desnuda es color blanco cremoso. Se le puede ver volando o posado en la copa de los arboles.



Guacamayo rojo y verde

(*Ara chloropterus*)

Red-and-green Macaw

19 - 20,5 cm

Nombre local

Grande, de plumaje general rojo esmeralda oscuro. La espalda y parte adyacente de alas es verde. Las alas, rabadilla y cola son azules. Lados de la cara color blanco cremoso con líneas rojas en la piel desnuda alrededor del ojo. Se le puede ver volando o posado en la copa de los arboles.



Guacamayo de Frente Castaña

(*Ara severus*)

Chestnut-fronted Macaw

24 - 25,5 cm

Nombre local

Plumaje general verde oscuro. La frente castaña oscura, con la corona con tonos azules. Los lados de la cara blancos con líneas pálidas. Alas azules. El borde de los hombros y la parte interna de las alas rojizas. La cola con plumas rojas y azules.



53,5 - 57 cm



Tucán de garganta blanca

(*Ramphastos tucanus*)

White-throated Toucan

Nombre local

Plumaje general negro azulado. Garganta y pecho blancos con una banda roja que la separa del vientre. Base interna de la cola roja. Pico negro con borde superior y culmen verde amarillo, azul por debajo. Piel desnuda alrededor del ojo azul celeste, anillo orbital violeta, iris café y patas celestes. Se le encuentra dentro del bosque y en los bordes de áreas abiertas. Su canto suena como un agudo "tio-juan".

43 - 46 cm



Tucán de Pico Acanalado


(*Ramphastos vitellinus*)

Channel-billed Toucan

Nombre local

Similar al Tucán de Garganta Blanca, pero es más pequeño y con el pico más corto. El pico es más amarillo en la base inferior. Mancha amarilla en el pecho. Base de la cola rufa. Se le encuentra dentro del bosque y en los bordes de áreas abiertas. Se diferencia del tucán anterior por que su canto suena como "riiiuuuu".

30,5 - 32 cm



Tucancillo de Collar Dorado

(*Selenidera reinwardtii*)

Golden-collared Toucanet

Nombre local

Con un collar amarillo dorado en el pecho que cruza hacia el dorso. Cabeza, pecho y vientre superior negro azulado. Vientre inferior verde y rabadilla roja. Espalda, alas y cola verde oliva. Flancos naranja y punta de la cola, roja. Piel desnuda alrededor del ojo azul verdoso, banda amarilla en la mejilla. Pico verde con punta gris. Se le encuentra dentro del bosque.

Arasari Letreado


(*Pteroglossus inscriptus*)

Lettered Aracari

Nombre local

Cabeza, nuca y garganta negras. pecho y vientre amarillo naranja. Calzones y rabadilla rufos. Alas y cola verde brillante. Piel alrededor del ojo azul con una pequeña mancha detrás del ojo, roja. Pico amarillo con marcas negras verticales similares a letras. Lados de la cara y garganta, marrón rufo en la hembra. Se le encuentra dentro del bosque.

33 - 35,5 cm



Arasari de Oreja Castaña

(*Pteroglossus castanotis*)

Chestnut-eared Aracari

Nombre local

Corona, nuca y lados de la cabeza negros, la parte baja de la nuca y la garganta son castaños con una franja negra que la separa del pecho y vientre amarillo. Banda pectoral roja. Espalda, alas, cola y tarsos verdes. Piel alrededor del ojo azul. Pico oscuro con líneas y borde superior amarillo. Se le encuentra dentro del bosque.

43 - 45,5 cm



Arasari de Pico Marfil

(*Pteroglossus azara*)

Ivory-billed Aracari

Nombre local

Cabeza y cuello de color castaño, con la corona negra. Banda rojo brillante en el pecho seguida de una banda negra. El vientre y la rabadilla son amarillos. Espalda, alas, cola y tarsos son verdes. Piel alrededor del ojo roja. Pico marfil con una mancha anaranjada en la parte inferior. Se le encuentra dentro del bosque.

33 - 35,5 cm





42 - 46 cm

Arasari Encrespado (*Pteroglossus beauharnaesii*) Curl-crested Aracari

Nombre local

Plumas de la cabeza negras con apariencia encrespada. La espalda y rabadilla rojas. Alas y cola verde oscuro. Garganta blanca con pintas oscuras. Pecho amarillo con puntas negras brillantes y un cinturón rojo que separa del vientre amarillo claro. La piel alrededor del ojo es azul, el iris rojo y el pico superior más oscuro. Se le encuentra dentro del bosque.



19 cm

Carpintero de Penacho Amarillo (*Melanerpes cruentatus*) Yellow-tufted Woodpecker

Nombre local

Color negro con la frente y corona anterior rojas con penacho amarillo que se extiende desde un anillo ocular del mismo color. Vientre rojo y rabadilla blanca, muy notoria. Flancos y calzones color beige con barreteado negro. Se le encuentra en parejas o grupos pequeños en bordes de bosque o río, y áreas abiertas.



16 - 17,5 cm

Carpintero Chico (*Veniliornis passerinus*) Little Woodpecker

Nombre local

De plumaje general verde olivo. La frente es gris, con corona y nuca rojo brillante, barreado claro en garganta, pecho y vientre. Alas y espalda con tono más amarillento. Pico corto.

Carpintero Teñido de Rojo

(*Veniliornis affinis*)

Red-stained Woodpecker

17,5 - 18 cm

Nombre local

Plumaje general color verde olivo, con la frente y corona gris con estriado rojo, la nuca es roja. La piel alrededor del ojo es amarillo grisáceo. Barreado de negro parduzco en garganta, pecho y vientre. Alas y espalda con moteado claro. Se le encuentra en bordes de bosque o río, y áreas abiertas.



Carpintero Verde y Dorado

(*Piculus chrysochloros*)

Golden-green Woodpecker

21 cm

Nombre local

Los lados de la cara, espalda, alas y cola son verde oliva. La garganta, pecho y vientre, amarillo dorado con barreado marrón. Frente, corona y nuca rojas, ausente en la hembra. Banda amarilla que cruza desde la cera hacia la nuca, con estría malar roja. Iris blanco azulado. Pico gris oscuro. Se le encuentra dentro del bosque.



Carpintero Castaño

(*Celeus elegans*)

Chestnut Woodpecker

28 cm

Nombre local

Plumaje general marrón castaño con cresta amarilla naranja. Los flancos, rabadilla y calzones son beige amarillento. Anillo alrededor del ojo es celeste y línea malar color rojo, ausente en las hembras. Pico amarillo marfil. Se le encuentra dentro del bosque.





28 - 29 cm

Carpintero Anillado

(*Celeus torquatus*)

Ringed Woodpecker

Nombre local

Cabeza, nuca y cuello canela claro con una banda malar roja. La espalda, alas y cola son castaño y el vientre beige amarillento, todos con estriado negro. El pecho negro y el pico gris. Se le encuentra en bordes de bosque o río, y áreas abiertas.



34 - 35 cm

Carpintero Lineado

(*Dryocopus lineatus*)

Lineated Woodpecker

Nombre local

Plumaje negro y con línea malar blanca que baja hasta los hombros. El pecho y vientre con barreado blanquinegro. Cresta rojo brillante y se extiende a la nuca. Tiene una mancha gris oscuro en las mejillas con bigote rojo. Iris blanco, pico y patas gris claro. La hembra tiene bigote y frente negros. Se le encuentra dentro del bosque.



33- 34 cm

Carpintero de Cuello Rojo

(*Campephilus rubricollis*)

Little Woodpecker

Nombre local

Cabeza y cuello rojos, con una mancha pequeña blanca y negra en las mejillas. La espalda, alas y cola son negro uniforme. Pecho, vientre, calzones y alas inferiores rufas. La hembra difiere por banda blanquecina en la base del pico que va hacia la mejilla. Se le encuentra dentro del bosque.

Carpintero de Cresta Roja

(*Campephilus melanoleucos*)

Crimson-crested Woodpecker

Nombre local

Cabeza y cresta rojas, con una mancha pequeña blanca y negra en las mejillas. La espalda es negra con una línea en forma de "V" color blanco. La garganta, cuello anterior y pecho son negro uniforme. El vientre es beige con barreado negro. Se le encuentra dentro del bosque.

34 - 35 cm



Halcón Reidor

(*Herpetotheres cachinnans*)

Laughing Falcon

Nombre local

La cabeza, cuello, pecho y vientre son blanco cremoso. Tiene una máscara negra que cubre las mejillas y rodea la cabeza hasta la nuca. Corona salpicada de negro. Espalda y alas oscuras, con bordes canela. Cola larga, redondeada, con barreado negro y crema. Se le encuentra dentro del bosque. Su canto suena como "huaco" o "huacabo", repetido numerosas veces.

43 - 52 cm



Halcón-Montés Barrado

(*Micrastur ruficollis*)

Barred Forest-Falcon

Nombre local

Plumaje general gris oscuro, con garganta pálida. Pecho y vientre blancos, finamente barreado de negro. Cera y piel alrededor del ojo amarillas. Iris blanco. Cola negra, larga, con tres delgadas bandas blancas o gris pálido. Se le encuentra dentro del bosque.

31 - 38 cm





32 - 38 cm

Halcón-Montés de Ojo Blanco

(*Micrastur gilvicolis*)

Lined Forest-Falcon

Nombre local

Cabeza, cuello, espalda y alas gris oscuro. El pecho y vientre blanco, finamente rayadas. La cera y piel alrededor del ojo, naranja encendido. Calzones blancos. La cola negra con dos bandas centrales y una terminal blanca. Se le encuentra dentro del bosque.



40 - 44 cm

Halcón-Montés de Dorso Gris

(*Micrastur mirandollei*)

Slaty-backed Forest-Falcon

Nombre local

Cabeza, nuca, espalda y cola gris pizarra. Corona y cola más oscuras. Garganta, pecho y vientre blancos, con tonos que varían de crema a café. Cola con la punta blanca y con tres bandas claras y oscuras. La cera y piel alrededor del ojo son amarillas. Pico amarillo con punta negra, Iris marrón claro. Se le encuentra dentro del bosque.



50 - 52 cm

Caracara de Vientre Blanco

(*Ibycter americanus*)

Red-throated Caracara

Nombre local



Plumaje general negro brillante. Vientre, flancos y calzones blancos. Piel alrededor del ojo y garganta desnudas, de color rojo. Lados de la cabeza y garganta finamente barrados de blanco y crema. Iris marrón, cera plumiza. Pico amarillo, patas naranja. Se le puede ver volando sobre bosques, ríos y áreas abiertas.

Caracara Negro

(*Daptrius ater*)

Black Caracara

Nombre local

Plumaje color negro brillante, con una banda blanca ancha en la base de la cola. La cera y piel alrededor del ojo, desnudas y de color amarillo, con tonos naranja brillante. Iris marrón. Se le puede ver volando sobre bosques, ríos y áreas abiertas.

41 - 43 cm



Halcón Caza Murciélagos

(*Falco ruficularis*)

Bat Falcon

Nombre local

Plumaje general color negro, con alas y rabadilla con bordes pizarra. Nuca y garganta blanco cremoso. La cera y anillo alrededor del ojo amarillo brillante. Pecho, vientre y flancos finamente barrados de blanco. Calzones y parte de la cola castaño rufo. La cola con varias bandas delgadas de color gris y con la punta blanca. Se le encuentra dentro del bosque y en áreas abiertas cerca de ríos.

26 - 31 cm



Batará Lineado

(*Cymbilaimus lineatus*)

Fasciated Antshrike

Nombre local

Macho negro con barreado blanco, más claro en el pecho y más intenso en la espalda y alas. Corona y cresta negro brillante. Hembra negra, barreada de beige, más clara en el pecho y más oscura en la espalda y alas. Corona y cresta rufo brillante. Pico negro, robusto, ganchudo. Iris rojo y patas gris azulado pálido. Se le encuentra en la las copas de los arboles dentro del bosque.

18 cm





16 - 18 cm

Batará de Bambú (*Cymbilaimus sanctaemariae*) Bamboo Antshrike

Nombre local

Macho negro con barreado blanco. La corona y cresta negro brillante. La hembra es amarilla, barreada negro, más claro en el pecho y vientre más brillante en espalda y alas. La corona de color castaño rufo y cresta de color negro. Pico negro pequeño. El iris es color marrón. Los tarsos de color gris azulado. Se le encuentra en la las copas de los arboles donde hay matas de Bambú.



19 - 20 cm

Batará Grande (*Taraba major*) Great Antshrike

Nombre local

El macho tiene cresta tupida, nuca, cuello y espalda negros. Garganta, pecho y vientre blanco. Las barras alares son angostas y blancas. El vientre bajo y la región de la cola son negros. Hembra con patrón como el del macho, pero con el negro reemplazado por castaño rufo. El iris es rojo, las patas son gris azulado. Se le encuentra en bosque ribereño y áreas abiertas.



14 cm

Batará de Ala Llana (*Thamnophilus schistaceus*) Plain-winged Antshrike

Nombre local

Se distingue por la falta de puntos en las alas. El macho es gris uniforme, corona y cola más oscuros. Hembra pardo oliváceo con tonos claros más amarillentos en pecho y vientre. La corona es rufa, que contrasta con la cera grisácea. El iris es pardo rojizo. Pico y patas grises. Se le encuentra dentro del bosque.

Batará de Hombro Blanco

(*Thamnophilus aethiops*)

White-shouldered Antshrike

16 cm

Nombre local

Plumaje general gris oscuro y corona negra. Con pocos puntos blancos en los hombros. La hembra es marrón rojizo oscuro, presenta tonos claros más leonados en el vientre. El pico es gris oscuro, iris rojo y patas gris claro. Se le encuentra dentro del bosque.



Batará de Garganta Oscura

(*Thamnomanes ardesiacus*)

Dusky-throated Antshrike

14 cm

Nombre local

Plumaje general color negro, con alas y rabadilla con bordes pizarra. Nuca y garganta blanco cremoso. La cera y anillo alrededor del ojo amarillo brillante. Pecho, vientre y flancos finamente barrados de blanco. Calzones y parte de la cola castaño rufo. La cola con varias bandas delgadas de color gris y con la punta blanca. Se le encuentra dentro del bosque y en áreas abiertas cerca de ríos.



Batará Azul-Acerado

(*Thamnomanes schistogynus*)

Bluish-slate Antshrike

14,5 cm

Nombre local

Presenta un plumaje general de color gris. La garganta es más pálida con relación al cuerpo. Hembra, similar al macho, tiene el vientre y las partes inferiores de color canela rufo leonado. El iris es de color café. El pico y los tarsos son de color gris. Se le encuentra dentro del bosque.





11 cm

Hormiguerito de Ojo Blanco

(Epinecrophylla leucophthalma)

White-eyed Antwren

Nombre local

Macho de espalda y la cola marrón olivo, con tres barras alares beige pálido, garganta punteada de blanco y negro. Cara, pecho y vientre gris, más ocre al final. Hembra, similar al macho, excepto la cara, garganta, pecho y vientre color beige oliva. Iris blanco y patas grises. Se le encuentra dentro del bosque.



10 - 11 cm

Hormiguerito Adornado

(Epinecrophylla ornata)

Ornate Antwren

Nombre local

Macho gris a gris marrón, con espalda baja, vientre y rabadilla mas rufa. Garganta negra. Las coberteras son intensamente moteadas de blanco. Hembra canela oliva con espalda rufa y garganta acanalada en blanco y negro. Vientre beige brillante. Iris café, pico y patas grises. Se le encuentra donde hay matas de Bambú.



8 cm

Hormiguerito Pigmeo

(Myrmotherula brachyura)

Pygmy Antwren

Nombre local

Tiene barrado negro con blanco pronunciado en la cabeza, nuca, espalda y rabadilla. Garganta blanca rodeada por una raya malar negra. Tiene dos barras blancas en las alas. Pecho, vientre y calzones amarillo pálido. Iris negro. Pico gris, patas gris amarillento. Hembra similar pero beige en cara y espalda. Se le encuentra en bosque, bosque ribereño y áreas abiertas.

Hormiguerito de Sclater

(*Myrmotherula sclateri*)

Sclater's Antwren

Nombre local

Color general amarillo, barredado de negro pronunciado en la cabeza, nuca, alas, espalda y rabadilla. Garganta amarilla rodeada por una raya malar negra. Iris negro, pico patas gris amarillento. Hembra similar pero ocre en el centro del pecho, con listas angostas y la cabeza. Se le encuentra dentro del bosque.

8,5 cm



Hormiguerito de Flanco Blanco

(*Myrmotherula axillaris*)

White-flanked Antwren

Nombre local

Macho con espalda, cuello y pecho negro pizarra. Vientre más oscuro. Alas negras con manchas blancas. Flancos y parte inferior de las alas blancas. Hembra de nuca y espalda castaño olivo. Cuello, pecho y vientre beige, alas pardo rojizas ligeramente listadas. Pico y patas grises. Se le encuentra dentro del bosque.

10 - 11 cm



Hormiguerito de Ala Larga

(*Myrmotherula longipennis*)

Long-winged Antwren

Nombre local

Macho gris oscuro. Garganta y pecho negro intenso. Alas negras con puntas blancas. Hembra de plumaje general color marrón olivo. Garganta y pecho beige amarillento. Iris café, pico y patas grises. Se le encuentra dentro del bosque.

10 - 11 cm





9,5 - 10 cm

Hormiguero de Ceja Blanca

(*Myrmotherula menetriesii*)

Gray Antwren

Nombre local

Macho gris con una mancha estrecha negra en la garganta. Dos barras blanco y negro en las alas. Hembra gris oliva en la corona y espalda. Vientre, pecho y garganta beige, más claro en la última. Cola corta. Alas sin marcas. Iris café, pico y patas gris. Se le encuentra dentro del bosque.

10 cm



Hormiguerito Bandeado

(*Dichrozona cincta*)

Banded Antbird

Nombre local

Macho de cabeza, nuca y espalda marrón acanelado, cara, garganta, pecho y vientre gris. Pecho con manchas negras y las alas presentan anchas barras beige. Rabadilla con una banda blanca que termina en una cola muy corta con timoneras externas blancas. Pico y patas largos, gris pálido. Se le encuentra dentro del bosque.

11,5 cm



Hormiguerito de Ala Rufa

(*Herpilochmus rufimarginatus*)

Rufous-winged Antwren

Nombre local

Cabeza blanca grisácea con corona y antifaz negro. Garganta blanca, pecho y vientre amarillo. Espalda gris, alas negras con barreado blanco y borde inferior rufo. Cola larga y negra, con el ápice blanco. Iris café. Hembra de corona castaña y dorso oliváceo, corona y antifaz rufo. Se le encuentra dentro del bosque.

Hormiguero de Pecho Amarillo

(*Hypocnemis subflava*)

Yellow-breasted Warbling-Antbird

Nombre local

Hormiguero pequeño y rechoncho, de cabeza y las alas negras, con marcado patrón estriado blanco. Garganta y pecho amarillos, con tonos beige en la nuca. Espalda baja, alas inferiores, rabadilla y cola gris oliváceo. Cola bastante corta de tonos más claro. Pico y patas gris amarillento. Se le encuentra dentro del bosque.

12 cm



Hormiguero Negro

(*Cercomacroides serva*)

Black Antbird

Nombre local

Macho de color negro, alas con barras angostas y bordes color blanco. Hembra café oliváceo, estas últimas tienen el borde angosto beige. Cara, garganta, pecho y vientre con tonos más rufo brillante. Flancos teñidos de oliva. Pico negro y patas grises. Se le encuentra dentro del bosque.

15 cm



Hormiguero Gris

(*Cercomacra cinerascens*)

Gray Antbird

Nombre local

De color gris oscuro, pecho y vientre de tonos más claros. Alas marrón con puntas blancas pequeñas. Cola larga con puntas blancas. Hembra marrón con tonos beige oscuro en pecho y vientre. Rabadilla gris. Iris café, pico y patas grises. Se le encuentra dentro del bosque.

15 cm





13,5 cm

Hormiguero de Ceja Blanca

(*Myrmoborus leucophrys*)

White-browed Antbird

Nombre local

Macho gris con una mancha estrecha negra en la garganta. Dos barras blanco y negro en las alas. Hembra gris oliva en la corona y espalda. Vientre, pecho y garganta beige, más claro en la última. Cola corta. Alas sin marcas. Iris café, pico y patas gris. Se le encuentra dentro del bosque.



13,5 cm

Hormiguero de Cara Negra

(*Myrmoborus myotherinus*)

Black-faced Antbird

Nombre local

Macho gris pizarra, con la cara y garganta negro intenso. Alas negras también, con marcas blancas en las puntas. Cola ligeramente más oscura. Hembra más apagada, de plumaje general marrón oliva con la punta de las alas negras y las partes inferiores beige claro. Tiene máscara negra y la garganta blanca. Iris marrón rojizo. Se le encuentra dentro del bosque.

EBA

14,5 cm

Hormiguero de Líneas Blancas

(*Percnostola lophotes*)

White-lined Antbird

Nombre local

El macho es gris pizarra, con la corona negra. Alas negras con tres líneas blancas en el borde superior. Hembra con corona, nuca, espalda y cola marrón rojizo. Cara, garganta, pecho y vientre blancos. Ambos sexos tienen una cresta en la corona que se eriza cuando está excitado. Iris marrón rojizo. Se le encuentra donde hay matas de Bambú.



Hormiguero de Cola Castaña

(*Myrmeciza hemimelaena*)

Chestnut-tailed Antbird

Nombre local

Macho de corona, nuca, lados de la cabeza y flancos grises, garganta y pecho negros. Vientre blanco, espalda y rabadilla marrón rufo. Alas beige oscuro, con barrado blanco y negro en la parte superior. Cola corta, castaño rojizo. Hembra con cabeza color marrón, garganta y pecho canela rufo y vientre beige en tonos claros. Se le encuentra dentro del bosque o donde hay matas de Bambú.



12 cm



Hormiguero de Garganta Negra

(*Myrmeciza atrothorax*)

Black-throated Antbird

Nombre local

El macho tiene la corona, nuca y espalda marrón oliváceo opaca, más oscura en la rabadilla. La garganta es negro intenso y el pecho moteado en tonos grisáceos. Presenta una mancha blanca en la espalda. Alas ligeramente largas negras, con puntos blancos pequeños en coberteras. La hembra tiene la coloración rojiza en la parte ventral. Se le encuentra dentro del bosque.



14 cm

Hormiguero de Goeldi

(*Hormiguero de Goeldi*)

Goeldi's Antbird

Nombre local

El macho es totalmente negro, con la piel desnuda alrededor del ojo gris con una mancha azul detrás del ojo. Hembra rufa, con la garganta blanca y frente gris. Ambos tienen el iris rojo. Se le encuentra dentro del bosque o donde hay matas de Bambú.

EBA

18 cm





17 - 18 cm

Hormiguero Plomizo

(*Myrmeciza hyperythra*)

Plumbeous Antbird

Nombre local

Hormiguero grande y rechoncho, de plumaje gris oscuro, excepto alas y cola que son negras. Alas con puntos blancos. La piel alrededor del ojo es celeste y el iris café rojizo. La hembra tiene las partes inferiores de castaño rufo intenso. Se le encuentra dentro del bosque..



18,5 cm

Hormiguero Tizado

(*Myrmeciza fortis*)

Sooty Antbird

Nombre local

Macho gris negruzco con corona negra y las alas en tonos marrón con una línea blanca a lo largo del borde. La alrededor del ojo es celeste y el iris marrón. La hembra tiene corona rufa y cara gris. Las partes superiores grisáceas con tonos marrón; alas y cola, castaño rufo; y partes inferiores grises. Se le encuentra dentro del bosque.



14,5 cm

Hormiguero de Garganta Blanca

(*Gymnopithys salvini*)

White-throated Antbird

Nombre local

Macho mayormente gris con alas en tono marrón oscuro. Cara, barbilla y garganta blanca. La corona, nuca, cera y línea del negro. Cola barreada de blanco y negro. Hembra canela rufo, con alas y espalda en tono marrón, barreado de negro. La cola rufa, barreada en negro. Se le encuentra dentro del bosque.

Hormiguero de Cresta Canosa

(*Rhegmatorhina melanosticta*)

Hairy-crested Antbird

Nombre local

Ambos sexos con plumaje marrón, con la piel desnuda alrededor del ojo azul pálido. Cresta y nuca gris claro. Cara negra y alas con tonos castaños. La hembra presenta la espalda y alas moteadas de negro. Se le encuentra dentro del bosque.

15 cm



Hormiguero de Dorso Moteado

(*Hylophylax naevius*)

Spot-backed Antbird

Nombre local

Macho de cara gris, corona y nuca marrón anteado y espalda negra moteada de castaño rufo. La garganta es negra, el pecho y vientre son blancos, con manchas negras a través del pecho. Rabadilla café claro y cola negra con una banda subterminal canela. Alas negras con puntas rufas. Hembra con garganta blanca con la raya malar negra, alas con marcas beige y más ocre en la parte ventral. Patas rosadas. Se le encuentra dentro del bosque.

11,5 cm



Hormiguero de Dorso Escamoso

(*Willisornis poecillinotus*)

Scale-backed Antbird

Nombre local

Macho gris con la espalda y alas escamadas blanquinegras. Garganta negra. Hembra color pardo, con la cara beige leonado, garganta blanca y parte ventral gris. No presenta escamas en espalda y alas. La cola tiene la punta blanca. Se le encuentra dentro del bosque.

13 cm





18,5 cm

Ojo-Pelado Moteado de Negro

(*Phlegopsis nigromaculata*)

Black-spotted Bare-eye

Nombre local

Tiene la cabeza, cuello, pecho y vientre negros, con los flancos marrón, la espalda y alas son marrón oliváceo con manchas grandes negras, bordeadas de beige. La base de las alas y cola son rufas y la piel desnuda alrededor del ojo es amplia y de color rojo brillante. Se le encuentra dentro del bosque.



11,5 - 12 cm

Jejenero de Garganta Ceniza

(*Conopophaga peruviana*)

Ash-throated Gnateater

Nombre local

El macho tiene corona castaño oscuro y garganta blanca grisácea. La cara y el pecho son grises. Tiene un pequeño mechón blanco plateado detrás del ojo. Las alas son marrón oscuro con manchas beige, el vientre es parduzco, con el centro blanco. La hembra es marrón, con la corona castaño rufo; la cara y pecho, más rufo. Las alas son beige con la espalda moteada. Se le encuentra dentro del bosque.



14,5 cm

Tororoi Amazónico

(*Hylopezus berlepschi*)

Amazonian Antpitta

Nombre local

El macho es gris pizarra, con la corona negra. Alas negras con tres líneas blancas en el borde superior. Hembra con corona, nuca, espalda y cola marrón rojizo. Cara, garganta, pecho y vientre blancos. Ambos sexos tienen una cresta en la corona que se eriza cuando está excitado. Iris marrón rojizo. Se le encuentra donde hay matas de Bambú.

Tororoi Campanero
(Myrmothera campanisona)
 Thrush-like Antpitta

Nombre local

Macho de corona, nuca, lados de la cabeza y flancos grises, garganta y pecho negros. Vientre blanco, espalda y rabadilla marrón rufo. Alas beige oscuro, con barrado blanco y negro en la parte superior. Cola corta, castaño rojizo. Hembra con cabeza color marrón, garganta y pecho canela rufo y vientre beige en tonos claros. Se le encuentra dentro del bosque o donde hay matas de Bambú.

14,5 cm



Tapaculo de Faja Rojiza
(Liosceles thoracicus)
 Rusty-belted Tapaculo

Nombre local

La cabeza es gris con una ceja blanca estrecha. La corona, nuca, espalda, rabadilla y cola son marrón oxidado. La garganta y el pecho son blancos con un parche amarillo rufo en el centro del pecho. El vientre es beige con barrado blanquinegro. La cola es larga. Se le encuentra dentro del bosque.

19 - 19,5 cm



Gallito-Hormiguero de Gorro Rufo
(Formicarius colma)
 Rufous-capped Antthrush

Nombre local

Tiene corona y nuca color rufo, el resto de la cabeza, la garganta y el pecho son negros. El vientre, región anal y calzones son gris oscuro. La espalda, alas y rabadilla, marrón olivo. Patas largas y marrones. Se le encuentra dentro del bosque.

18 cm

Juv.





18 cm

Gallito-Hormiguero de Cara Negra

(*Formicarius analis*)

Black - faced Antthrush

Nombre local

Corona marrón muy uniforme. La barbilla, garganta y lados de la cabeza son negros con la piel desnuda alrededor del ojo de color blanco azulado y el pico negro. Nuca, espalda, rabadilla y alas son marrón olivo. El pecho, vientre y calzones varían de gris a blanco. La rabadilla es de tonos rufos y la cola es corta y de color café. Las patas son largas y gris azulado. Se le encuentra dentro del bosque.



22,5 cm

Rasconzuelo Estriado

(*Chamaeza nobilis*)

Striated Antthrush

Nombre local

El principalmente color marrón con tonos rubios. Tiene la corona marrón oscuro rojiza, la cera beige y una ceja blanca detrás del ojo. La garganta es blanca. El pecho y vientre, son crema blancuzco con estrías negras. Se le encuentra dentro del bosque.



17 cm

Tira-Hoja de Cola Negra

(*Sclerurus caudacutus*)

Black-tailed Leaf-tosser

Nombre local

Cuerpo marrón pardo, corona oscura, con la barbilla blanca y cola negra. Lados de la cabeza y parte superior del pecho castaño rufo. Espalda, nuca y alas marrón oscuro. La rabadilla marrón rojizo. Pico es relativamente largo, recto y negruzco. Patas negras. Se le encuentra dentro del bosque.

Trepador Oliváceo (*Sittasomus griseicapillus*) Olivaceous Woodcreeper

21 - 23,5 cm



Nombre local

Trepador pequeño de cuerpo delgado y pico gris, corto y recto, sin rayas en la cabeza ni partes inferiores. La cabeza, pecho, espalda y vientre son gris olivo y la parte ventral con un tono más oscuro. Las alas, espalda baja, rabadilla y cola, que es puntiaguda, son rufas. Se le encuentra dentro del bosque.

Trepador de Cola Larga (*Deconychura longicauda*) Long-tailed Woodcreeper

21 - 22 cm



Nombre local

Trepador esbelto y delgado, de color café. Corona y la nuca con estriado beige con apariencia desgarrada. La ceja superciliar estrecha y el anillo ocular beige. Partes inferiores con estriado color beige. El pecho es oliváceo oscuro con estrías grandes vientre más pálido, con listado fino y escaso. Espalda marrón rojizo y cola con espigas largas, castaño rufo. Se le encuentra dentro del bosque.

Trepador de Barbilla Blanca (*Dendrocincla merula*) White-chinned Woodcreeper

20,5 cm



Nombre local

Es de color marrón, sin rayas. La piel desnuda alrededor del ojo es gris y el iris gris azulado. Pico recto, marrón oscuro. Tiene una estrecha mancha blanca en barbilla y garganta. Las alas, rabadilla y cola, son castaño rufo. Se le encuentra dentro del bosque.



20,5 - 22 cm

Trepador Pardo (*Dendrocincla fuliginosa*) Plain-brown Woodcreeper

Nombre local

Castaño pardo, sin listado prominente. La cara es gris, el pico negro es largo, casi recto. La corona más oscura. Los lados de la cabeza y la garganta son claros, con tono oliváceo y aspecto jaspeado en beige. Parte del vientre, calzones y la cola son castaño rufo. Iris marrón grisáceo. Se le encuentra dentro del bosque.



13,5 - 14 cm

Trepador Pico de Cuña (*Glyphorhynchus spirurus*) Wedge-billed Woodcreeper

Nombre local

Pequeño, con pico corto en forma de cuña. Corona y lados de la cabeza café oscuro. El estriado beige que recorre desde encima del ojo hacia la espalda y alas es color café. Garganta rufa y pecho oliváceo con rayitas cortas beige que se vuelven más finas y escasas en la parte posterior. El vientre es gris, más pálido. La rabadilla y la cola son rufo castaño. Se le encuentra dentro del bosque.



25 cm

Trepador de Garganta Canela (*Dendrexetastes rufigula*) Cinnamon-throated Woodcreeper

Nombre local

De corona marrón oscuro con moteado blanco, garganta canela en tonos beige. Pecho y espalda superior con puntos blancos bordeados de negro y el vientre marrón, barrado negro. La espalda, alas, rabadilla y cola de color rufo. Pico grueso y blanquecino con punta ligeramente aguileña. Piel desnuda alrededor del ojo gris claro azulado. Se le puede encontrar dentro del bosque y cerca a quebradas.

Trepador de Pico Largo

(*Nasica longirostris*)

Long-billed Woodcreeper

Nombre local

De cabeza pequeña y con corona oscura con finas rayas castaño pálido. Línea blanca estrecha detrás del ojo. De cuello largo, delgado con la garganta blanca. Espalda, alas, rabadilla y cola larga de color rufo. Vientre y calzones marrón castaño. Pico largo y casi recto, blanco marfil. Se le puede encontrar cerca de las quebradas.

34 cm



Trepador Barrado Amazónico

(*Dendrocolaptes certhia*)

Amazonian Barred-Woodcreeper

Nombre local

El plumaje general con barras angostas por encima y por debajo. Corona, nuca, lados de la cabeza y espalda superior son marrón claro con bordes negros. Las alas, rabadilla y cola son castañas. Vientre beige, más pálido, barbilla y garganta, color blanco cremoso, sin barras. Pico curvado ligeramente, marrón con tonos rojizos. Se le encuentra dentro del bosque.

28 cm



Trepador de Vientre Bandeado

(*Dendrocolaptes picumnus*)

Black-banded Woodcreeper

Nombre local

Presenta garganta y pecho rayado; el vientre barrado. La cabeza y nuca son café oscuro con estrias pardas amarillentas. Cuerpo, café oliváceo, más rufo en alas, rabadilla y cola. Garganta beige con estrias café oscuro. Vientre y flancos más pálidos, color gris café, marcados con barras negruzcas. Tiene una línea postocular beige. Pico negro robusto y corto. Habita dentro del bosque.

29 cm





30 cm

Trepador de Pico Fuerte

(*Xiphocolaptes promeropyrhyndus*)

Strong-billed Woodcreeper

Nombre local

Corona marrón negruzco, espalda y alas castaño, con rayas beige. La cara de tonos marrón oscuro y beige, con línea beige detrás del ojo, bien definida. Barbilla y garganta blanco con beige. Rabadilla y cola castaño rufo, pecho y vientre con delgadas rayas beige. El pico, grande y robusto, gris oliváceo. Se le encuentra dentro del bosque.



20 - 22 cm

Trepador Elegante

(*Xiphorhynchus elegans*)

Elegant Woodcreeper

Nombre local

Color marrón castaño, corona y nuca oscuras, con manchas beige. Espalda con rayas beige, con bordes negros. Alas, rabadilla y cola, castaño rojizo. Garganta clara color beige. Pecho con moteado beige. Pico delgado, casi recto, gris azulado. Se le encuentra dentro del bosque.



26 cm

Trepador de Garganta Anteada

(*Xiphorhynchus guttatus*)

Buff-throated Woodcreeper

Nombre local

Cabeza beige con rayas marrón oscuro, garganta beige, con rayas canela, anchas, hacia el pecho. Vientre y calzones marrón oliva. Espalda, rabadilla y alas marrón cálido, con algunas rayas. Cola marrón rojiza, pico largo, pálido, ligeramente curvo y enganchado en la punta. Se le encuentra dentro del bosque.

Trepador de Pico Recto

(*Dendroplex picus*)

Straight-billed Woodcreeper

22,5 cm



Nombre local

Delgado, con pico claro, recto y afilado. La cabeza y nuca son oscuras, con un estriado fino, más claro y una línea superciliar blanquecina. La garganta es más clara, con el pecho moteado claro y bordes negros. El vientre es marrón claro. Alas, espalda y rabadilla color marrón rojizo. La cola es marrón castaño. Se le encuentra dentro del bosque.

Pico Guadaña de Pico Rojo

(*Campylorhamphus trochilirostris*)

Red-billed Scythebill

24 cm



Nombre local

Altamente distintivo por el largo pico curvo de color rojizo. Cuerpo marrón castaño con rayas beige en cabeza, garganta, espalda superior, y en el pecho. Alas, rabadilla y cola son castaño rufo y el vientre, con tonos castaño claro. Se le encuentra dentro del bosque o donde hay matas de Bambú.

Pico Lezna de Pico Fino

(*Xenops tenuirostris*)

Slender-billed Xenops

10, - 10,5 cm



Nombre local

Pequeño, de corona marrón oscuro, con rayas blancas. Línea superciliar blanca y otra similar en la altura de la mejilla. Garganta blanca, espalda marrón rojizo, con rayas beige. El vientre y calzones son castaño oliváceo con moteado blanco. Las alas y la rabadilla son canela rojizo intenso y la cola es rufa, con dos líneas verticales negras en los extremos. Se le encuentra dentro del bosque



11,5 - 12,5 cm

Pico-Lezna Simple

(*Xenops minutus*)

Plain Xenops

Nombre local

Pequeño, sin rayas. Pico corto y agudo ligeramente torcido hacia arriba. Corona marrón con rayas finas beige. Cara canela, con moteado beige y línea superciliar notoria y otra similar en la mejilla. Espalda café oliva, tornándose más rufa en rabadilla y cola. Vientre claro, canela oliváceo, sin rayas. Alas canelas, en tono oscuro, más rufo hacia las puntas. Se le encuentra dentro del bosque.



11,5 - 12,5 cm

Pico-Lezna Rayado

(*Xenops rutilans*)

Streaked Xenops

Nombre local

Pequeño, de pico corto y agudo ligeramente torcido hacia arriba. Corona, nuca y espalda café oliváceo con rayas finas beige. Cara canela, con moteado beige y línea superciliar y otra similar, menos conspicua, en la mejilla. Garganta blanca opaca, pecho con rayas blancas más opacas y más gruesas, junto con el vientre, son café grisáceo. Alas canela, con bordes rufo canela, como la rabadilla y cola. Se le encuentra dentro del bosque.



17 - 18 cm

Hornero de Pata Pálida

(*Furnarius leucopus*)

Pale-legged Hornero

Nombre local

Corona marrón oscura, más claro en el rostro. Amplia línea superciliar blanca. Garganta blanca, pecho y vientre color canela anteado. Espalda, alas, rabadilla y cola castaño rufo. El borde inferior de las alas es marrón oscuro. Iris castaño. Pico largo, casi recto. Patas rosadas. Se le puede encontrar cerca de las quebradas.

Hoja-Rasquero de Mejilla Oscura

(*Anabazenops dorsalis*)

Dusky-cheeked Foliage-gleaner

18, 5 cm



Nombre local

Corona, nuca, espalda y rabadilla marrón rojizo, tornándose más rojizo en la cola. Línea superciliar delgada y piel desnuda alrededor del ojo beige claro. Mejillas oscuras, garganta crema y pecho, vientre y calzones grisáceos. Se le encuentra dentro del bosque o donde hay matas de Bambú. Se le encuentra dentro del bosque.

Limpia-Follaje de Ala Castaña

(*Philydor erythropterum*)

Chestnut-winged Foliage-gleaner

16 - 17 cm



Nombre local

Alas y cola rufo brillante, cera bien marcada, color ocre brillante y garganta beige ambas con tonos leonados. Espalda y corona son oscuras, marrón grisáceo. Pecho marrón opaco y vientre beige grisáceo. Se le encuentra dentro del bosque.

Limpia-Follaje de Frente Anteada

(*Philydor rufum*)

Buff-fronted Foliage-gleaner

18,5 - 19 cm



Nombre local

Corona y línea detrás del ojo color café oscuro, tornándose más clara hacia la nuca y espalda, la cual es marrón oliváceo. Frente, línea superciliar, anillo ocular y la garganta beige acanelada; más pálido y opaco en el pecho y más leonado hacia el vientre y flancos. Las alas y la cola, larga, son castaño rufo. Se le encuentra dentro del bosque.



20 cm

Pico-Recurvo Peruano

(Syndactyla ucayalae)

Peruvian Recurvebill

Nombre local

Pico fuerte, muy distintivo, grueso y en forma de cuña. Plumaje uniforme rufo, excepto la espalda, pecho y vientre que son de color canela opaco. Patas grises. Se le encuentra donde hay matas de Bambú.



17 - 18 cm

Pico-Gancho de Ala Castaña

(Ancistrops strigilatus)

Chestnut-winged Hookbill

Nombre local

De color general pardo, con línea superciliar y garganta beige claro. Corona, nuca y espalda pardo oscuro con rayas beige. Pecho y vientre más claro, uniforme y ligeramente rayado. Alas y la cola son castaño rufo. Se le encuentra dentro del bosque.



19, 5 - 20 cm

Hoja-Rasquero Rojizo

(Clibanornis rubiginosus)

Ruddy Foliage-gleaner

Nombre local

Espalda, alas y cola marrón rojizo, y garganta y pecho superior son canela naranja brillante, tornándose pálido en los lados del cuello. El resto del pecho y vientre, más claros son marrón oliva. Pico largo, recto y robusto, de tonos grisáceos. El anillo ocular, mejillas y la cera son pardo oliva. Se le encuentra dentro del bosque.

Trepamusgo Listado

(*Thripadectes holostictus*)

Striped Treehunter

21 cm



Nombre local

Cabeza, nuca y espalda superior son café con rayas beige. Barbilla y garganta beige y el resto de la espalda y las alas son castaño rufo, tornándose brillante en la cola. Pecho pardo oliváceo, con rayas finas beige que desaparecen suavemente en el vientre. Se le encuentra dentro del bosque.

Hoja - Rasquero de Corona Castaña

(*Automolus rufipileatus*)

Chestnut-crowned Foliage-gleaner

18 - 19 cm



Nombre local

Cabeza, nuca, espalda y alas marrón rojizo. Corona castaño rufo brillante. Garganta y lados del cuello beige pálido. Pecho y vientre pardo amarillento. La rabadilla y cola son castaño rufo. Iris amarillo brillante. Se le encuentra dentro del bosque o donde hay matas de Bambú.

Hoja-Rasquero de Lomo Pardo

(*Automolus melanopezus*)

Brown-rumped Foliage-gleaner

19 cm



Nombre local

De plumaje apagado, con máscara marrón oscuro e iris rojo naranja. Área malar es ocre brillante y la garganta beige, ambos con tono leonado. Pecho y vientre canela leonado, más pálido. La espalda y alas son pardo rojizo y la cola es canela rufa. Se le encuentra dentro del bosque o donde hay matas de Bambú.



19 - 20 cm

Hoja-Rasquero de Garganta Anteada

(*Automolus ochrolaemus*)

Buff-throated Foliage-gleaner

Nombre local

Cabeza café, más oscura en la corona y a los lados con rayas beige en la mejilla. La piel desnuda alrededor del ojo y la garganta son beige brillante. Nuca, espalda y alas castaño oscuro brillante. La rabadilla y cola castaño rufo. Pecho pálido con rayas beige. Flancos y vientre pardo amarillento. Se le encuentra dentro del bosque.



17 cm

Rondabosque Rayado

(*Automolus subulatus*)

Striped Woodhaunter

Nombre local

Cabeza, pecho y espalda pardo oliváceo con rayas beige, que se tornan borrosas. Garganta beige brillante. El vientre es oliva, más claro y las alas son rufo, ambos leonados. Rabadilla y cola rufo castaño. Pico largo, delgado que le da una apariencia de "cabeza plana". Se le encuentra dentro del bosque.



18 - 19 cm

Hoja-Rasquero de Dorso Olivo

(*Automolus infuscatus*)

Olive-backed Foliage-gleaner

Nombre local

Cabeza, espalda y alas marrón oliva, garganta blanquecina prominente. Pecho y vientre gris oliva, más oliváceo en los flancos. Rabadilla y cola rojizas. Nótese una línea superciliar muy delgada, blanca con puntas negras. Se le encuentra dentro del bosque.

Cola-Espina Jaspeado

(*Cranioleuca gutturata*)

Speckled Spinetail

Nombre local

Cola-Espina pequeño de corona, alas y cola rufas. La nuca y espalda son pardo oliváceo. Garganta y barbilla ante claro. Pecho y flancos, beige y jaspeados con pequeñas motas oscuras. Vientre gris anteaado. Línea superciliar delgada y blanca. Su pico es recto, puntiagudo y grisáceo. Se le encuentra dentro del bosque.



Cola-Espina de Corona Parda

(*Synallaxis gujanensis*)

Plain-crowned Spinetail

Nombre local

Corona pardo grisáceo, tornándose a pardo oliváceo en la nuca espalda, pecho y flancos. Las mejillas son grises, la cera y la garganta, blancas. Alas y la cola rojizas. Vientre blanco con tonos canela. Se le puede encontrar cerca de las quebradas.



Cola-Espina Rojizo

(*Synallaxis rutilans*)

Ruddy Spinetail

Nombre local

Cabeza, espalda y pecho rojizos. La cera y garganta negras. Vientre gris parduzco. Las alas, los flancos y la cola marrón, más oscura en la última. Se le encuentra dentro del bosque o donde hay matas de Bambú.





10,5 cm

Moscareta de Corona Amarilla

(*Tyrannulus elatus*)

Yellow-crowned Tyrannulet

Nombre local

Plumaje general verde olivo con corona negra con una mancha central amarillo brillante. Anillo ocular blanco opaco. Los lados de la cabeza y la nuca son grises, más pálidos en mejillas y garganta. Pecho y vientre más amarillento. Alas negras con dos bandas amarillas. Cola oscura con puntas amarillas. Pico y patas negros. Se le encuentra dentro del bosque.



12,5 cm

Fío-Fío de la Selva

(*Myiopagis gaimardii*)

Forest Elaenia

Nombre local

Corona negra con una línea central blanco amarillenta. Los lados de la cabeza y nuca son grises. La garganta blanca grisácea. Espalda, rabadilla y cola verde oliva. Alas marrones con dos bandas y bordes amarillos. El pecho opaco es oliváceo tornándose amarillo en el vientre. Pico y patas gris oscuro. Se le encuentra dentro del bosque.



12 - 12,5 cm

Fío-Fío Gris

(*Myiopagis caniceps*)

Gray Elaenia

Nombre local

El plumaje general es gris oscuro. Corona con línea central blanca. Alas negras con dos bandas y rayas blancas. Los lados de la cara, garganta y pecho son gris claro. Vientre blanco grisáceo. Hembra olivácea con línea central amarilla en la corona amarillo en alas y vientre. Se le encuentra dentro del bosque.

Moscareta de Lores Blancos

(*Ornithion inerme*)

White-lored Tyrannulet

Nombre local

Corona gris con una línea superciliar blanca. Cera blanca. La garganta y el pecho, gris claro. Vientre amarillo. Espalda, rabadilla y cola verde olivo. Alas oscuras con manchas blancas. Cola corta. Se le encuentra dentro del bosque.

8,5 cm



Coritopis Anillado

(*Corythopsis torquatus*)

Ringed Antpipit

Nombre local

Cabeza de color gris. Espalda alas y cola marrón claro. Garganta blanca. Pecho blanco manchado de negro con rayas verticales negras hacia el vientre. Cola corta. Se le encuentra dentro del bosque, en ramas bajas muy cerca del suelo.

14 cm



Mosquerito de Vientre Ocráceo

(*Mionectes oleagineus*)

Ochre-bellied Flycatcher

Nombre local

Cabeza, espalda y cola verde oliváceo. La cara, barbilla y garganta tienen tonos grises. Pecho y abdomen canela leonado, ocráceo en los flancos. Alas oscuras con barras alares y puntas rufas. Pico negro y patas grises. Se le encuentra dentro del bosque.

13 cm





13,5 cm

Mosquerito de Gorro Sepia

(*Leptopogon amaurocephalus*)

Sepia-capped Flycatcher

Nombre local

Corona marrón y nuca más clara. Cera y piel alrededor del ojo beige moteado con una mancha oscura en la zona auricular. La garganta es gris olivácea. Pecho y flancos, oliva intenso. La espalda y rabadilla verde oliva. Vientre amarillo pálido. Alas oscuras con dos barras beige. Cola café rojiza. Iris amarillo pálido y patas oscuras. Se le encuentra dentro del bosque o donde hay matas de Bambú.



6,5 cm

Tirano-Pigmeo de Cola Corta

(*Myiornis ecaudatus*)

Short-tailed Pygmy-Tyrant

Nombre local

Cabeza gris, cera, línea superciliar y anillo ocular color blanco. La garganta es blanca. El pecho gris y el vientre blanco, amarillo en la rabadilla. Espalda verde oliva. Alas y cola amarillas con barrado negro. Cola muy corta. Se le encuentra dentro del bosque.



EBA

10,5 cm

Tirano-Pigmeo de Cresta Larga

(*Lophotriccus eulophotes*)

Long-crested Pygmy-Tyrant

Nombre local

Verde olivo, con cresta de plumas negras bordeadas de gris. Lados de la cara grises, cera y piel alrededor del ojo de color blanco pálido. El pecho y el vientre, más claro con franjas grises. Alas con barras negras. Iris blanco amarillento. Se le encuentra dentro del bosque o donde hay matas de Bambú.

Tirano-Pigmeo Flamulado

(*Hemitriccus flammulatus*)

Flammulated Pygmy-Tyrant

Nombre local

Plumaje general verde oliva apagado. La cera y garganta son claras, con tono gris. Vientre gris, más claro. Pintas amarillas en bordes externo de alas y calzones. Iris café, patas rosadas. Pico oscuro con rosado en la parte inferior. Se le encuentra dentro del bosque o donde hay matas de Bambú.

11 cm



Tirano-Todi de Vientre Blanco

(*Hemitriccus griseipectus*)

White-bellied Tody-Tyrant

Nombre local

Cabeza, espalda, alas y cola son verde oliva, incluido los flancos. Garganta, pecho y vientre son blanco grisáceo. Alas oscuras con dos barras lineales amarillo-verde. La piel alrededor del ojo es gris. Iris claro. Pico largo y patas grises. Se le encuentra dentro del bosque.

11 cm



Tirano-Todi de Johannes

(*Hemitriccus iohannis*)

Johannes's Tody-Tyrant

Nombre local

Cabeza, espalda, alas, flancos y cola, verde oliva apagado. Cera y piel alrededor del ojo beige oscuro. Garganta gris con rayas oscuras borrosas que van hasta el pecho oliváceo. Vientre amarillo. Alas con bordes amarillos formando tenues barras. Iris claro. Se le encuentra en bordes de bosque o río, y áreas abiertas.

11 cm





9,5 cm

Espatulilla de Frente Rojiza

(Poecilotriccus latirostris)
Rusty-fronted Tody-Flycatcher

Nombre local

Corona y nuca color gris. Espalda, alas, flancos y cola son verde oliva. Garganta, pecho y vientre, blanco grisáceo. La piel alrededor del ojo, mejillas y frente son beige rojizo. Alas con bordes rufo leonado y amarillo hacia las puntas. Cola corta amarillenta. Pico corto y estrecho y patas grises. Se le encuentra dentro del bosque.



10 cm

Espatulilla Moteada

(Todiostrom maculatum)
Spotted Tody-Flycatcher

Nombre local

Cabeza gris, con cera en tono claro. Garganta blanca con moteado gris negruzco hacia el pecho y flancos. Pecho y vientre amarillo pálido. Espalda, alas y flancos verde oliva. Alas negras de bordes amarillos. Cola gris con bordes blancos. Pico oscuro largo y plano. Iris pálido. Se le encuentra en bordes de bosque o río, y áreas abiertas.



9 cm

Espatulilla de Ceja Amarilla

(Todiostrom chrysocrotaphum)
Yellow-browed Tody-Flycatcher

Nombre local

Corona y lados de la cabeza color negro, con ancha superciliar amarilla que va desde la región detrás del ojo hasta la nuca. Espalda, alas y cola verde oscuro. Garganta blanca, pecho y vientre amarillo brillante. Iris y patas negros. Se le encuentra en bordes de bosque o río, y áreas abiertas.

Pico-Plano Oliváceo

(*Rhynchocyclus olivaceus*)

Olivaceous Flatbill

Nombre local

El plumaje es verde oliva. Con garganta clara y vientre de color amarillo pálido. Las alas con barras amarillas. El anillo ocular es blanco y rodea el iris negro. Pico ancho y patas grises.



Pico-Ancho Azufrado

(*Tolmomyias sulphurens*)

Yellow-olive Flycatcher

Nombre local

Cabeza gris con la cera y anillo alrededor del ojo, claros. Mejillas y garganta gris pálido. Pecho y flancos amarillo oliváceo. Vientre y calzones amarillo azufre intenso. Espalda y rabadilla, verde oliva brillante. Alas oscuras con dos barras amarillas y bordes oliva. Cola oscura con bordes verdosos. Patas oscuras e iris pálido. Se le encuentra en bordes de bosque y áreas abiertas.

12,5 - 14 cm



Pico-Ancho de Ala Amarilla

(*Tolmomyias assimilis*)

Yellow-margined Flycatcher

Nombre local

Plumaje general verde olivo. La corona, nuca y lados de la cabeza gris oscuro. Cera y anillo alrededor del ojo blanco opaco. La garganta y el pecho de color gris pálido con leves líneas claras, tornándose amarillo en el vientre. Las alas son oscuras con bordes amarillo brillante. Iris gris claro. Se le encuentra dentro del bosque.

13,5 cm





12 cm

Pico-Ancho de Pecho Amarillo

(*Tolmomyias flaviventris*)

Yellow-breasted Flycatcher

Nombre local

Plumaje general verde olivo. Cera ocrácea. La garganta, el pecho y anillo ocular son amarillo brillante. Vientre amarillo opaco. Alas y cola oscuras. Alas con dos barras amarillas y bordes del mismo color. Pico negro aplanado lateralmente. Se le encuentra en bordes de bosque o río, y áreas abiertas.



15,5 cm

Mosquero Real

(*Onychorhynchus coronatus*)

Royal Flycatcher

Nombre local

Plumaje general es marrón oliva. Con cresta larga y roja, en forma de abanico (visible solo en apareamiento y disputa), con las puntas negras. Garganta beige clara. Pecho canela barrado café y vientre leonado muy pálido. Rabadilla, calzones y cola naranja leonado. Alas oscuras con pintas beige. Iris café y patas naranja. Se le encuentra dentro del bosque.



12 - 12,5 cm

Mosquerito de Pecho Rayado

(*Myiophobus fasciatus*)

Bran-colored Flycatcher

Nombre local

Plumaje general marrón rojizo oscuro. Garganta y pecho claros, con rayas oscuras hasta los flancos, tornándose amarillo pálido en el vientre. Alas oscuras con dos barras de color beige pálido. Pico marrón. Se le encuentra dentro del bosque.

Mosquerito de Cola Rojiza

(*Terenotriccus erythrurus*)

Ruddy-tailed Flycatcher

Nombre local

La cabeza, hombros y espalda son gris oliva, tornándose leonado rufo en la rabadilla. El pecho es canela rojizo y el vientre beige, más pálido. Cola canela rojiza. Cera blanca, el anillo ocular y la garganta beige pálido. Alas café oscuro, con márgenes anchos rojizos. Patas color carne. Se le encuentra dentro del bosque.

10 cm



Pibí Boreal

(*Contopus cooperi*)

Olive-sided Flycatcher

Nombre local

Plumaje general gris oliváceo, con tonos pardos en flancos. Corona, alas y cola más oscuras. Garganta blanca, pecho y vientre color gris claro. Manchas blancas en lados de espalda inferior. Cola corta y pico oscuro. Se le encuentra dentro del bosque.

B
18 cm



Pibí Tropical


(*Contopus cinereus*)

Tropical Pewee

Nombre local

Plumaje general gris oliváceo. Corona, con tonos castaño oscuro. Garganta blanca amarillenta. Mejillas, lados del cuello, pecho y flancos son marrón grisáceo con tonos oliva. Vientre amarillo pálido, más claro en rabadilla. Alas oscuras con dos barras claras y bordes beige y patas negras. Se le encuentra dentro del bosque.

14 cm





Mosquero Bermellón

(Pyrocephalus rubinus)

Vermillion Flycatcher

Nombre local

Plumaje general rojo escarlata. Nuca, espalda, alas y cola, negras. Línea a través del ojo, a manera de antifaz, negro también. Iris, pico y patas negros. Hembra gris ceniza. Línea superciliar y gargantas claras, pecho y vientre blancos con pintas color cenizo. Se le encuentra en bordes de río.



13,5 cm

Tirano de Agua Arenisco

(Ochthornis littoralis)

Drab Water Tyrant

Nombre local

Plumaje pardo arenoso. Corona, alas y cola oscuras. Garganta clara, pecho, vientre y rabadilla, más pálidos. La cera y línea superciliar blanca. Pico y patas negras. Se le encuentra en bordes de río.



15 cm

Mosquero Pirata

(Legatus leucophaeus)

Piratic Flycatcher

Nombre local

Plumaje pardo cenizo, con ceja blanquecina y línea amarilla oculta que bordea la corona, seguida de antifaz oscuro que atraviesa el ojo desde la cera a la nuca. Garganta blanca, con tonos amarillo pálido en pecho y vientre. Pecho y flancos con líneas oscuras, color café. Pico corto, ancho y oscuro. Se le encuentra dentro del bosque.

Mosquero Social

(*Myiozetetes similis*)

Social Flycatcher

Nombre local

Corona y antifaz gris oscuro, resto de la cabeza y gargantas blancas; pecho y vientre amarillo intenso. Espalda, alas y cola marrón olivo. Iris negro y pico gris oscuro. Se le encuentra en bordes de río.

17 - 17,5 cm



Mosquero de Gorro Gris

(*Myiozetetes granadensis*)

Gray-capped Flycatcher

Nombre local

Cabeza gris con corona, ligeramente crestada, con una mancha anaranjado rufa, poco visible. Línea superciliar y frente, blancas. Lados de la cara oscuros. Espalda, alas y cola oliváceas. Alas oscuras con bordes apagados. Garganta blanca. Pecho y vientre amarillo brillante. Iris gris. Se le encuentra en bordes de río.

17 cm



Mosquero de Pecho Oscuro

(*Myiozetetes luteiventris*)

Dusky-chested Flycatcher

Nombre local

Cabeza y espalda marrón oscuro, con tono oliváceo en alas y cola. No presenta marcas en alas. La garganta es blanca y el pecho amarillo, ambos con rayas oliva oscuro, tornándose amarillo intenso en el vientre. Cola larga. Se le encuentra en bordes de bosque y áreas abiertas.

b
14,5 - 15 cm





21 - 22 cm

Bienteveo Grande (*Pitangus sulphuratus*) Great Kiskadee

Nombre local

Corona negra con centro amarillo. Cabeza negra, con una ancha banda color blanco encima de los ojos. Garganta blanca, pecho y vientre amarillo brillante. Nuca y espalda, café oliváceo. Alas y cola rufas. Se le encuentra en bordes de bosque y áreas abiertas. Su canto suena como "Victor diaz".



17,5 - 18 cm

Bienteveo Menor (*Pitangus lictor*) Lesser Kiskadee

Nombre local

Pequeño, de pico delgado. Similar al Bienteveo Grande pero de menor tamaño. Alas café oliváceas con puntas rufas. Se le encuentra en bordes de río.



^B
21 cm

Mosquero de Vientre Azufrado (*Myiodynastes luteiventris*) Sulphur – bellied flycatcher

Nombre local

Plumaje pálido con rayas negras en todo el cuerpo. La corona, espalda y alas son parduzcas. Línea superciliar y mejillas blancas, sin marcas. Banda negra que cruza los ojos, a manera de antifaz. Garganta blanca, pecho y vientre amarillo azufre claro. Alas con bordes blancos. Cola marrón rufa. Se le encuentra en bordes de bosque y áreas abiertas.

Mosquero Rayado

(*Myiodynastes maculatus*)

Streaked Flycatcher

21,5 cm



Nombre local

El plumaje es café con tonos beige, muy rayado. La corona canela con rayas negras y una mancha amarilla oculta. Ceja y mejillas, amarillo pálido y antifaz negro. La garganta, pecho y vientre son blancos con rayas oscuras, tornándose amarillento hacia los flancos. Alas oscuras, rabadilla y cola con tonos rojizos. Se le encuentra en bordes de bosque y áreas abiertas.

Mosquero Picudo

(*Megarynchus pitangua*)

Boat-billed Flycatcher

23 - 23,5 cm



Nombre local

Corona negra, con una mancha amarilla, poco visible. Con antifaz negro que incluye cera y mejillas y una ceja superciliar ancha blanca, por encima. La nuca, espalda y hombros, marrón olivo. Cuello y garganta blancos. Pecho y vientre amarillo brillante. Alas y cola marrones. Pico grueso y ancho negro. Se le encuentra en bordes de río.

Mosquero-Pizarroso Coronado

(*Empidonomus aurantioatrocristatus*)

Crowned Slaty Flycatcher

A
16,5 - 18 cm



Nombre local

Es gris parduzco, con la corona negra, con una mancha amarillo brillante, semioculta. Lados de la cara, con tono parduzco claro, con una línea superciliar más oscura. La garganta y el pecho, gris claro, más amarillento en el vientre. Alas y cola larga, oscuras. Pico y patas negros. Se le encuentra en bordes de bosque o río, y áreas abiertas.



22 cm

Tirano Tropical (*Tyrannus melancholicus*) Tropical Kingbird

Nombre local

Cabeza gris con una mancha naranja oculta en la corona y un antifaz oscuro en el rostro. Garganta blanco grisácea tornándose olivo amarillento en el pecho. El vientre y calzones son amarillo brillante. La espalda y rabadilla, gris oliváceo. Alas y cola negruzcas. Pico y patas oscuros. Se le encuentra en bordes de bosque y áreas abiertas.



20,5 - 21 cm

Plañidero Grisáceo (*Rhytipterna simplex*) Grayish Mourner

Nombre local

Gris uniforme, más claro en garganta, pecho y vientre. Corona con una pequeña cresta marrón. Alas y cola con tonos castaño. Rabadilla marrón, iris rojizo. Pico y patas oscuros. Se le encuentra dentro del bosque.



18 - 19 cm

Siristes de Lomo Blanco (*Sirystes albocinereus*) White-rumped Sirystes

Nombre local

Gris claro, con corona, a manera de cresta, color negro. Lados de la cara, gris oscuro. Vientre y rabadilla, blancas. Alas con bordes blancos y cola, oscuras. Se le encuentra dentro del bosque.

Copetón de Cresta Oscura

(*Myiarchus tuberculifer*)

Dusky-capped Flycatcher

17 - 18 cm

Nombre local

Corona negra con una cresta corta. Garganta y pecho grises, vientre amarillo brillante. La nuca, espalda y mejillas, marrón oliváceo oscuro. Alas y cola pardas, con bordes rufos. Pico y patas negros. Se le encuentra dentro del bosque.



Copetón de Cresta Corta

(*Myiarchus ferox*)

Short-crested Flycatcher

18,5 - 19 cm

Nombre local

De cresta corta. Espalda y alas marrón oliváceo, más oscuro en la cabeza y cola. La garganta y pecho son grises. El vientre y rabadilla son amarillo intenso. Alas con dos bandas y bordes claros. Pico negro. Se le encuentra en bordes de bosque o río, y áreas abiertas.



Pico-Plano Cabezón

(*Ramphotrigon megacephalum*)

Large-headed Flatbill

12,5 - 13 cm

Nombre local

Plumaje general verde olivo. Línea superciliar, anillo ocular incompleto, son amarillo claro. La garganta y pecho amarillo verdoso, con tonos beige. Vientre amarillo pálido. Alas oscuras con dos barras rufas. Se le encuentra dentro del bosque o donde hay matas de Bambú.





15 - 16 cm

Pico-Plano de Cola Rufa

(*Ramphotrigon ruficauda*)

Rufous-tailed Flatbill

Nombre local

Cabeza y espalda color verde olivo. Cara gris con el anillo alrededor del ojo blanco, incompleto. Pecho olivo claro que se torna amarillo en el vientre. Alas, rabadilla y cola rufas. Se le encuentra dentro del bosque.



16 cm

Pico-Plano de Cola Oscura

(*Ramphotrigon fuscicauda*)

Dusky-tailed Flatbill

Nombre local

Cabeza y espalda color verde olivo. Cara gris con una ceja amarilla delgada. Rayas oliváceas borrosas en garganta y pecho, amarillos. Alas, rabadilla y cola rufas. Vientre amarillo. Se le encuentra dentro del bosque o donde hay matas de Bambú.



20,5 - 21cm

Atila de Ojo Blanco

(*Attila bolivianus*)

Dull-capped Attila

Nombre local

Plumaje general marrón leonado. Corona grisácea. Cabeza, espalda y cola con tono apagado. Garganta, pecho y vientre rufos. Alas oscuras. Iris blanco pálido. Se le encuentra dentro del bosque.

Atila Polimorfo

(*Attila spadiceus*)

Bright-rumped Attila

Nombre local

Plumaje café oliváceo con rayas gris amarillentas en cabeza, garganta y pecho. La corona y lados de la cara son grises. Pecho y vientre blanco amarillento. Cola y rabadilla son amarillo leonado brillante. Alas oscuras con bandas rufas. Iris rojizo y patas grises. Se le encuentra dentro del bosque.

17 cm



Cuervo-Fruterero de Garganta Púrpura

(*Querula purpurata*)

Purple-throated Fruitcrow

Nombre local

Plumaje general negro, con la garganta púrpura, extendido a los lados del cuello, ausente en la hembra. Pico corto, amplio y puntiagudo de color gris. Iris negro y patas grises. Se le encuentra dentro del bosque.

29 - 30 cm



Piha Gritona

(*Lipaugus vociferans*)

Screaming Piha

Nombre local

De plumaje gris, garganta, pecho y vientre claros. Alas, rabadilla y cola gris parduzco. Iris gris. Pico negro y patas oscuras. Se le encuentra dentro del bosque, en grupos formando "leks". Su canto es típico del bosque y suena como un ascendente "chu-gui, chu-gui, FUIT FIU!!!".

24 - 26 cm





37 - 39 cm

Cuervo-Frutero de Cuello Pelado

(Gymnoderus foetidus)

Bare-necked Fruitcrow

Nombre local

Plumaje color negro. Alas color blanco grisáceo. El anillo y piel alrededor del ojo son blancos. El cuello y barbilla, desnudos, azul celeste, arrugado y doblado. Se le encuentra dentro del bosque.



EBA
23 cm

Cotinga de Cara Negra

(Conioptilon mcilhennyi)

Black-faced Cotinga

Nombre local

Plumaje general gris. La corona, lados de la cabeza y garganta son negras. Pecho y vientre blanco grisáceo. Más oscuro en las alas, espalda y cola. Se le encuentra en bordes de bosque y áreas abiertas.



13 cm

Saltarín-Tirano de Cresta Azafrán

(Neopelma chrysocephalum)

Saffron-crested Tyrant-Manakin

Nombre local

Tiene cresta color amarillo oro. La cabeza es gris, alas, espalda y cola verde oliva. La garganta y el pecho gris claro. Vientre amarillo. Iris amarillo claro. Se le encuentra dentro del bosque o donde hay matas de Bambú. Su canto suena como "rra- tahhh".

Saltarín de Cola Bandeada

(*Pipra fasciicauda*)

Band-tailed Manakin

Nombre local

La corona y nuca de color rojo brillante. Frente, lados de la cara, garganta, pecho y vientre amarillos. Pecho con tonos anaranjados. Espalda y alas color negro. Cola corta negra con banda clara. Iris blanco. La hembra tiene el dorso verde oliva opaco y el iris gris. Se le encuentra dentro del bosque.

10 - 11 cm



Saltarín de Cola Redonda

(*Ceratopipra chloromeros*)

Round-tailed Manakin

Nombre local

Plumaje general brillante. Cabeza rojo brillante con cresta ligeramente alargada. Calzones amarillos. Cola corta ligeramente graduada. Hembra color olivo apagado e iris oscuro. Se le encuentra dentro del bosque.

10,5 - 11 cm



Titira de Corona Negra

(*Tityra inquisitor*)

Black-crowned Tityra

Nombre local

Corona, cera y el borde externo de las alas color negro, con nuca, pecho, vientre y rabadilla blancos. Alas y espalda gris claro. Cola negra con banda terminal blanca. Patas gris oscuro. Se le encuentra dentro del bosque.

18 - 18,5 cm





19,5 - 21 cm

Titira de Cola Negra

(Tityra cayana)

Black-tailed Tityra

Nombre local

De color blanco, con la piel alrededor del ojo desnuda, color rosa. Corona, lados de la cara, alas y cola de color negro. La espalda con tonos grises claros. Pico rojo con punta negra. Hembras con estriás oscuras en la espalda gris y el pecho blanco. Se le encuentra dentro del bosque.



21 - 22 cm

Titira Enmascarada

(Tityra semifasciata)

Masked Tityra

Nombre local

Plumaje general blanco. Frente y lados de la cara color negro. Alas negras y cola gris con una banda negra. La piel alrededor del ojo es rojo brillante. Iris café. Pico rojo con punta negra. Hembra marrón grisáceo en dorso. Vientre más opaco y cola gris. Se le encuentra dentro del bosque.



20,5 - 21 cm

Plañidero Cinéreo

(Laniocera hypopyrra)

Cinereous Mourner

Nombre local

Plumaje general gris. Flancos castaños rufos. Alas y cola, más oscuras. Las puntas medias y externas de las alas son beige. El pecho con mechones rufos y el vientre, ambos con tonos beige. La base de la cola y banda terminal color beige. Se le encuentra dentro del bosque.

Cabezón de Ala Blanca
(*Pachyramphus polychopterus*)
White-winged Becard

14,5 - 15 cm

Nombre local

Plumaje general negro, corona negro azulado. Alas con dos bandas blancas. La cola ancha, larga y escalonada, con puntas blancas. Pico gris plateado con punta negra. Patas grises. Las hembras son pardo olivo en dorso. Alas y cola presentan marcas canela. Vientre gris. Se le encuentra dentro del bosque.



Cabezón de Garganta Rosada
(*Pachyramphus minor*)
Pink-throated Becard

17, 17,5 cm

Nombre local

Macho de plumaje gris oscuro. Con una banda de color rosado brillante en la parte baja de la garganta. Iris oscuro. Hembra con corona gris y espalda gris parduzco. Alas y cola color castaño rufo. Vientre leonado beige. Se le encuentra dentro del bosque.



Piprites de Ala Barrada
(*Piprites chloris*)
Wing-barred Piprites

13 cm

Nombre local

La corona, espalda, alas y cola color verde oliva. Alas con dos barras brillantes. La frente, cera, piel alrededor del ojo y garganta de color amarillo. Lados de la cara, cuello y pecho grises. Vientre amarillo. Cola corta con puntas blancas. Pico y patas gris azulado. Se le encuentra dentro del bosque.





15 cm

Vireón de Ceja Rufa

(Cyclarhis gujanensis)

Rufous-browed Peppershrike

Nombre local

Cabeza gris, con una ancha ceja rufa. Corona con tonos marrón. Espalda, alas y cola gris olivo. La garganta y el pecho son amarillo brillante. Vientre y calzones blanco cremoso. Iris ámbar. Pico gris y patas color carne. Se le encuentra dentro del bosque.



12,5 cm

Vireón de Gorro Apizarrado

(Vireolanius leucotis)

Slaty-capped Shrike-Vireo

Nombre local

Cabeza gris con amplia ceja superciliar y mancha debajo del ojo color amarillo brillante. La corona es más oscura. Espalda, alas y cola color verde olivo. Garganta, pecho y vientre color amarillo brillante con flancos oliváceos. Iris verde agua. Pico grueso negro grisáceo. Se le encuentra dentro del bosque.



12 -13 cm

Víreo de Ojo Rojo

(Vireo olivaceus)

Red-eyed Vireo

Nombre local

Corona gris y ceja superciliar blanquecina, con borde negro. Las mejillas, nuca, espalda, alas y cola son verde olivo. Garganta, pecho, vientre y calzones blancos. La rabadilla es crema. Iris rojo. Pico oscuro y patas azul grisáceo. Se le encuentra dentro del bosque.

Verdillo de Corona Leonada

(Tunchiornis ochraceiceps)

Tawny-crowned Greenlet

11,5 cm

Nombre local

Frente rojiza y corona leonada. Nuca, espalda, alas y cola marrón olivo. La garganta, pecho y vientre color gris amarillento, más olivo en el pecho. La rabadilla es amarilla. Iris claro. Patas color carne.



Verdillo de Gorro Oscuro

(Pachysylvia hypoxantha)

Dusky-capped Greenlet

11,5 cm

Nombre local

Frente y nuca de color pardo, más gris en la corona. La espalda, alas y cola, son verde oliva. Garganta blanca, pecho y vientre amarillos. Lados de la cara gris, con anillo ocular blanco. Iris café.



Urraca Violácea

(Cyanocorax violaceus)


Violaceous Jay

36 - 37 cm

Nombre local

Grande. Plumaje azul violáceo. La cabeza, garganta y pecho superior son negros. La nuca es clara y pálida. Las alas y la cola son oscuras. Iris café, pico y patas oscuros. Se le encuentra en bordes de bosque o río, y áreas abiertas.





14,5 cm

Golondrina de Faja Blanca

(*Atticora fasciata*)

White-banded Swallow

Nombre local

Plumaje negro azulado brillante en todo el cuerpo. Presenta una ancha banda blanca en el pecho y los calzones con algunas plumas blancas. Cola larga, muy bifurcada. Se le encuentra en bordes de río.



10,5 - 11,5 cm

Golondrina de Muslo Blanco

(*Atticora tibialis*)

White-thighed Swallow

Nombre local

Gris parduzco, con penachos blancos en calzones. Los lados de la cara y cuello, castaño oscuro. Pecho y vientre más claros, color gris. Alas y cola marrón oscuras. Cola ligeramente bifurcada. Iris, pico y patas claros. Se le encuentra en bordes de río.



13 cm

Golondrina Ala-Rasposa Sureña

(*Stelgidopteryx ruficollis*)

Southern Rough-winged Swallow

Nombre local

Cabeza y espalda color café grisáceo. La garganta es beige leonado, el pecho y flancos son café grisáceo más encendido. Vientre blanco, con tonos amarillo. La rabadilla gris clara. Alas y cola, negro parduzco. Pico y patas negros. Se le encuentra en bordes de río.

Martín de Pecho Pardo

(Progne tapera)

Brown-chested Martin

16,5 - 17 cm



Nombre local


Plumaje café, más oscuro en alas y cola. Presenta garganta gris con un salpicado de manchas negras a lo largo de la mitad del pecho y hasta la parte alta del vientre blanco. Flancos con tono grisáceo. Pico y patas negros. Se le encuentra en bordes de río

Golondrina de Ala Blanca

(Tachycineta albiventer)

White-winged Swallow

13,5 cm



Nombre local

Cabeza y espalda azul verdoso brillante. Garganta, pecho, vientre y rabadilla de color blanco. Las alas negras con amplia mancha color blanco y la cola negra levemente ahorquillada. Se le encuentra en bordes de río.

Cucarachero de Pecho Escamoso

(Microcerculus marginatus)

Scaly-breasted Wren

10,5 - 11cm



Nombre local

El plumaje es marrón castaño oscuro, con un escamado fino negruzco en la corona. Garganta y pecho blancos. Vientre y flancos con un barreteado oscuro leve. Se le encuentra dentro del bosque. Es más factible detectarlo por el canto que verlo.



18,5 - 19 cm

Cucarachero Zorzal (*Campylorhynchus turdinus*) Thrush-like Wren

Nombre local

El plumaje es marrón grisáceo, con moteado oscuro en todo el cuerpo, excepto la garganta. Línea superciliar blanca, notoria. Alas y cola más oscuras. Pecho y vientre blanco moteado. Cola larga. Pico curvo largo. Iris café. Se le encuentra en bordes de bosque o río, y áreas abiertas.



14 - 14,5 cm

Cucarachero Bigotudo (*Pheugopedius genibarbis*) Moustached Wren

Nombre local

Corona pardo grisácea y nuca gris. Lados de la cara blancos con estriado negro y línea de bigote negra y angosta. Garganta y pecho gris pálido, más beige amarillento en flancos y vientre. Espalda, alas y cola son pardo rufo. Cola barreada de negro. Se le encuentra dentro del bosque o donde hay matas de Bambú. Tiene un canto bastante musical, que suena con frases repetidas.



13 - 13,5 cm

Cucarachero Musical (*Cyphorhinus arada*) Musician Wren

Nombre local

Plumaje marrón rojizo, con la corona, lados del cuello y pecho naranja rojizo, más opaco en el vientre. Alas y cola oscuras, con franjas café en alas. Anillo superciliar, pico y patas grises. Se le encuentra dentro del bosque. Su canto es una melodía que suena como una flauta, donde las frases son muy musicales y se repiten una tras otra.

Donacobio

(*Donacobius atricapilla*)

Black-capped Donacobius

22 - 23 cm

Nombre local

Cabeza, hombros y espalda negro brillante, alas y cola marrones, con tono oliváceo en rabadilla. La garganta es beige con una mancha amarilla en el cuello. Pecho y vientre amarillo ocre barreado de negro en flancos y calzones. Cola larga con bordes blancos. Iris amarillo brillante. Patas verde oscuro. Se le encuentra en bordes de río.



Zorzal de Hauxwell

(*Turdus hauxwelli*)

Hauxwell's Thrush

22 - 23 cm

Nombre local

Plumaje marrón apagado. Pecho y vientres más claro. La garganta gris con rayas oscuras prominentes. La rabadilla y calzones grises. Cola marrón con tonos grises. El anillo alrededor del ojo y el pico son amarillos, y el iris es naranja. Se le encuentra dentro del bosque.



Zorzal de Pico Negro

(*Turdus ignobilis*)

Black-billed Thrush

21,5 - 22 cm

Nombre local

Plumaje marrón oscuro. Garganta blanca con estrias negras. Pecho marrón oliva pálido. Vientre y calzones blancos. Iris marrón y pico oscuro. Se le encuentra dentro del bosque.





20 - 21 cm

Zorzal de Cuello Blanco

(*Turdus albicollis*)
White-necked Thrush

Nombre local

Cabeza, espalda, alas y cola marrón oscuro. Garganta blanca con estrías oscuras y una media luna blanca en la parte superior del pecho. Pecho y vientre grises. Anillo ocular amarillo anaranjado y pico oscuro. Se le encuentra dentro del bosque.



27 m

Tangara Urraca

(*Cissopis leverianus*)
Magpie Tanager

Nombre local

Grande, de cabeza, pecho y espalda negro azulado. Rabadilla y vientre color blanco. Alas negras con cantidades variables de blanco. Larga cola negra con puntas blancas. Pico y patas oscuros. Iris amarillo intenso. Se le encuentra dentro del bosque.



18 cm

Tangara Pintada de Pico Rojo

(*Lamprospiza melanoleuca*)
Red-billed Pied Tanager

Nombre local

Destaca su pico rojo. Vientre y rabadilla, blancas, contrastan con cabeza, espalda y garganta negro azulado. Pecho con una mancha blanca en el centro entre dos bandas negras. Hembra con nuca, espalda y rabadilla gris. Iris y patas oscuras. Se le encuentra dentro del bosque.



Tangara de Cresta Amarilla


(*Tachyphonus rufiventer*)

Yellow-crested Tanager

Nombre local

Corona con cresta amarilla naranja. Cabeza, espalda, alas y cola, negro azulado. Garganta amarilla con una banda negra, delgada que se extiende a los flancos. Pecho rufo brillante, vientre y rabadilla amarillo ocráceo. Pequeña mancha blanca en hombros. Hembra opaca, verde olivácea, cabeza gris y garganta beige. Se le encuentra dentro del bosque.

15 - 16 cm



Tangara de Hombro Blanco


(*Tachyphonus luctuosus*)

White-shouldered Tanager

Nombre local

Plumaje general negro azabache, con los hombros de color blanco. Hembras con cabeza gris, garganta blanca. Espalda y cola verde oliva y vientre amarillo brillante, oliváceo en flancos. Se le encuentra dentro del bosque.

13,5 - 14 cm



Tangara de Ala Blanca

(*Lanio versicolor*)

White-winged Shrike-Tanager

Nombre local

Plumaje del cuerpo amarillo ocre, más claro en vientre y rabadilla. La cabeza, alas y cola son de color negro. Corona y garganta, con tonos oliváceos. Alas con mancha grande blanca. La hembra es apagada, color marrón con vientre amarillento. Se le encuentra dentro del bosque.

16 - 17 cm





18 - 19 cm

Tangara Carmesí Enmascarada

(*Ramphocelus nigrogularis*)

Masked Crimson Tanager

Nombre local

Cabeza, nuca, pecho y flancos rojo brillante. Rostro y barbilla negros, al igual que el vientre, alas y la cola. Pico gris. La hembra con el plumaje apagado y el vientre marrón. Se le encuentra dentro del bosque.



18 cm

Tangara de Pico Plateado

(*Ramphocelus carbo*)

Silver-beaked Tanager

Nombre local

El plumaje general es negro aterciopelado. Garganta y pecho rojo carmesí más brillante cerca del pico. Pico gris plateado. Hembra más apagada, marrón rojiza. Se le encuentra en bordes de bosque o río, y áreas abiertas.



16 - 18 cm

Tangara Azuleja

(*Thraupis episcopus*)

Blue-gray Tanager

Nombre local

Cabeza, más clara, y la espalda son de color celeste grisáceo con la rabadilla y la cola azul brillante. La garganta, pecho y vientre de color gris pálido con tonos azulado en los flancos. Alas azul celeste brillante. Se le encuentra en bordes de bosque y áreas abiertas.

Tangara de Palmeras

(*Thraupis palmarum*)

Palm Tanager

Nombre local

De plumaje apagado gris oliváceo. Con la cara y frente verde oliva. Cera y piel alrededor del ojo más opaca. Alas claras con la mitad de color marrón oscuro, formando un triángulo. Cola oscura. Hembra más pálida. Se le encuentra en bordes de bosque y áreas abiertas.

17 - 19 cm



Tangara de Vientre Amarillo


(*Tangara xanthogastra*)

Yellow-bellied Tanager

Nombre local

Plumaje verdoso, con cabeza, pecho y flancos verde claro, punteado de negro. Espalda, alas y cola, con tonos azulados. Alas con ligero barrado negro. Vientre y calzones, amarillo brillante. Anillo ocular verde brillante, cera e iris negros. Pico delgado. Se le encuentra dentro del bosque.

12 cm



Tangara Turquesa

(*Tangara mexicana*)

Turquoise Tanager

Nombre local

Frente, corona, lados del cuello y flancos color turquesa. Nuca, espalda, rabadilla, alas y cola negras. Vientre amarillo claro. Mancha amarilla por encima de los hombros. Se le encuentra dentro del bosque.

13,5 cm





14 cm

Tangara del Paraíso

(*Tangara chilensis*)

Paradise Tanager

Nombre local

Muy colorida. La frente, corona y lados de la cabeza son de color verde brillante. El anillo alrededor del ojo y la cera, negras. La nuca, espalda y cola son negras. Garganta violeta, pecho, vientre y flancos, turquesa. La rabadilla es roja. Pico negro y patas grises. Se le encuentra dentro del bosque.



14,5 cm

Tangara de Corona Opalina

(*Tangara callophrys*)

Opal-crowned Tanager

Nombre local

La cara, cuello, pecho y cola son de color azul turquesa con la corona castaña, muy evidente con la exposición al sol. Nuca, espalda y alas son negras. Rabadilla amarilla y el vientre inferior es castaño. Se le encuentra en el bosque dentro del dosel.



13,5 cm

Tangara de Cabeza Baya

(*Tangara girola*)

Bay-headed Tanager

Nombre local

Cabeza rojo castaño, con un estrecho collar en la nuca de color amarillo. Espalda, alas y cola, verde brillante con rabadilla azul. Pecho y vientre color turquesa. Hombros con mancha amarilla en la curva del ala. Patas grises. Se le encuentra dentro del bosque.

Dacnis de Cara Negra

(*Dacnis lineata*)

Black-faced Dacnis

11 - 11,5 cm

Nombre local

Plumaje turquesa brillante. Con una máscara negra que continúa hacia la nuca y espalda. Las alas y la cola son negras con la mitad superior del ala doblada color turquesa. Vientre y calzones blancos. Iris amarillo brillante. Hembra más apagada, verde oliva, con iris pálido. Se le encuentra dentro del bosque.



Mielerero Verde

(*Chlorophanes spiza*)

Green Honeycreeper

14 cm

Nombre local

Plumaje verde azulado brillante, más verde en la cabeza y nuca. Con una amplia máscara negra, que incluye corona y mejillas. Bordes de las alas y la cola más azulados y oscuros. Vientre azulado. Pico delgado, amarillo. Iris rojo ladrillo. Patas grises. Hembra verde opaco, pecho y vientre amarillos. Se le encuentra dentro del bosque.



Tangara Guira

(*Hemithraupis guira*)

Guira Tanager

13 cm

Nombre local

Lados de la cabeza y garganta negros, con ceja superciliar y mancha en auriculares amarillos. La corona, espalda y alas, verde amarillento uniforme. Pecho y rabadilla naranja rufo. Flancos y vientre, grises, con el centro amarillo, igual que la cola. Hembra verde oliva con flancos grises y vientre amarillo. Se le encuentra dentro del bosque.





A
11 cm

Espiguero Doble Acollarado

(*Sporophila caerulescens*)

Double-collared Seedeater

Nombre local

Plumaje gris, más oscuro en la frente. Espalda, rabadilla y cola, marrón oliváceo. Alas con tono oliváceo. Con banda pectoral negra y vientre blanco, flancos grises. Una línea malar y una mancha debajo del ojo, blancas. Barbilla negra y cuello blanco. Hembra apagada, parda gris, garganta y pecho beige. Pico amarillo, grueso. Se le encuentra en bordes de río.



20,5 - 21 cm

Saltador de Garganta Anteada

(*Saltator maximus*)

Buff-throated Saltator

Nombre local

Lados de la cara, gris oscura. Con línea superciliar estrecha blanca, línea ocular y mancha malar negras. Corona, nuca, espalda, alas y cola, verde oliva. Barbilla blanca y centro de la garganta beige. El vientre gris se torna leonado hacia la base de la cola. Pico grueso y patas negras. Se le encuentra dentro del bosque.



21 cm

Saltador Grisáceo

(*Saltator coerulescens*)

Grayish Saltator

Nombre local

El plumaje uniforme es gris oscuro. Línea superciliar blanca. La garganta es blanca con líneas malaras negras. Pecho, más claro con tonos beige hacia el vientre y los flancos. Vientre y base de la cola canela pálido. Alas y cola oscuras. Se le encuentra dentro del bosque.

Picogruoso de Pico Rojo

(*Saltator grossus*)

Slate-colored Grosbeak

Nombre local

Plumaje gris azulado oscuro, más pálido en el vientre. Garganta blanca. La cara, los lados del cuello y el pecho son negros. Pico robusto, rojo. Patas oscuras. Se le encuentra dentro del bosque. Se le encuentra en bordes de bosque o río, y áreas abiertas.




Gorrión de Ceja Amarilla

(*Ammodramus aurifrons*)

Yellow-browed Sparrow

Nombre local

Es gris parduzco, con estrías oscuras en la corona, nuca y espalda. Garganta clara, con el pecho y abdomen gris blanquecino. La cera, ceja superciliar y parte de la cara color amarillo y una banda ocular oscura que se disipa hacia la nuca. Alas con mancha amarilla. Se le encuentra en bordes de bosque o río, y áreas abiertas.




Gorrión Pectoral

(*Arremon taciturnus*)

Pectoral Sparrow

Nombre local

Cabeza negra con delgada franja gris en la corona. Línea superciliar y garganta blancas. Con una banda negra (collar) en el pecho superior. Pecho y vientre blancos. Espalda, alas y cola, verde olivo. Nuca y flancos grises. Hembra con pecho y vientre beige, sin banda pectoral. Se le encuentra dentro del bosque.





17 - 17,5 cm

Tangara-Hormiguera de Corona Roja

(*Habia rubica*)

Red-crowned Ant-Tanager

Nombre local

Plumaje rojo parduzco. La corona con una línea roja brillante, bordeada de negro. Garganta y pecho, rojo brillante, más opaco en el vientre. Flancos con tonos grises. Alas y cola, oscuras, con tonos rojizos. Hembra café oliva, amarillenta en pecho y vientre. Garganta clara y corona amarilla. Se le encuentra dentro del bosque.



16 cm

Picogrueso Negro Azulado

(*Cyanocompsa cyanoides*)

Blue-black Grosbeak

Nombre local

Plumaje negro azulado, más oscuro en las alas y cola. La frente, cejas y mejillas, más claras y brillantes. Hembra café intenso, más pálida en el vientre. Se le encuentra dentro del bosque.



13,5 cm

Reinita de Lomo Anteado

(*Myiothlypis fulvicauda*)

Buff-rumped Warbler

Nombre local

Cabeza con corona gris. Lados de la cara, canela beige, con línea ocular oscura. La garganta, pecho y vientre, blancos. Flancos, rabadilla y base de la cola, marrón anteado claro. La nuca y espalda son pardo olivo. Las alas y cola terminal oscuras.

Oropéndola de Dorso Bermejo


(Psarocolius angustifrons)

Russet-backed Oropendola

Nombre local

Plumaje pardo oliváceo, más claro en rostro y garganta. La frente y laterales de la cola son amarillo brillante. Espalda, pecho y vientre color marrón castaño. Alas y centro de la cola, oscuras. Rabadilla rufa. Pico grande claro. Se le encuentra en bordes de bosque o río, y áreas abiertas, formando colonias de nidos colgantes. El canto es un burbujeante y agudo sonido, que hacen cuando posados en una rama, bajan la cabeza y levantan la cola.

44 - 48 cm



Oropéndola Crestada

(Psarocolius decumanus)

Crested Oropendola

Nombre local

Plumaje negro brillante, con cresta negra, delgada y larga, poco visible. La rabadilla es rufa y la cola es amarilla con parte central oscura. Iris azul claro y pico blanco, contrastantes. Hembras, más apagadas, sin cresta. Se le encuentra dentro del bosque.

46 - 47,5 cm



Oropéndola Olivácea

(Psarocolius bifasciatus)

Olive Oropendola

Nombre local

Cabeza, nuca, cuello, hombros, espalda superior y pecho son oliváceos. Espalda inferior, alas, rabadilla, vientre y calzones castaño oscuro rojizo. La cola es amarilla con parte central oscura. La cara desnuda color rosado. Iris marrón. Pico negro con punta anaranjada. Se le encuentra dentro del bosque.

47,5 - 52cm





27 cm

Cacique Solitario

(*Cacicus solitarius*)

Solitary Black Cacique

Nombre local

Único cacique con iris oscuro. El plumaje general es negro brillante. Pico blanco y largo. Cuerpo alargado, cola larga. Hembra más pequeña. Patas negras e iris marrón. Se le encuentra en bordes de bosque o río, y áreas abiertas.



27 - 29 cm

Cacique de Lomo Amarillo

(*Cacicus cela*)

Yellow-rumped Cacique

Nombre local

El plumaje es color negro brillante. La espalda inferior, parte de las alas, rabadilla y cola son amarillo brillante. Pico blanco. Hembra más pequeña. Iris azul celeste. Sus nidos tienen forma de canasta y anidan en colonias en arboles en ligares abiertos. Se le encuentra en bordes de bosque o río, y áreas abiertas.



23 - 23,5 cm

Turpial de Dorso Naranja

(*Icterus croconotus*)

Orange-backed Troupial

Nombre local

El plumaje es naranja brillante, mas encendido en la cabeza y pecho. Lados de la cara, garganta, alas y cola negras. Alas con una mancha blanca. La piel alrededor del ojo es gris. Iris amarillo y patas grises. Se le encuentra en bordes de río.

Tordo Gigante

(*Molothrus oryzivorus*)

Giant Cowbird

34 - 35,5 cm



Nombre local

Plumaje negro purpúreo brillante, con un collarin grande en el cuello. Alas y la cola son oscuras. Iris rojo. Hembra, más pequeña y pálida, sin collar. Pico y patas negros. Se le ve en grupos volando sobre el bosque o en la orilla de los ríos y quebradas, posado en la arena de las playas.

Eufonia de Pico Gueso

(*Euphonia laniirostris*)

Thick-billed Euphonia

11 - 11,5 cm



Nombre local

Corona, pecho y vientre son amarillo brillante. Lados de la cabeza, nuca, espalda, alas y cola, de color azul negruzco brillante. Alas y cola oscuras, con el lado interno color blanco. Pico gris, corto y grueso. Hembra verde oliva, con vientre amarillento. Se le encuentra dentro del bosque.

Eufonia de Vientre Dorado

(*Euphonia chrysopasta*)


Golden-bellied Euphonia

11 cm



Nombre local

El plumaje general es verde oliváceo. Con la cera y la barbilla blancas. La nuca es gris. Vientre amarillo brillante. Hembra con garganta, nuca y vientre grises. Cola corta. Pico gris oscuro. Se le encuentra dentro del bosque.



11 - 11,5 cm

Eufonia de Vientre Rufo

(*Euphonia rufiventris*)

Rufous-bellied Euphonia

Nombre local

Cabeza, garganta, espalda y pecho superior color azul negruzco brillante. Pecho inferior, rabadilla y vientre, naranja rufo. Alas y cola oscuras. Hembra verde olivácea. Mejillas, nuca y vientre gris. Rabadilla rufa. Se le encuentra dentro del bosque.

Glosario de términos

Ahorquillado: Término usado para referirse a la cola de un ave, cuyas plumas exteriores (de los extremos o lados) es más largo que las centrales.

Anillo ocular: Circulo de piel desprovista de plumas que rodea el ojo en algunas aves.

Antifaz: Comprende la parte delantera y trasera del ojo de un ave. Es generalmente de color oscuro, a manera de mascara que cubre los ojos.

Ante, anteado: Similitud con color beige.

Apagado: Referido a tonos opacos.

Auricular: Relacionado a la zona del oído.

Banda: Línea horizontal de ancho considerable. Similar a las barras (ver abajo), pero más gruesas y normalmente solo hay una o dos sobre el pecho o la cola.

Banda terminal / sub-terminal: Es una banda situada al final de la cola y es de color diferente. Cuando es sub-terminal, existe una delgada banda al final de la cola del mismo color que esta.

Barras: Similares a las bandas pero de menor grosor, más numerosas y normalmente están formadas por dos colores intercalados.

Barreado(a): Formado por barras.

Bifurcada: Forma ahorquillada (horquilla)

Calzones: Se refiere a las plumas que cubren las piernas, también llamadas plumas tibiales.

Cera: Es la parte desprovista de plumas que está entre el pico y los ojos.

Coberteras Alares: Plumas pequeñas que recubren la parte exterior de las alas.

Conspicuo: Notorio, que es fácil de notar, detectar u observar.

Contrastante: Diferencia relativa en la intensidad entre un punto de una imagen

Corona: Parte superior de la cabeza.

Disco facial: Es un conjunto de plumas dispuestas en forma de círculo alrededor de la cara de un ave (mayormente búhos o lechuzas). Es de consistencia más rígida que el resto de plumas de la cabeza. Tienen por función re-dirigir el sonido hacia los oídos para ubicar mejor el lugar de su procedencia.

Estrías, estriado: Formado por muchas estrías o pintas (ver definición de pintas).

Iridiscencias: Fenómeno óptico por lo cual una superficie brilla y produce destellos.

Iris: El ojo está formado por un círculo interno y un aro externo. El círculo interno generalmente es negro y se llama pupila; y el aro externo se llama iris y puede tomar diferentes colores según la especie y edad (blanco, amarillo, rojo, etc.).

Leonado: De color rubio oscuro, similar a los leones.

Línea malar: Línea que nace de la base del pico y se extiende hacia la nuca.

Línea superciliar: Es una especie de "ceja" que sale por encima del ojo hacia la nuca.

Moteado: Formado por "motas" o manchas redondeadas.

Mandíbula: El pico está formado por dos partes, una superior y una inferior. La parte inferior se llama mandíbula.

Maxila: Es la parte superior del pico.

Parte dorsal: Correspondiente a la parte superior del cuerpo (nuca, espalda, rabadilla)

Parte ventral: Correspondiente a la parte inferior del cuerpo (garganta, pecho, vientre)

Penacho: Agrupación de plumas que presentan algunas especies de aves en la parte superior de la cabeza. Cresta, copete.

Piel desnuda alrededor del ojo (periocular): Es la piel desprovista de plumas que rodea el ojo.

Pintas: Son manchas de forma vertical al estilo de pinceladas, que pueden ser de diversos colores en un ave y estar en el pecho, espalda, cabeza, etc.

Plumaje Críptico: Que se camufla en su entorno mediante su color, su olor o su aspecto.

Plumaje nupcial: Es el plumaje que usan algunas especies en la época reproductiva, el cual es mucho más vistoso que el plumaje básico.

Rabadilla: Es la espalda baja. Son las plumas que cubren la base de la cola.

Región anal: Es el vientre bajo. Se refiere a las plumas que se encuentran alrededor del ano o cloaca, justo entre los calzones y la base de la cola.

Rufo: Color que es similar al óxido de hierro o al ladrillo.

Tarso: Se refiere a la parte inferior de la pata, de donde nacen los dedos.

Vermiculada: Que presenta estrías.

Bibliografía

- Angulo, F. (2015). Diversidad de aves de la Concesión de Conservación Río La Novia, Alto Purús, Ucayali: Reporte de campo. Informe presentado a WWF – Perú. Agosto de 2015
- BirdLife International. (2015). IUCN Red List for birds. <http://www.birdlife.org/datazone/species/> Accedido el 19/08/15
- Boesman, P. 2009. Birds of Peru MP3 sound collection. Birdsounds.nl.
- Coopmans, P, Moore, J. V., Krabbe, N., Jahn, O., Berg, K. S., Lysinger, M., Navarrete, L. & R. S. Ridgely. 2004. The birds of southwest Ecuador. [5 Audio CDs with booklet]. San, José, California, U.S.A.: John V. Moore Nature Recordings.
- Cornejo, F. (2015). Inventario florístico en la Concesión de Conservación "Río La Novia". INFORME FINAL.
- El Peruano. (2014). Decreto Supremo N° 004-2014-MINAGRI. Categorización de Especies Amenazadas de Fauna Silvestre.
- Harvey, M. G., D. F. Lane, J. Hite, R. S. Terrill, S. Figueroa, B. Tilston Smith, J. Klicka & W. Vargas Campos (2014) Notes on bird species in bamboo in northern Madre de Dios, Peru including the first Peruvian record of Acre Tody-Tyrant (*Hemitriccus cohnhafit*). Occasional Papers of the Museum of Natural Science, Louisiana State University, N°. 81: 1-38.
- Kratter, A. W. (1997). Bamboo specialization by Amazonian birds. *Biotropica* 29:100-110.
- Lebbin, D. J. (2007). Habitat specialization among Amazonian birds: why are there so many Guadua bamboo specialists? Doctor of Philosophy Dissertation, Cornell University, Ithaca, New York, pp. i-xvi, 1-266.
- Plenge, M. A. (2015). Lista de las Aves de Perú, [Versión 19/02/2015]. Lima, Perú. Disponible en: <https://sites.google.com/site/boletinunop/checklist>. Accedido el 24/06/15
- ProPurús (2012). Nueva concesión de conservación aprobada en el Alto Purús. Disponible en: <http://www.propurus.org/?p=1387>. Accedido el 10/10/15
- ProPurús (2013). Protección y Conservación del Parque Nacional Alto Purús y de la Reserva Comunal Purús: Manual para Guardaparques. ProPurús. 119 p.
- Raposo do Amaral, F., Sheldon, F. H., Gamauf, A., Haring, E., Riesing, M., Silveira, L. F. & A. Wajntal. (2009). Patterns and processes of diversification in a widespread and ecologically diverse avian group, the buteonine hawks (Aves, Accipitridae). *Molecular Phylogenetics and Evolution* 53: 703-715.
- Remsen, J. V., Jr., J. I. Areta, C. D. Cadena, A. Jaramillo, M. Nores, J. F. Pacheco, J. Perez-Eman, M. B. Robbins, F. G. Stiles, D. F. Stotz, and K. J. Zimmer. (2015) Version [29 September 2015]. A classification of the bird species of South America. American Ornithologists' Union. <http://www.museum.lsu.edu/~Remsen/SACCBaseline.html>
- Rubio Torgler, H, Mena Álvarez, J.L. & C. Germaná. (2014). Latidos de la selva: corredor de conservación Purús-Manu. Consorcio Purús-Manu: WWF, CARE Perú, ProNaturaleza, ProPurús, Sociedad Zoológica de Fráncfort, ORAU. Lima, noviembre del 2014.
- SERNANP (2012). Diagnóstico del proceso de actualización: Reserva Comunal Purús. Plan Maestro 2012-2017. Ministerio del Ambiente.

SERNANP (2015). Reserva Comunal Purus. <http://www.sernanp.gob.pe/sernanp/zonaturismo/jsp?ID=58>. Accedido el 10/10/15

Schulenberg, T. S., Marantz, C. A. & P.H. English. (2000a). Voices of Amazonian birds. Birds of the rainforest of southern Peru and northern Bolivia, vol. 1: Tinamous (Tinamidae) through barbets (Capitonidae) (CD). Ithaca, NY: Cornell Laboratory of Ornithology.

Schulenberg, T. S., Marantz, C. A. & P.H. English. (2000b). Voices of Amazonian birds. Birds of the rainforest of southern Peru and northern Bolivia, vol. 2: Toucans (Ramphastidae) through antbirds (Thamnophilidae) (CD). Ithaca, NY: Cornell Laboratory of Ornithology.

Schulenberg, T. S., Marantz, C. A. & P.H. English. (2000c). Voices of Amazonian birds. Birds of the rainforest of southern Peru and northern Bolivia, vol. 3: Ground antbirds (Formicariidae) through jays (Corvidae) (CD). Ithaca, NY: Cornell Laboratory of Ornithology.

Stattersfield A. J., M. J. Crosby, A. J. Long & D. Wege. (1998). Endemic birds areas of the world. Priorities for biodiversity conservation. BirdLife International. Cambridge, U.K. Conservation Series 7.

UICN (2012). Categorías y Criterios de la Lista Roja de la UICN: Versión 3.1. http://www.iucnredlist.org/documents/redlist_cats_crit_sp.pdf

Lista de Aves del río La Novia

NOMBRE EN CASTELLANO	NOMBRE CIENTIFICO	NOMBRE EN INGLES
	Orden TINAMIFORMES	
	Familia TINAMIDAE	
Perdiz Gris	<i>Tinamus tao</i>	Gray Tinamou
Perdiz Grande	<i>Tinamus major</i>	Great Tinamou
Perdiz Cinérea	<i>Crypturellus cinereus</i>	Cinereous Tinamou
Perdiz Chica	<i>Crypturellus soui</i>	Little Tinamou
Perdiz Parda	<i>Crypturellus obsoletus</i>	Brown Tinamou
Perdiz Ondulada	<i>Crypturellus undulatus</i>	Undulated Tinamou
Perdiz de Gorro Negro	<i>Crypturellus atropicillus</i>	Black-capped Tinamou
Perdiz Abigarrada	<i>Crypturellus variegatus</i>	Variegated Tinamou
Perdiz de Bartlett	<i>Crypturellus bartletti</i>	Bartlett's Tinamou
	Orden ANSERIFORMES	
	Familia ANHIMIDAE	
Gritador Unicornio (Camungo)	<i>Anhima cornuta</i>	Horned Screamer
	Orden GALLIFORMES	
	Familia CRACIDAE	
Pava de Spix	<i>Penelope jacquacu</i>	Spix's Guan
Pava de Garganta Azul	<i>Pipile cumanensis</i>	Blue-throated Piping-Guan
Chachalaca Jaspeada	<i>Ortalis guttata</i>	Speckled Chachalaca
Paujil Común	<i>Mitu tuberosum</i>	Razor-billed Curassow
	Familia ODONTOPHORIDAE	
Codorniz Estrellada	<i>Odontophorus stellatus</i>	Starred Wood-Quail
	Orden PELECANIFORMES	
	Familia ARDEIDAE	
Garza-Tigre Colorada	<i>Tigrisoma lineatum</i>	Rufescent Tiger-Heron
Garza de Pecho Castaño	<i>Agamia agami</i>	Agami Heron
Huaco Común	<i>Nycticorax nycticorax</i>	Black-crowned Night-Heron
Garza Cuca	<i>Ardea cocoi</i>	Cocoi Heron
Garza Grande	<i>Ardea alba</i>	Great Egret

Amenaza IUCN	Amenaza PERU	Endemismo	Migratoria	Bambu	Atributo especial	Abundancia	Habitat	Evidencia
VU						C	B	G
						C	B	O
						A	B	G
						C	B	G
						R	B	O
						A	R	G
				X		A	BP	G
						R	B	G
						R	B	O
						R	R	O
						R	B	G
						R	B	F
					X	C	B	G
						R	BR	F
						C	B	G
VU						C	R	G
						R	R	O
						R	R	O
						R	R	O
						R	R	O

NOMBRE EN CASTELLANO	NOMBRE CIENTIFICO	NOMBRE EN INGLES
Garza Pileada	<i>Pilherodius pileatus</i>	Capped Heron
Garcita Blanca	<i>Egretta thula</i>	Snowy Egret
	Familia THRESKIORNITHIDAE	
Ibis Verde	<i>Mesembrinibis cayennensis</i>	Green Ibis
	Orden CATHARTIFORMES	
	Familia CATHARTIDAE	
Gallinazo de Cabeza Roja	<i>Cathartes aura</i>	Turkey Vulture
Gallinazo de Cabeza Amarilla Mayor	<i>Cathartes melambrotus</i>	Greater Yellow-headed Vulture
Gallinazo de Cabeza Negra	<i>Coragyps atratus</i>	Black Vulture
Gallinazo Rey	<i>Sarcoramphus papa</i>	King Vulture
	Orden ACCIPITRIFORMES	
	Familia ACCIPITRIDAE	
Elanio Tijereta	<i>Elanoides forficatus</i>	Swallow-tailed Kite
Aguila Harpía	<i>Harpia harpyja</i>	Harpy Eagle
Aguila Negra	<i>Spizaetus tyrannus</i>	Black Hawk-Eagle
Aguila Penachuda	<i>Spizaetus ornatus</i>	Ornate Hawk-Eagle
Elanio Bidentado	<i>Harpagus bidentatus</i>	Double-toothed Kite
Elanio Plomizo	<i>Ictinia plumbea</i>	Plumbeous Kite
Gavilán Bicolor	<i>Accipiter bicolor</i>	Bicolored Hawk
Gavilán Zancón	<i>Geranospiza caerulescens</i>	Crane Hawk
Gavilán Pizarroso	<i>Buteogallus schistaceus</i>	Slate-colored Hawk
Gavilán Negro	<i>Buteogallus urubitinga</i>	Great Black Hawk
Aguilucho Caminero	<i>Rupornis magnirostris</i>	Roadside Hawk
Gavilán Blanco	<i>Pseudastur albicollis</i>	White Hawk
	Orden GRUIFORMES	
	Familia PSOPHIIDAE	
Trompetero de Ala Blanca	<i>Psophia leucoptera</i>	Pale-winged Trumpeter
	Familia RALLIDAE	
Rascón-Montés de Cuello Gris	<i>Aramides cajaneus</i>	Gray-necked Wood-Rail
Gallineta Unicolor	<i>Amaurolimnas concolor</i>	Uniform Crake
	Familia HELIORNITHIDAE	

Amenaza IUCN	Amenaza PERU	Endemismo	Migratoria	Bambu	Atributo especial	Abundancia	Habitat	Evidencia
						R	R	F
						R	R	O
						R	R	F
						R	G	O
						C	G	F
						A	G	O
						C	G	F
VU					X	R	G	O
						R	R	F
						C	G	F
						C	G	F
						C	G	F
						R	G	O
						R	R	O
						R	G	O
						C	R	F
						R	R	F
						C	A	F
						R	G	F
						R	B	G
						R	R	O
						R	B	O

NOMBRE EN CASTELLANO	NOMBRE CIENTIFICO	NOMBRE EN INGLES
Ave de Sol Americana	Familia HELIORNITHIDAE <i>Heliornis fulca</i>	Sungrebe
Tigana	Orden EURYPYGIFORMES Familia EURYPYGIDAE <i>Eurypyga helias</i>	Sunbittern
Chorlo Acollarado	Orden CHARADRIIFORMES Familia CHARADRIIDAE <i>Charadrius collaris</i>	Collared Plover
Playero Solitario	Familia SCOLOPACIDAE <i>Tringa solitaria</i>	Solitary Sandpiper
Gallito de Agua de Frente Roja	Familia JACANIDAE <i>Jacana jacana</i>	Wattled Jacana
Gaviotín de Pico Amarillo	Familia LARIDAE <i>Sternula superciliaris</i>	Yellow-billed Tern
Paloma Plomiza	Orden COLUMBIFORMES Familia COLUMBIDAE <i>Patagioenas plumbea</i>	Plumbeous Pigeon
Paloma Rojiza	<i>Patagioenas subvinacea</i>	Ruddy Pigeon
Paloma-Perdiz Rojiza	<i>Geotrygon montana</i>	Ruddy Quail-Dove
Paloma de Frente Gris	<i>Leptotila rufaxilla</i>	Gray-fronted Dove
Hoazín	Orden OPISTHOCOMIFORMES Familia OPISTHOCOMIDAE <i>Opisthocomus hoazin</i>	Hoatzin
Cuco Ardilla	Orden CUCULIFORMES Familia CUCULIDAE <i>Piaya cayana</i>	Squirrel Cuckoo
Garrapatero de Pico Liso	<i>Crotophaga ani</i>	Smooth-billed Ani
Cuco Faisán	<i>Dromococcyx phasianellus</i>	Pheasant Cuckoo
Cuco Pavonino	<i>Dromococcyx pavoninus</i>	Pavonine Cuckoo
	Orden STRIGIFORMES Familia STRIGIDAE	

Amenaza IUCN	Amenaza PERU	Endemismo	Migratoria	Bambu	Atributo especial	Abundancia	Habitat	Evidencia
						R	R	O
						R	R	F
						R	R	F
			B			R	R	F
						R	R	O
						R	R	O
VU						R	B	O
						C	B	G
						R	B	O
						C	B	G
						R	R	F
						A	AB	G
						R	A	O
						R	B	O
				X		R	BP	O

NOMBRE EN CASTELLANO	NOMBRE CIENTIFICO	NOMBRE EN INGLES
Lechuza de Vientre Leonado	<i>Megascops watsonii</i>	Tawny-bellied Screech-Owl
Búho Penachudo	<i>Lophotrix cristata</i>	Crested Owl
Búho de Anteojos	<i>Pulsatrix perspicillata</i>	Spectacled Owl
Búho Café	<i>Ciccaba virgata</i>	Mottled Owl
Lechucita Amazónica	<i>Glaucidium hardyi</i>	Amazonian Pygmy-Owl
Lechucita Ferruginosa	<i>Glaucidium brasilianum</i>	Ferruginous Pygmy-Owl
Búho Listado	<i>Pseudoscops clamator</i>	Striped Owl
	Orden CAPRIMULGIFORMES	
	Familia NYCTIBIIDAE	
Nictibio Grande	<i>Nyctibius grandis</i>	Great Potoo
Nictibio de Cola Larga	<i>Nyctibius aethereus</i>	Long-tailed Potoo
Nictibio Común	<i>Nyctibius griseus</i>	Common Potoo
	Familia CAPRIMULGIDAE	
Chotacabras Común	<i>Nyctidromus albicollis</i>	Common Pauraque
Chotacabras Ocelado	<i>Nyctiphrynus ocellatus</i>	Ocellated Poorwill
Chotacabras Cola de Seda	<i>Antrostomus sericocaudatus</i>	Silky-tailed Nightjar
	Orden APODIFORMES	
	Familia APODIDAE	
Vencejo de Lomo Gris	<i>Chaetura cinereiventris</i>	Gray-rumped Swift
Vencejo de Lomo Pálido	<i>Chaetura egregia</i>	Pale-rumped Swift
Vencejo de Cola Corta	<i>Chaetura brachyura</i>	Short-tailed Swift
Vencejo Tijereta de Palmeras	<i>Tachornis squamata</i>	Fork-tailed Palm-Swift
	Familia TROCHILIDAE	
Colibrí de Nuca Blanca	<i>Florisuga mellivora</i>	White-necked Jacobin
Ermitaño de Pecho Canela	<i>Glaucis hirsutus</i>	Rufous-breasted Hermit
Ermitaño de Cola Pálida	<i>Threnetes leucurus</i>	Pale-tailed Barbthroat
Ermitaño Rojizo	<i>Phaethornis ruber</i>	Reddish Hermit
Ermitaño de Barba Blanca	<i>Phaethornis hispidus</i>	White-bearded Hermit
Ermitaño de Pico Grande	<i>Phaethornis malaris</i>	Great-billed Hermit
Esmeralda de Cola Azul	<i>Chlorostilbon mellisugus</i>	Blue-tailed Emerald
Ala-de-Sable de Pecho Gris	<i>Campylopterus largipennis</i>	Gray-breasted Sabrewing

Amenaza IUCN	Amenaza PERU	Endemismo	Migratoria	Bambu	Atributo especial	Abundancia	Habitat	Evidencia
						C	B	G
						R	B	F
						C	B	G
						R	B	O
						C	B	G
						C	AB	G
						R	B	F
						R	B	O
						R	B	O
						C	R	G
						C	AR	FG
						C	B	G
						R	B	G
						C	G	O
						C	G	O
						C	G	O
						R	G	O
						R	B	O
						R	A	O
						C	B	C
						C	B	F
						C	B	C
						R	B	C
						R	A	O
						C	B	O

NOMBRE EN CASTELLANO	NOMBRE CIENTIFICO	NOMBRE EN INGLES
Ninfa de Cola Ahorquillada	<i>Thalurania furcata</i>	Fork-tailed Woodnymph
Colibrí de Pecho Zafiro	<i>Amazilia lactea</i>	Sapphire-spangled Emerald
	Orden TROGONIFORMES	
	Familia TROGONIDAE	
Trogón de Cola Negra	<i>Trogon melanurus</i>	Black-tailed Trogon
Trogón Amazónico	<i>Trogon ramonianus</i>	Amazonian Trogon
Trogón de Corona Azul	<i>Trogon curucui</i>	Blue-crowned Trogon
Trogón Acollarado	<i>Trogon collaris</i>	Collared Trogon
	Orden CORACIIFORMES	
	Familia ALCEDINIDAE	
Martín Pescador Grande	<i>Megaceryle torquata</i>	Ringed Kingfisher
Martín Pescador Amazónico	<i>Chloroceryle amazona</i>	Amazon Kingfisher
Martín Pescador Verde	<i>Chloroceryle americana</i>	Green Kingfisher
	Familia MOMOTIDAE	
Relojero de Pico Ancho	<i>Electron platyrhynchum</i>	Broad-billed Motmot
Relojero Rufo	<i>Baryphthengus martii</i>	Rufous Motmot
Relojero Amazónico	<i>Momotus momota</i>	Amazonian Motmot
	Orden GALBULIFORMES	
	Familia GALBULIDAE	
Jacamar del Purús	<i>Galbalcyrrhynchus purusianus</i>	Purus Jacamar
Jacamar de Garganta Blanca	<i>Brachygalba albogularis</i>	White-throated Jacamar
Jacamar de Frente Azulada	<i>Galbula cyanescens</i>	Bluish-fronted Jacamar
	Familia BUCCONIDAE	
Buco de Gorro Castaño	<i>Bucco macrodactylus</i>	Chestnut-capped Puffbird
Buco Acollarado	<i>Bucco capensis</i>	Collared Puffbird
Buco Estriolado	<i>Nystalus striolatus</i>	Striolated Puffbird
Buco Semiacollarado	<i>Malacoptila semicincta</i>	Semicollared Puffbird
Monjita de Barbilla Leonada	<i>Nonnula sclateri</i>	Fulvous-chinned Nunlet
Monja de Frente Negra	<i>Monasa nigrifrons</i>	Black-fronted Nunbird
Monja de Frente Blanca	<i>Monasa morphoeus</i>	White-fronted Nunbird
Buco Golondrina	<i>Chelidoptera tenebrosa</i>	Swallow-wing

Amenaza IUCN	Amenaza PERU	Endemismo	Migratoria	Bambu	Atributo especial	Abundancia	Habitat	Evidencia
						R	B	O
						R	B	O
						C	B	FG
						R	B	G
						C	B	FG
						R	B	FG
						C	R	F
						C	R	F
						C	R	F
						C	B	G
						R	B	F
						C	B	CG
					X	R	R	F
						R	R	F
						C	AB	FG
				X		R	BP	O
						R	B	F
						R	B	G
		X				R	B	C
						R	B	CF
						C	AB	G
						R	B	F
						C	AR	F

NOMBRE EN CASTELLANO	NOMBRE CIENTIFICO	NOMBRE EN INGLES
	Orden PICIFORMES	
	Familia CAPITONIDAE	
Barbudo Brilloso	<i>Capito auratus</i>	Gilded Barbet
Barbudo de Garganta Limón	<i>Eubucco richardsoni</i>	Lemon-throated Barbet
Barbudo de Capucha Escarlata	<i>Eubucco tucinkae</i>	Scarlet-hooded Barbet
	Familia RAMPHASTIDAE	
Tucán de Garganta Blanca	<i>Ramphastos tucanus</i>	White-throated Toucan
Tucán de Pico Acanalado	<i>Ramphastos vitellinus</i>	Channel-billed Toucan
Tucancillo de Collar Dorado	<i>Selenidera reinwardtii</i>	Golden-collared Toucanet
Arasari Letreado	<i>Pteroglossus inscriptus</i>	Lettered Araçari
Arasari de Oreja Castaña	<i>Pteroglossus castanotis</i>	Chestnut-eared Araçari
Arasari de Pico Marfil	<i>Pteroglossus azara</i>	Ivory-billed Araçari
Arasari Encrespado	<i>Pteroglossus beauharnaesii</i>	Curl-crested Araçari
	Familia PICIDAE	
Carpintero de Penacho Amarillo	<i>Melanerpes cruentatus</i>	Yellow-tufted Woodpecker
Carpintero Chico	<i>Veniliornis passerinus</i>	Little Woodpecker
Carpintero Teñido de Rojo	<i>Veniliornis affinis</i>	Red-stained Woodpecker
Carpintero Verde y Dorado	<i>Picus chrysochloros</i>	Golden-green Woodpecker
Carpintero Castaño	<i>Celeus elegans</i>	Chestnut Woodpecker
Carpintero Anillado	<i>Celeus torquatus</i>	Ringed Woodpecker
Carpintero Lineado	<i>Dryocopus lineatus</i>	Lineated Woodpecker
Carpintero de Cuello Rojo	<i>Campephilus rubricollis</i>	Red-necked Woodpecker
Carpintero de Cresta Roja	<i>Campephilus melanoleucos</i>	Crimson-crested Woodpecker
	Orden FALCONIFORMES	
	Familia FALCONIDAE	
Halcón Reidor	<i>Herpetotheres cachinnans</i>	Laughing Falcon
Halcón-Montés Barrado	<i>Micrastur ruficollis</i>	Barred Forest-Falcon
Halcón-Montés de Ojo Blanco	<i>Micrastur gilvicollis</i>	Lined Forest-Falcon
Halcón-Montés de Dorso Gris	<i>Micrastur mirandollei</i>	Slaty-backed Forest-Falcon
Caracara de Vientre Blanco	<i>Ibycter americanus</i>	Red-throated Caracara
Caracara Negro	<i>Daptrius ater</i>	Black Caracara

Amenaza IUCN	Amenaza PERU	Endemismo	Migratoria	Bambu	Atributo especial	Abundancia	Habitat	Evidencia
						R	B	O
						R	B	O
		X				R	B	O
						C	B	G
						R	B	G
						R	B	F
						R	B	G
						R	B	O
						R	B	O
						R	B	CG
						A	AR	O
						C	B	O
						C	AR	O
						R	B	O
						R	B	F
						R	AR	F
						C	B	F
						C	B	O
						R	B	O
						R	B	O
						R	B	O
						R	B	O
						R	B	G
						C	G	O
						R	G	O

NOMBRE EN CASTELLANO	NOMBRE CIENTIFICO	NOMBRE EN INGLES
Halcón Caza Murciélagos	<i>Falco rufigularis</i> Orden PSITTACIFORMES Familia PSITTACIDAE	Bat Falcon
Perico Tui	<i>Brotogeris sanctithomae</i>	Tui Parakeet
Perico de Ala Cobalto	<i>Brotogeris cyanopectera</i>	Cobalt-winged Parakeet
Loro de Mejilla Naranja	<i>Pyrilia barrabandi</i>	Orange-cheeked Parrot
Loro de Cabeza Azul	<i>Pionus menstruus</i>	Blue-headed Parrot
Loro de Corona Amarilla	<i>Amazona ochrocephala</i>	Yellow-crowned Parrot
Loro Harinoso	<i>Amazona farinosa</i>	Mealy Parrot
Loro de Vientre Blanco	<i>Pionites leucogaster</i>	White-bellied Parrot
Perico de Gorro Negro	<i>Pyrhura rupicola</i>	Black-capped Parakeet
Cotorra de Cabeza Oscura	<i>Aratinga weddellii</i>	Dusky-headed Parakeet
Guacamayo de Vientre Rojo	<i>Orthopsittaca manilatus</i>	Red-bellied Macaw
Guacamayo de Cabeza Azul	<i>Primolius couloni</i>	Blue-headed Macaw
Guacamayo Azul y Amarillo	<i>Ara ararauna</i>	Blue-and-yellow Macaw
Guacamayo Escarlata	<i>Ara macao</i>	Scarlet Macaw
Guacamayo Rojo y Verde	<i>Ara chloropterus</i>	Red-and-green Macaw
Guacamayo de Frente Castaña	<i>Ara severus</i>	Chestnut-fronted Macaw
Cotorra de Ojo Blanco	<i>Psittacara leucophthalmus</i> Orden PASSERIFORMES Familia THAMNOPHILIDAE	White-eyed Parakeet
Batará Lineado	<i>Cymbilaimus lineatus</i>	Fasciated Antshrike
Batará de Bambú	<i>Cymbilaimus sanctaemariae</i>	Bamboo Antshrike
Batará Grande	<i>Taraba major</i>	Great Antshrike
Batará de Ala Llana	<i>Thamnophilus schistaceus</i>	Plain-winged Antshrike
Batará de Hombro Blanco	<i>Thamnophilus aethiops</i>	White-shouldered Antshrike
Batará de Garganta Oscura	<i>Thamnomanes ardesiacus</i>	Dusky-throated Antshrike
Batará Azul-Acerado	<i>Thamnomanes schistogynus</i>	Bluish-slate Antshrike
Hormiguerito de Ojo Blanco	<i>Epinecrophylla leucophthalma</i>	White-eyed Antwren
Hormiguerito Adornado	<i>Epinecrophylla ornata</i>	Ornate Antwren
Hormiguerito Pigmeo	<i>Myrmotherula brachyura</i>	Pygmy Antwren

Amenaza IUCN	Amenaza PERU	Endemismo	Migratoria	Bambu	Atributo especial	Abundancia	Habitat	Evidencia
						R	BR	O
						C	G	O
						A	GR	G
						R	G	O
						A	GR	F
						A	BG	G
						A	BG	FG
						C	BG	FG
						R	G	O
						C	G	O
						C	G	O
VU	VU					C	GR	FG
						R	GR	F
						R	BR	F
						A	BR	G
						C	G	O
						C	G	O
						C	B	G
				XX		C	BP	G
						A	AR	G
						C	B	CG
						R	B	CG
						R	B	C
						C	B	CG
						R	B	CF
				X		R	P	C
						A	BR	G

NOMBRE EN CASTELLANO	NOMBRE CIENTIFICO	NOMBRE EN INGLES
Hormiguerito de Sclater	<i>Myrmotherula sclateri</i>	Sclater's Antwren
Hormiguerito de Flanco Blanco	<i>Myrmotherula axillaris</i>	White-flanked Antwren
Hormiguerito de Ala Larga	<i>Myrmotherula longipennis</i>	Long-winged Antwren
Hormiguerito Gris	<i>Myrmotherula menetriesii</i>	Gray Antwren
Hormiguerito Bandeado	<i>Dichrozona cincta</i>	Banded Antbird
Hormiguerito de Ala Rufa	<i>Herpsilochmus rufimarginatus</i>	Rufous-winged Antwren
Hormiguero de Pecho Amarillo	<i>Hypocnemis subflava</i>	Yellow-breasted Warbling-Antbird
Hormiguero Negro	<i>Cercomacroides serva</i>	Black Antbird
Hormiguero Gris	<i>Cercomacra cinerascens</i>	Gray Antbird
Hormiguero de Ceja Blanca	<i>Myrmoborus leucophrys</i>	White-browed Antbird
Hormiguero de Cara Negra	<i>Myrmoborus myotherinus</i>	Black-faced Antbird
Hormiguero de Lineas Blancas	<i>Percnostola lophotes</i>	White-lined Antbird
Hormiguero de Cola Castaña	<i>Myrmeciza hemimelaena</i>	Chestnut-tailed Antbird
Hormiguero de Garganta Negra	<i>Myrmeciza atrothorax</i>	Black-throated Antbird
Hormiguero de Goeldi	<i>Myrmeciza goeldii</i>	Goeldi's Antbird
Hormiguero Plomizo	<i>Myrmeciza hyperythra</i>	Plumbeous Antbird
Hormiguero Tiznado	<i>Myrmeciza fortis</i>	Sooty Antbird
Hormiguero de Garganta Blanca	<i>Gymnopithys salvini</i>	White-throated Antbird
Hormiguero de Cresta Canosa	<i>Rhegmatorhina melanosticta</i>	Hairy-crested Antbird
Hormiguero de Dorso Moteado	<i>Hylophylax naevius</i>	Spot-backed Antbird
Hormiguero de Dorso Escamoso	<i>Willisornis poecilinotus</i>	Scale-backed Antbird
Ojo-Pelado Moteado de Negro	<i>Phlegopsis nigromaculata</i>	Black-spotted Bare-eye
	Familia CONOPOPHAGIDAE	
Jejenero de Garganta Ceniza	<i>Conopophaga peruviana</i>	Ash-throated Gnateater
	Familia GRALLARIIDAE	
Tororoi Amazónico	<i>Hylopezus berlepschi</i>	Amazonian Antpitta
Tororoi Campanero	<i>Myrmothera campanisona</i>	Thrush-like Antpitta
	Familia RHINOCRYPTIDAE	
Tapaculo de Faja Rojiza	<i>Liosceles thoracicus</i>	Rusty-belted Tapaculo
	Familia FORMICARIIDAE	
Gallito-Hormiguero de Gorro Rufo	<i>Formicarius colma</i>	Rufous-capped Antthrush

Amenaza IUCN	Amenaza PERU	Endemismo	Migratoria	Bambu	Atributo especial	Abundancia	Habitat	Evidencia
						C	B	O
						C	B	CG
						C	B	G
						C	B	CG
						R	B	F
						C	B	G
				X		C	BP	G
						R	B	G
						A	B	CG
				X		A	BP	G
						C	B	CG
	X			XX		R	P	G
				X		C	BP	G
						C	R	O
	X			XX		C	BP	G
						R	R	O
						R	B	C
						R	B	CG
						R	B	CG
						R	B	C
						R	B	O
						R	B	CG
						R	B	C
						R	R	O
						R	B	G
						C	B	FG
						R	B	CG

NOMBRE EN CASTELLANO	NOMBRE CIENTIFICO	NOMBRE EN INGLES
Gallito-Hormiguero de Cara Negra	<i>Formicarius analis</i>	Black-faced Antthrush
Rasconzuelo Estriado	<i>Chamaeza nobilis</i>	Striated Antthrush
	Familia FURNARIIDAE	
Tira-Hoja de Cola Negra	<i>Sclerurus caudacutus</i>	Black-tailed Leafhopper
Trepador Oliváceo	<i>Sittasomus griseicapillus</i>	Olivaceous Woodcreeper
Trepador de Cola Larga	<i>Deconychura longicauda</i>	Long-tailed Woodcreeper
Trepador de Barbilla Blanca	<i>Dendrocincla merula</i>	White-chinned Woodcreeper
Trepador Pardo	<i>Dendrocincla fuliginosa</i>	Plain-brown Woodcreeper
Trepador Pico de Cuña	<i>Glyphorhynchus spirurus</i>	Wedge-billed Woodcreeper
Trepador de Garganta Canela	<i>Dendrexetastes rufigula</i>	Cinnamon-throated Woodcreeper
Trepador de Pico Largo	<i>Nasica longirostris</i>	Long-billed Woodcreeper
Trepador Barrado Amazónico	<i>Dendrocolaptes certhia</i>	Amazonian Barred-Woodcreeper
Trepador de Vientre Bandeado	<i>Dendrocolaptes picumnus</i>	Black-banded Woodcreeper
Trepador de Pico Fuerte	<i>Xiphocolaptes promeropirhynchus</i>	Strong-billed Woodcreeper
Trepador Elegante	<i>Xiphorhynchus elegans</i>	Elegant Woodcreeper
Trepador de Garganta Anteada	<i>Xiphorhynchus guttatus</i>	Buff-throated Woodcreeper
Trepador de Pico Recto	<i>Dendroplex picus</i>	Straight-billed Woodcreeper
Pico-Guadaña de Pico Rojo	<i>Campylorhamphus trochillostris</i>	Red-billed Scythebill
Pico-Lezna de Pico Fino	<i>Xenops tenuirostris</i>	Slender-billed Xenops
Pico-Lezna Simple	<i>Xenops minutus</i>	Plain Xenops
Pico-Lezna Rayado	<i>Xenops rutilans</i>	Streaked Xenops
Hornero de Pata Pálida	<i>Furnarius leucopus</i>	Pale-legged Hornero
Hoja-Rasquero de Mejilla Oscura	<i>Anabazenops dorsalis</i>	Dusky-cheeked Foliage-gleaner
Limpia-Follaje de Ala Castaña	<i>Philydor erythropterum</i>	Chestnut-winged Foliage-gleaner
Limpia-Follaje de Frente Anteada	<i>Philydor rufum</i>	Buff-fronted Foliage-gleaner
Pico-Recurvo Peruano	<i>Syndactyla ucayalae</i>	Peruvian Recurvebill
Pico-Gancho de Ala Castaña	<i>Ancistrops strigilatus</i>	Chestnut-winged Hookbill
Hoja-Rasquero Rojizo	<i>Clibanornis rubiginosus</i>	Ruddy Foliage-gleaner
Trepamusgo Listado	<i>Thripadectes holostictus</i>	Striped Treehunter
Hoja-Rasquero de Corona Castaña	<i>Automolus rufipileatus</i>	Chestnut-crowned Foliage-gleaner
Hoja-Rasquero de Lomo Pardo	<i>Automolus melanopezus</i>	Brown-rumped Foliage-gleaner

Amenaza IUCN	Amenaza PERU	Endemismo	Migratoria	Bambu	Atributo especial	Abundancia	Habitat	Evidencia
						A	B	CG
						R	B	C
						R	B	F
						A	B	G
						R	B	G
						R	B	C
						C	B	G
						C	B	C
						A	BR	G
						C	R	G
						R	B	O
						R	B	CG
						R	B	C
						C	B	CG
						A	AB	G
						R	B	C
				X		R	BP	CG
						R	B	O
						R	B	C
						R	B	O
						C	R	G
				XX		R	BP	O
						R	B	O
						R	B	O
				XX		R	P	G
						R	B	O
				X		R	BP	C
						R	B	O
				X		C	BP	G
				XX		R	BP	FG

NOMBRE EN CASTELLANO	NOMBRE CIENTIFICO	NOMBRE EN INGLES
Hoja-Rasquero de Lomo Pardo	<i>Automolus melanopezus</i>	Brown-rumped Foliage-gleaner
Hoja-Rasquero de Garganta Anteada	<i>Automolus ochrolaemus</i>	Buff-throated Foliage-gleaner
Rondabosque Rayado	<i>Automolus subulatus</i>	Striped Woodhaunter
Hoja-Rasquero de Dorso Olivo	<i>Automolus infuscatus</i>	Olive-backed Foliage-gleaner
Cola-Espina Jaspeado	<i>Cranioleuca gutturata</i>	Speckled Spinetail
Cola-Espina de Corona Parda	<i>Synallaxis gujanensis</i>	Plain-crowned Spinetail
Cola-Espina Rojizo	<i>Synallaxis rutilans</i>	Ruddy Spinetail
Familia TYRANNIDAE		
Moscareta de Corona Amarilla	<i>Tyrannulus elatus</i>	Yellow-crowned Tyrannulet
Fío-Fío de la Selva	<i>Myiopagis gaimardii</i>	Forest Elaenia
Fío-Fío Gris	<i>Myiopagis caniceps</i>	Gray Elaenia
Moscareta de Lores Blancos	<i>Ornithion inerne</i>	White-lored Tyrannulet
Coritopis Anillado	<i>Corythopis torquatus</i>	Ringed Antpipit
Mosquerito de Vientre Ocráceo	<i>Mionectes oleagineus</i>	Ochre-bellied Flycatcher
Mosquerito de Gorro Sepia	<i>Leptopogon amaurocephalus</i>	Sepia-capped Flycatcher
Tirano-Pigmeo de Cola Corta	<i>Myiornis ecaudatus</i>	Short-tailed Pygmy-Tyrant
Tirano-Pigmeo de Cresta Larga	<i>Lophotriccus eulophotes</i>	Long-crested Pygmy-Tyrant
Tirano-Pigmeo Flamulado	<i>Hemitriccus flammulatus</i>	Flammulated Pygmy-Tyrant
Tirano-Todi de Vientre Blanco	<i>Hemitriccus griseipectus</i>	White-bellied Tody-Tyrant
Tirano-Todi de Johannes	<i>Hemitriccus iohannis</i>	Johannes's Tody-Tyrant
Espatulilla de Frente Rojiza	<i>Poecilatriccus latirostris</i>	Rusty-fronted Tody-Flycatcher
Espatulilla Moteada	<i>Todirostrum maculatum</i>	Spotted Tody-Flycatcher
Espatulilla de Ceja Amarilla	<i>Todirostrum chrysocrotaphum</i>	Yellow-browed Tody-Flycatcher
Pico-Plano Oliváceo	<i>Rhynchocyclus olivaceus</i>	Olivaceous Flatbill
Pico-Ancho Azufrado	<i>Tolmomyias sulphurescens</i>	Yellow-olive Flycatcher
Pico-Ancho de Ala Amarilla	<i>Tolmomyias assimilis</i>	Yellow-margined Flycatcher
Pico-Ancho de Pecho Amarillo	<i>Tolmomyias flaviventris</i>	Yellow-breasted Flycatcher
Mosquero Real	<i>Onychorhynchus coronatus</i>	Royal Flycatcher
Mosquerito de Pecho Rayado	<i>Myiophobus fasciatus</i>	Bran-colored Flycatcher
Mosquerito de Cola Rojiza	<i>Terentotriccus erythrurus</i>	Ruddy-tailed Flycatcher
Pibí Boreal	<i>Contopus cooperi</i>	Olive-sided Flycatcher

Amenaza IUCN	Amenaza PERU	Endemismo	Migratoria	Bambu	Atributo especial	Abundancia	Habitat	Evidencia
				XX		R	BP	FG
						C	B	CG
						C	B	G
						C	B	O
						R	B	F
						R	R	O
				X		R	BP	G
						R	B	G
						A	B	G
						R	B	O
						R	B	O
						C	B	CG
						R	B	O
				X		C	BP	G
						C	B	G
	X			X		C	BP	G
				XX		R	BP	G
						C	B	G
						C	BR	G
						R	B	O
						R	AR	O
						R	AR	O
						R	B	C
						R	A	O
						R	B	O
						R	AR	O
						R	B	C
				X		R	B	O
						C	B	G
			B			R	B	O

NOMBRE EN CASTELLANO	NOMBRE CIENTIFICO	NOMBRE EN INGLES
Pibí Tropical	<i>Contopus cinereus</i>	Tropical Pewee
Mosquero Bermellón	<i>Pyrocephalus rubinus</i>	Vermilion Flycatcher
Tirano de Agua Arenisco	<i>Ochthornis littoralis</i>	Drab Water Tyrant
Mosquero Pirata	<i>Legatus leucophaeus</i>	Piratic Flycatcher
Mosquero Social	<i>Myiozetetes similis</i>	Social Flycatcher
Mosquero de Gorro Gris	<i>Myiozetetes granadensis</i>	Gray-capped Flycatcher
Mosquero de Pecho Oscuro	<i>Myiozetetes luteiventris</i>	Dusky-chested Flycatcher
Bienteveo Grande	<i>Pitangus sulphuratus</i>	Great Kiskadee
Bienteveo Menor	<i>Pitangus lictor</i>	Lesser Kiskadee
Mosquero de Vientre Azufrado	<i>Myiodynastes luteiventris</i>	Sulphur-bellied Flycatcher
Mosquero Rayado	<i>Myiodynastes maculatus</i>	Streaked Flycatcher
Mosquero Picudo	<i>Megarynchus pitangua</i>	Boat-billed Flycatcher
Mosquero-Pizarroso Coronado	<i>Empidonomus aurantioatrocristatus</i>	Crowned Slaty Flycatcher
Tirano Tropical	<i>Tyrannus melancholicus</i>	Tropical Kingbird
Plañidero Grisáceo	<i>Rhytipterna simplex</i>	Grayish Mourner
Siristes de Lomo Blanco	<i>Sirystes albocinereus</i>	White-rumped Sirystes
Copetón de Cresta Oscura	<i>Myiarchus tuberculifer</i>	Dusky-capped Flycatcher
Copetón de Cresta Corta	<i>Myiarchus ferox</i>	Short-crested Flycatcher
Pico-Plano Cabezón	<i>Ramphotrigo megalacephalum</i>	Large-headed Flatbill
Pico-Plano de Cola Rufa	<i>Ramphotrigo ruficauda</i>	Rufous-tailed Flatbill
Pico-Plano de Cola Oscura	<i>Ramphotrigo fuscicauda</i>	Dusky-tailed Flatbill
Atila de Ojo Blanco	<i>Attila bolivianus</i>	Dull-capped Attila
Atila Polimorfo	<i>Attila spadiceus</i>	Bright-rumped Attila
	Familia COTINGIDAE	
Cuervo-Fruterero de Garganta Púrpura	<i>Querula purpurata</i>	Purple-throated Fruitcrow
Piha Gritona	<i>Lipaugus vociferans</i>	Screaming Piha
Cuervo-Fruterero de Cuello Pelado	<i>Gymnoderus foetidus</i>	Bare-necked Fruitcrow
Cotinga de Cara Negra	<i>Conioptilon mcilhennyi</i>	Black-faced Cotinga
	Familia PIPRIDAE	
Saltarín-Tirano de Cresta Azafrán	<i>Neopelma chrysocephalum</i>	Saffron-crested Tyrant-Manakin
Saltarín de Cola Bandeada	<i>Pipra fasciicauda</i>	Band-tailed Manakin

Amenaza IUCN	Amenaza PERU	Endemismo	Migratoria	Bambu	Atributo especial	Abundancia	Habitat	Evidencia
						R	B	O
						R	R	F
						C	R	F
						C	B	G
						C	R	F
						R	R	F
						R	A	O
						C	A	O
						R	R	F
			B			R	A	O
						R	A	O
						R	R	O
			A			R	AR	F
						R	A	O
						C	B	CG
						C	B	FG
						R	B	G
						C	AR	FG
				XX		C	P	G
						C	B	O
				XX		C	BP	G
						C	B	O
						C	B	O
						C	B	FG
						C	B	G
						R	B	O
		X				C	AB	G
						C	B	O
				XX		C	BP	G
						C	B	CFG

NOMBRE EN CASTELLANO	NOMBRE CIENTIFICO	NOMBRE EN INGLES
Saltarín de Cola Bandeada	<i>Pipra fasciicauda</i>	Band-tailed Manakin
Saltarín de Cola Redonda	<i>Ceratopipra chloromeros</i>	Round-tailed Manakin
	Familia TITYRIDAE	
Titira de Corona Negra	<i>Tityra inquisitor</i>	Black-crowned Tityra
Titira de Cola Negra	<i>Tityra cayana</i>	Black-tailed Tityra
Titira Enmascarada	<i>Tityra semifasciata</i>	Masked Tityra
Plañidero Cinéreo	<i>Laniocera hypopyrra</i>	Cinereous Mourner
Cabezón de Ala Blanca	<i>Pachyramphus polychopterus</i>	White-winged Becard
Cabezón de Garganta Rosada	<i>Pachyramphus minor</i>	Pink-throated Becard
	GENERA INCERTAE SEDIS	
Piprites de Ala Barrada	<i>Piprites chloris</i>	Wing-barred Piprites
	Familia VIREONIDAE	
Vireón de Ceja Rufa	<i>Cyclarhis gujanensis</i>	Rufous-browed Peppershrike
Vireón de Gorro Apizarrado	<i>Vireolanius leucotis</i>	Slaty-capped Shrike-Vireo
Vireo de Ojo Rojo	<i>Vireo olivaceus</i>	Red-eyed Vireo
Verdillo de Corona Leonada	<i>Tunchiornis ochraceiceps</i>	Tawny-crowned Greenlet
Verdillo de Gorro Oscuro	<i>Pachysylvia hypoxantha</i>	Dusky-capped Greenlet
	Familia CORVIDAE	
Urraca Violácea	<i>Cyanocorax violaceus</i>	Violaceous Jay
	Familia HIRUNDINIDAE	
Golondrina de Faja Blanca	<i>Atticora fasciata</i>	White-banded Swallow
Golondrina de Muslo Blanco	<i>Atticora tibialis</i>	White-thighed Swallow
Golondrina Ala-Rasposa Sureña	<i>Stelgidopteryx ruficollis</i>	Southern Rough-winged Swallow
Martín de Pecho Pardo	<i>Progne tapera</i>	Brown-chested Martin
Golondrina de Ala Blanca	<i>Tachycineta albiventer</i>	White-winged Swallow
	Familia TROGLODYTIDAE	
Cucarachero de Pecho Escamoso	<i>Microcerculus marginatus</i>	Scaly-breasted Wren
Cucarachero Zorzal	<i>Campylorhynchus turdinus</i>	Thrush-like Wren
Cucarachero Bigotudo	<i>Pheugopedius genibarbis</i>	Moustached Wren
Cucarachero Musical	<i>Cyphorhinus arada</i>	Musician Wren
	Familia DONACOBIIDAE	

Amenaza IUCN	Amenaza PERU	Endemismo	Migratoria	Bambu	Atributo especial	Abundancia	Habitat	Evidencia
						C	B	CFG
						R	B	CG
						C	B	F
						R	B	O
						R	B	O
						C	B	CG
						C	B	G
						R	B	G
						A	B	FG
						A	B	G
						C	B	G
						R	B	O
						C	B	G
						C	B	G
						C	BR	G
						C	R	F
						R	R	O
						C	R	O
						R	R	O
						R	R	O
						C	B	G
						C	AR	G
				X		R	R	G
						R	B	G

NOMBRE EN CASTELLANO	NOMBRE CIENTIFICO	NOMBRE EN INGLES
Donacobio	<i>Donacobius atricapilla</i> Familia TURDIDAE	Black-capped Donacobius
Zorzal de Hauxwell	<i>Turdus hauxwelli</i>	Hauxwell's Thrush
Zorzal de Pico Negro	<i>Turdus ignobilis</i>	Black-billed Thrush
Zorzal de Cuello Blanco	<i>Turdus albicollis</i> Familia THRAUPIDAE	White-necked Thrush
Tangara Urraca	<i>Cissopis leverianus</i>	Magpie Tanager
Tangara Pintada de Pico Rojo	<i>Lamprospiza melanoleuca</i>	Red-billed Pied Tanager
Tangara de Cresta Amarilla	<i>Tachyphonus rufiventer</i>	Yellow-crested Tanager
Tangara de Hombro Blanco	<i>Tachyphonus luctuosus</i>	White-shouldered Tanager
Tangara de Ala Blanca	<i>Lanio versicolor</i>	White-winged Shrike-Tanager
Tangara Carmesí Enmascarada	<i>Ramphocelus nigrogularis</i>	Masked Crimson Tanager
Tangara de Pico Plateado	<i>Ramphocelus carbo</i>	Silver-beaked Tanager
Tangara Azuleja	<i>Thraupis episcopus</i>	Blue-gray Tanager
Tangara de Palmeras	<i>Thraupis palmarum</i>	Palm Tanager
Tangara de Vientre Amarillo	<i>Tangara xanthogastra</i>	Yellow-bellied Tanager
Tangara Turquesa	<i>Tangara mexicana</i>	Turquoise Tanager
Tangara del Paraíso	<i>Tangara chilensis</i>	Paradise Tanager
Tangara de Corona Opalina	<i>Tangara callophrys</i>	Opal-crowned Tanager
Tangara de Cabeza Baya	<i>Tangara gyrola</i>	Bay-headed Tanager
Dacnis de Cara Negra	<i>Dacnis lineata</i>	Black-faced Dacnis
Mielero Verde	<i>Chlorophanes spiza</i>	Green Honeycreeper
Tangara Guira	<i>Hemithraupis guira</i>	Guira Tanager
Espiguero Doble Acollarado	<i>Sporophila caerulescens</i> GENERA INCERTAE SEDIS	Double-collared Seedeater
Saltador de Garganta Anteada	<i>Saltator maximus</i>	Buff-throated Saltator
Saltador Grisáceo	<i>Saltator coerulescens</i>	Grayish Saltator
Picogruero de Pico Rojo	<i>Saltator grossus</i> Familia EMBERIZIDAE	Slate-colored Grosbeak
Gorrión de Ceja Amarilla	<i>Ammodramus aurifrons</i>	Yellow-browed Sparrow
Gorrión Pectoral	<i>Arremon taciturnus</i>	Pectoral Sparrow

Amenaza IUCN	Amenaza PERU	Endemismo	Migratoria	Bambu	Atributo especial	Abundancia	Habitat	Evidencia
						R	R	O
						C	B	G
						R	B	F
						R	B	C
						C	B	O
						R	B	O
						R	B	C
						R	B	O
						R	B	O
						R	B	O
						R	B	O
						R	B	O
						R	AR	O
						R	A	G
						R	A	O
						R	B	O
						R	B	O
						C	B	G
						R	B	F
						R	B	O
						R	B	O
						R	B	O
						R	B	O
						R	B	O
						C	R	F
						R	B	O
						R	B	O
						R	B	O
						C	AR	FG
						R	B	O

A

NOMBRE EN CASTELLANO	NOMBRE CIENTIFICO	NOMBRE EN INGLES
	Familia CARDINALIDAE	
Tangara-Hormiguera de Corona Roja	<i>Habia rubica</i>	Red-crowned Ant-Tanager
Picogrueso Negro Azulado	<i>Cyanocopsa cyanoides</i>	Blue-black Grosbeak
	Familia PARULIDAE	
Reinita de Lomo Anteado	<i>Myiothlypis fulvicauda</i>	Buff-rumped Warbler
	Familia ICTERIDAE	
Oropéndola de Dorso Bermejo	<i>Psarocolius angustifrons</i>	Russet-backed Oropendola
Oropéndola Crestada	<i>Psarocolius decumanus</i>	Crested Oropendola
Oropéndola Olivácea	<i>Psarocolius bifasciatus</i>	Olive Oropendola
Cacique Solitario	<i>Cacicus solitarius</i>	Solitary Black Cacique
Cacique de Lomo Amarillo	<i>Cacicus cela</i>	Yellow-rumped Cacique
Turpial de Dorso Naranja	<i>Icterus croconotus</i>	Orange-backed Troupial
Tordo Gigante	<i>Molothrus oryzivorus</i>	Giant Cowbird
	Familia FRINGILLIDAE	
Eufonia de Pico Gueso	<i>Euphonia laniirostris</i>	Thick-billed Euphonia
Eufonia de Vientre Dorado	<i>Euphonia chrysopasta</i>	Golden-bellied Euphonia
Eufonia de Vientre Rufo	<i>Euphonia rufiventris</i>	Rufous-bellied Euphonia

LEYENDA

Amenaza: (VU) Vulnerable

Endemismo: (X) Endémico de las Tierras bajas del sureste peruano

Migratorio: (B) Boreales / (A) Australes

Bambú: (X): especialista facultativo, / (XX) especialista obligado

Abundancia: (R) Rara / (C) Común / (A) Abundante

Hábitat: (B) Bosque de colinas bajas / (P) Áreas con presencia de Paca o Bambú / (A) Áreas abiertas

(R) Vegetación ribereña / (G) Todos los hábitats

Evidencia: (F) Foto / (O) Observado / (G) Grabado / (C) Capturado en redes

Amenaza IUCN	Amenaza PERU	Endemismo	Migratoria	Bambu	Atributo especial	Abundancia	Habitat	Evidencia
						C	B	G
						C	B	CG
						C	R	G
						C	AR	G
						R	B	G
						R	B	F
						C	AR	G
						C	AR	G
						R	R	G
						R	R	O
						R	B	O
						R	B	O
						C	B	G

EN COLABORACIÓN CON:



CON EL APOYO DE:

CONSORCIO INTEGRADO POR:

