

ASOCIACION PRO-BIENESTAR DE LA FAMILIA DE GUATEMALA

A P R O F A M

Dr. Roberto Santiso Gálves

DIRECTOR EJECUTIVO

T.S. María Antonieta Pineda H.
DIRECTORA UNIDAD EVALUACION

A S I S T E N C I A T E C N I C A

Centro de Control de Enfermedades
División de Evaluación de Planifi
cación Familiar.
Atlanta, Georgia

Centro de Estudios de la
Comunidad y la Familia
Universidad de Chicago

Dr. Leo Morris
Dr. Charles H. C. Chen
Dr. John E. Anderson

Dra. Jane T. Bertrand

ENCUESTA NACIONAL DE FECUNDIDAD
PLANIFICACION FAMILIAR Y COMUNICACION
DE GUATEMALA (ENPAG/78)

PRIMERA PARTE
FECUNDIDAD Y PLANIFICACION FAMILIAR

ENCUESTA NACIONAL DE FECUNDIDAD
PLANIFICACION FAMILIAR Y COMUNICACION SOCIAL
(ENPAG) GUATEMALA, 1978

Agradecimientos

La Asociación Pro-Bienestar de la Familia de Guatemala, (APROFAM) agradece a todas las Instituciones y profesionales, su valiosa colaboración proporcionada al estudio, cuyo apoyo hizo posible su realización.

Las Instituciones que participaron más directamente, fueron:

1. Dirección General de Estadística, que proporcionó datos de población, el marco muestral y la cartografía.
2. Agencia para el Desarrollo Internacional de Guatemala (AID), que proporcionó el financiamiento para el estudio.
3. División Materno Infantil y Familiar del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.
4. Universidad de Chicago, que prestó asistencia técnica, en comunicaciones sociales.
5. Centro de Control de Enfermedades, División de Evaluación de Planificación Familiar, Atlanta, Georgia, que prestó asistencia técnica, en diseño y ejecución de la encuesta y análisis de datos.
6. Asociación Pro-Bienestar de la Familia de Guatemala, que participó en el diseño y ejecución de la encuesta y en el análisis de datos.

Antecedentes:

La Asociación Pro-Bienestar de la Familia de Guatemala, por medio de su Unidad de Evaluación, realizó un estudio en 1976, sobre las perspectivas de la Planificación Familiar en el área rural, en cuatro regiones tipo del país: Sur-Oriente; occidente, norte y sur; este estudio se hizo fundamentalmente para conocer los obstáculos que se presentaban para la adopción de métodos anticonceptivos y así poder asignar contenidos educativos, en base a las necesidades e intereses de cada población blanco, a la cual irían dirigidos los mensajes de Planificación Familiar. En 1978 se hizo en las mismas poblaciones un segundo estudio similar, con el objeto de conocer el grado de penetración de los medios de comunicación.

social y cambios de actitud hacia el uso de métodos anticonceptivos. Para implementar nuevos programas de población y Planificación Familiar, APROFAM, sintió la necesidad urgente de realizar una encuesta a nivel nacional sobre Fecundidad, Planificación Familiar y Comunicación Social, (ENPAG 78).

Los aspectos más importantes que se investigaron fueron:

1. Características socio-demográficas de la Mujer
2. Fecundidad de la mujer guatemalteca y deseo de embarazo.
3. Conocimiento y uso de anticonceptivos.
4. Práctica y fuente de obtención de los métodos anticonceptivos.
5. Conocimiento sobre disponibilidad de servicios y demanda de servicios de esterilización.
6. Medios de comunicación social.

Los hallazgos mostrarían el impacto que los programas de Planificación Familiar habían tenido en Guatemala.

Este informe corresponde a la primera parte de dicho estudio, en la cual se analizaron la fecundidad y Planificación Familiar; la segunda parte tratará el aspecto de la Comunicación Social.

OBJETIVOS:

Objetivos Generales:

Proporcionar y mantener información actualizada sobre los programas de Planificación Familiar y Comunicación Social en Guatemala, para evaluación de impacto y efectividad de servicios.

Objetivos Específicos:

- a. Describir niveles de fecundidad de la mujer guatemalteca.
- b. Estimar conocimiento y uso de los métodos anticonceptivos de la mujer en edad fértil (15 - 44 años)
- c. Determinar la fuente de obtención de anticonceptivos.

- d. Determinar la proporción de mujeres con historia de aborto, incluyendo el porcentaje de las que necesitaron atención médica y hospitalaria.
- e. Estimar la demanda de servicios y conocimiento de los mismos.
- f. Conocer la penetración del programa de Comunicación Social en Planificación Familiar a nivel indígena y no indígena; y la efectividad de los medios de comunicación social que se han utilizado.

Personal Participante:

ASESORES TECNICOS: Dr. Leo Morris, Jefe de Sección de Evaluación de Programas.
 División de Evaluación de Planificación Familiar
 Centro de Control de Enfermedades
 Atlanta, Georgia, U.S.A.

Dra. Jane Bertrand - Universidad de Chicago
 Centro de Estudios de la Comunidad y la Familia.

Dr. George Rubin

Dr. Georgio Benussi

Participaron durante el proceso de adiestramiento del personal de campo

INVESTIGADOR PRINCIPAL: T.S., María Antonieta Pineda H.
 Directora de la Unidad de Evaluación
 Asociación Pro-Bienestar de la Familia de Guatemala, (APROFAM)

COORDINADORA DE CAMPO: Profesora Irma Muñoz, Técnica en Supervisión de Trabajo de Campo.

SUPERVISORES DE CAMPO: Sandra Guerra
 Bárbara Sáenz
 Antonio Cabrera
 Carlos Ortíz.

**ENTREVISTADORES
ESPAÑOL:**

Dora España
Genoveva Pérez
Lucrecia Gutiérrez
Sandra Leticia Páiz
Ludovina Pérez
Vidalina Ramos
María Luz Tojín S.
Idalma Mazariegos
Arcelia G. de Morales
Etelvina Solís C.

**ENTREVISTADORAS
BILINGUES:**

MAM

María Cristina López Ordóñez
María Antonia López Ordóñez
María Jiménez

CAKCHIQUEL

Rosa María Tubac Coz.
Juana Sir
Catalina Batsibal

QUICHE:

Noemí Roquel de Reyes
María Pu
Olivia Vásquez

POCONCHI:

Nicolasa Cu Caal
Esperanza Trujillo
Rosalba Medina

KECKCHI:

Gloria Cardoza Sierra
María del Carmen Ponce V.
Gloria Mendoza de Alvarado

SECRETARIA:

S. Yacene Herrera A.

METODOLOGIA:

El país fué dividido en 2 estratos (áreas): (1) el departamento de Guatemala y (2) todos los otros departamentos, llamado en éste informe "El interior". El petén fué excluído, porque tiene solamente 1% de población del país; si se hubiera incluído, los costos de la encuesta hubieran aumentado considerablemente, por la dispersión de su población y las dificultades de comunicación.

En el diseño de la muestra se utilizó para el departamento de Guatemala, el marco muestral de la Encuesta de Hogares, "Planificación de los Recursos Humanos y Empleo", desarrollado por la Sección de Investigaciones Muestrales de la Dirección General de Estadísticas y Censos, actualizado para marzo 1977. La Unidad Primaria de Muestreo la constituye el sector censal. La selección se hizo con probabilidad proporcional al número de hogares que tenía cada sector censal, y en la segunda etapa de muestreo se seleccionaron, 7, 8 ó 9 hogares por sector, dependiendo del cambio en el número de hogares desde el censo de 1973.

Para la Encuesta sobre Anticonceptivos, fué seleccionada una sub-muestra de la Encuesta de Hogares.

El diseño de la muestra para el Interior al igual que en el departamento de Guatemala se hizo en dos etapas, en forma probabilística. Se utilizó el censo de 1973 como marco muestral, ya que desde esa fecha no existe una actualización de los sectores censales fuera del departamento de Guatemala. La Unidad primaria de muestreo la constituye el sector censal y la selección se hizo con probabilidad proporcional a la cantidad de hogares que tenían en el censo 1973. Las unidades de la segunda etapa fueron las viviendas y se seleccionaron conglomerados de 25 hogares. Antes de la selección de la segunda etapa, los sectores situados en el área afectada por el terremoto de 1976, fueron visitadas para confirmar la existencia de los sectores de vivienda destinadas para el estudio.

Las probabilidades de selección no fueron igual para los dos estratos. El departamento de Guatemala, fué sobre-muestreado y constituye el 30% de la muestra total, lo que representa aproximadamente el 20% de la población total del país, el interior fué sub-muestreado y representa el 70% de la muestra total, constituyendo aproximadamente el 80% de la población. Además solo fué seleccionada una mujer en edad fértil (de 15-49 años) en cada hogar, para la entrevista. Por consiguiente la posibilidad de selección para cada mujer, es proporcionalmente inversa al número de mujeres en edad fértil en el hogar, para hacer estimación de proporciones y promedios incluidos en éste informe fué necesario utilizar factores de ponderación para ajustar estas probabilidades que no eran iguales.

Para poder hacer el estudio en el área indígena fué necesario traducir el cuestionario del español a 5 lenguas indígenas predominantes: Quiché, K'ekch'iquel, K'ekch'í, Mam y Pocom-Ch'í; se hizo verificación de la traducción para tener mayor seguridad sobre la misma. Se adiestró personal bilingüe indígena con las siguientes características: hablar y escribir bien el español y su lengua regional; vestir traje regional y tener experiencia anterior en trabajo de campo: se seleccionaron Promotores Sociales, Enfermeras, Auxiliares de Enfermería y con ellas se realizó el pre-test, en sectores poblacionales que no habían caído en la muestra, con el objeto de entrenarlas en el manejo del cuestionario y en técnica de la entrevista, así como determinar si las preguntas eran comprendidas con cierta facilidad por parte de los entrevistados.

En los cuadros de éste informe, se presentan porcentajes que están basados en el número de casos ponderados, así como también el número de casos no ponderados. Este último número es necesario para el cálculo de la varianza. Para las cifras estimativas del país, la variable "Uso actual de Anticonceptivos" tiene una desviación estandar estimada igual a 2.2% con un intervalo de confianza de 95%, incluyendo el "Efecto del Diseño". En cada estrato la misma variable tiene una desviación estandar estimada de 3.5 a 5.0%.

El estado final de las entrevistadas según región y grupo étnico, aparece en el cuadro 1, para los 3,607 hogares incluidos en la muestra, de los cuales se entrevistaron a 2,684 mujeres o sea el 91%. En el departamento de Guatemala se entrevistó a un 87% de las mujeres identificadas en la muestra. Este porcentaje fué de 92% para el área Interior Ladino, 93% para el área del Interior Indígena.

En los siguientes cuadros se comparan las características de las mujeres entrevistadas con información del censo para determinar la representatividad de las entrevistas realizadas.

En el cuadro 2, se comparan las características edad y lugar de residencia (por grupo étnico para el Interior) en Encuesta Nacional de Prevalencia de uso de Anticonceptivos Guatemala, (ENPAG 78), con las de mujeres en el censo nacional de 1973. En general se aprecia una buena aproximación.

En el cuadro 3, se compara el estado civil, para la encuesta con el último censo, en el cual se puede observar que en la encuesta, el 71% de las mujeres estaban casadas o en unión consensual y el 21% eran solteras. Lo que muestra que la aproximación es muy buena, siguiendo en igual forma en lo que se refiere a la residencia de la entrevistada, aunque el censo tiene más mujeres que son solteras y menos que son separadas y divorciadas, esto puede deberse a una diferencia en definiciones. También en el cuadro 3, tenemos que el porcentaje de mujeres casadas y unidas según edad y residencia, comparado con las del censo 1973. Por edad, las aproximaciones también son bastante buenas con relación al censo, mostrando consistentemente un porcentaje menor de mujeres casadas o unidas en el departamento de Guatemala.

En el cuadro No. 4, se presenta el porcentaje de nacimientos de septiembre/77 a agosto 1978, (ENPAG 78), comparado con los nacimientos registrados por las estadísticas vitales de 1974 por grupos de edad y residencia/grupo étnico de la madre. Al comparar la encuesta con las estadísticas vitales de 1974, una vez más se observa una buena concordancia entre los resultados de la encuesta en el departamento de Guatemala y en el Interior.

A. FECUNDIDAD

1. Situación Demográfica

Hasta 1966, la tasa bruta de natalidad en Guatemala, ha variado entre 44 y 49 por 1,000. Desde 1967, las tasas oficiales han sido entre 40 y 42 por 1,000, sin que se observara un descenso consistente durante esos años. La cifra provisional para 1976 es 41.4 por 1,000 (Dirección General de Estadística: Anuario Estadístico de 1976, Ministerio de Economía, Guatemala, julio de 1978.)

En la Encuesta Nacional de Prevalencia de Uso de Anticonceptivos Guatemala (ENPAG 78), se obtuvo información sobre fecundidad de todas las mujeres en los hogares muestreados y para las que habían estado embarazadas se pidió la fecha del último nacimiento. Como se muestra en el cuadro 5, las mujeres en promedio tuvieron 3.4 hijos nacidos vivos, con una diferencia de 1.2 hijos nacidos vivos entre el departamento de Guatemala y el Interior. La tendencia por edad es similar a la del censo de 1973 y el nivel en este es más o menos el mismo encontrado en ENPAG/78.

Lo que indica que probablemente, no ha habido descenso de fecundidad en los últimos 5 años.

Usando la información sobre nacimientos durante el período agosto de 1977 hasta julio de 1978, la estimación de la tasa bruta de natalidad es de 44 por 1,000 (cuadro 6). La tasa oficial en 1976, fué 41.4, pero si existió una sub-numeración de nacimientos de aproximadamente 5%, la tasa oficial sería aproximadamente 43, por 1,000. La tasa estimada para el departamento de Guatemala fué 34 por 1,000 y de 45 y 47 por 1,000 en el Interior para las áreas Ladino é Indígena, respectivamente. Las tasas estimadas de fecundidad global también están incluidas en el cuadro 6.

Se puede comparar la fecundidad en el año más reciente con la fecundidad acumulada, lo que podría indicar, si ha habido tendencias recientes en fecundidad.

La metodología usada compara la distribución observada del promedio de hijos nacidos vivos, con la distribución que tendría si las tasas de fecundidad en el año anterior fueran constantes (JE Potter, M. Ordenez y AR Measham: The Rapid Decline In Colombian Fertility. Population and Development Review (2)-3-4: 509, 1976). Si la razón entre las distribuciones es mayor que que 1.0, hay evidencia de un descenso reciente en fecundidad. Como observamos en el cuadro 7, la razón promedio es 1.08, aunque mayor que 1.0, no es una cifra que difiera significativamente, Por lo que no se puede concluir que ha habido un descenso claro en la fecundidad.

Sin embargo, la razón aumenta de 1.01 para la región indígena (Interior), a 1.10 en la región Ladino (Interior) a 1.18 en el departamento de Guatemala la cual apoya una conclusión tentativa de que solamente en el departamento de Guatemala es posible que exista un reciente descenso en la fecundidad. Un análisis más profundo sobre medidas de fecundidad está en preparación

(JE Anderson: Guatemala Contraceptive Prevalence Survey Demographic Measurement, Center for Disease Control, Atlanta, Georgia, November 1979)

En el cuadro 8, se presenta el porcentaje de hijos actualmente vivos. El porcentaje más alto en el departamento de Guatemala (90%) y más bajo para las mujeres indígenas en el Interior (79%). El número total de embarazos está incluido en el cuadro 9, que también muestra los abortos y mortinatos, como el porcentaje de embarazos totales, solamente el 5.4% de embarazos terminaron en aborto (incluyendo el espontáneo), y es obvio que aquí existe sub-información. La mujer indígena informó haber tenido un menor porcentaje de embarazos que terminaron en aborto, y un porcentaje más alto de mortinatos, lo cual indica que tal vez las mujeres indígenas están confundiendo abortos y mortinatos.

El último cuadro (cuadro 10) de esta sección muestra el porcentaje de mujeres lactando con intervalo en meses desde el último hijo nacido vivo. Después de 12 meses de edad (13-15 meses), es obvio que hay diferencias significativas entre regiones y por grupo étnico. Todavía 90% de las mujeres indígenas están lactando, comparado al 63% de ladinas en el Interior y solamente 37% de mujeres en el departamento de Guatemala.

2. Historia del Aborto

En el cuadro 11 se presenta el porcentaje de mujeres casadas o unidas, en edad fértil que informaron haber tenido un aborto espontáneo o inducido, según región y grupo étnico. Para el total de mujeres casadas un 13.2% informó haber tenido un aborto espontáneo o inducido. Este porcentaje fue de 20.4% para el departamento de Guatemala, 16.0% para el Interior del país, en el área ladina y el 6.8% para la indígena; como se menciona antes, probablemente existe sub-numeración de aborto, especialmente entre las mujeres indígenas. Pero si todos los abortos informados fueron espontáneos, el porcentaje sería más alto en el Interior, porque la paridad es más alta. Siendo que el porcentaje es más alto en Guatemala, se puede concluir que aunque no se sabe el nivel exacto, un mayor porcentaje de los abortos en Guatemala, son probablemente inducidos en comparación con el Interior.

El cuadro 12, muestra las características de las mujeres actualmente casadas o unidas, que informaron haber tenido un aborto espontáneo o inducido, según región y grupo étnico. El porcentaje de las mujeres que han tenido un aborto aumenta con la edad como era de esperarse, no hay una tendencia clara con la educación. Las mujeres que trabajan informaron un porcentaje más alto de abortos en el departamento de Guatemala.

El cuadro 13, muestra el porcentaje de mujeres casadas o unidas que informaron haber sufrido complicaciones después de haber tenido aborto, según región y grupo étnico.

Del total de mujeres para el departamento de Guatemala que tuvieron aborto, 79.0% recibieron atención médica y 68.2% tuvieron que ser hospitalizadas. Hay que tomar en cuenta que mientras en esta área están concentrados los servicios médicos y que el acceso a los mismos es bueno, en el área rural hay menos servicios médicos y el acceso a éstos no es fácil. De allí que de las informantes del sector ladino, 55.0% recibieron atención médica y 29.2% fueron hospitalizadas.

Las cifras correspondientes para las mujeres indígenas fueron 28.8% y 11.5%, respectivamente.

El cuadro 14, muestra el lugar de tratamiento para el total de mujeres que tuvieron complicaciones, después de un aborto espontáneo o inducido y que recibieron tratamiento, según área y grupo étnico. Se observa que más de la mitad (56.0%), fueron al hospital. En el departamento de Guatemala, el 71.6% de mujeres fueron tratadas en hospitales y 14.1% por médicos privados. En el Interior del país, 46.6% de mujeres en el área ladina recibieron atención hospitalaria, y el 23.9% de mujeres fueron atendidas por la partera del lugar. De las mujeres indígenas 53.3% fueron atendidas en hospitales y 26.7%, por partera.

B. PLANIFICACION FAMILIAR:

1. Uso actual de anticonceptivos

El cuadro 15, muestra el porcentaje de mujeres de 15-44 años de edad que actualmente están usando algún método anticonceptivo, (según varios denominadores), de todas las mujeres en edad fértil, 17.2% están protegidas por el uso de anticonceptivos, excluyendo las solteras. Si se restringe el denominador a mujeres actualmente casadas o en unión consensual (de hecho), 18.2% están protegidas, si se excluye a las mujeres casadas actualmente, embarazadas o sub-fecundas el 21.5% están protegidas.

El cuadro 16, muestra el porcentaje de mujeres en edad fértil actualmente casadas (unidas)*, que están usando anticonceptivos, según región, grupo étnico y método. Se encontró que para el país, 18.2% de dichas mujeres están usando actualmente anticonceptivos, siendo la esterilización lo más usado (6.4%), le sigue en importancia de uso el método oral (5.4%)

*En éste cuadro, y los subsiguientes, están incluidas las mujeres en unión consensual (unión de hecho), y las mujeres actualmente casadas.

En el departamento de Guatemala, el 40.5% están usando anticonceptivos, la esterilización es lo más usado 13.0%, y le sigue, en orden de uso, el método oral (pastilla), 9.5% y el ritmo 6.9%. Mientras que en el Interior del país, el 21.6% del grupo ladino, está usando anticonceptivos y de éste total, 7.7% se han esterilizado y el 6.6% están usando método oral (pastilla), en el grupo indígena, el 4.0% está usando anticonceptivos, el 2.2% usa el método oral (pastilla), mientras que el 1.6% ha usado la esterilización.

El cuadro 17, muestra el porcentaje de mujeres en edad fértil que actualmente usan anticonceptivos, por grupos de edad y método.

El método oral (pastilla), es el más usado entre las edades de 15 años hasta los 29, la esterilización es el método más usado, después de los 30 años de edad, o sea que muchas mujeres, ya en edades tardías piensan limitar el número de hijos y no en espaciar. La prevalencia más alta de uso actual de anticonceptivos se encuentra en mujeres de los grupos 25 a 39 años y, dentro de éstos, el máximo (27.7%), corresponde al grupo etario de 35-39 años.

El cuadro 13, muestra el porcentaje de mujeres casadas o unidas, en edad fértil, que usan algún anticonceptivo, según nivel educativo y método utilizado. Los datos indican que a medida que aumenta el nivel educativo, así aumenta el uso de anticonceptivos.

Para efectos de encontrar una correlación entre educación y uso de anticonceptivos, se formularon 4 grupos de niveles de educación. Se obtuvo el resultado siguiente: para el primer nivel (ninguna), solamente el 0.9% usaba algún anticonceptivo, para el segundo nivel (1-5 grado de primaria), el 22.6% lo usan; para el tercer nivel (6o. grado primaria), el 38.8%, y para el Cuarto nivel (secundaria y más), el 65.3%

El método que tiene más aceptación entre las mujeres que están usando anticonceptivos, es la esterilización, para 3 de los 4 niveles de educación.

Para las mujeres con educación secundaria y más, el método oral (pastilla), es el más usado, (18.1%), le sigue en orden de importancia de uso la esterilización (15.6%), el ritmo (13.3%), otros métodos (7.9%, y el condón (5.9%).

El cuadro 19, presenta el porcentaje de mujeres casadas o unidas, que actualmente usan algún anticonceptivo según estatus de trabajo y método usado. De las mujeres que manifestaron, que trabajaban fuera de casa, el 28.2% estaban usando algún anticonceptivo y de las mujeres que no trabajaban, solo el 16.6% usaba algún anticonceptivo. De las mujeres que trabajaban dentro de la casa, el 19.1% están usando algún anticonceptivo. En cuanto al tipo de método anticonceptivo usado, la esterilización y el método oral (pastilla), fueron los de mayor uso para todas las categorías.

El cuadro 20, presenta el porcentaje de mujeres en edad fértil, casadas o unidas, que actualmente usan algún anticonceptivo, según educación y otras características: grupo de edad, número de hijos vivos y estatus de trabajo.

Para cada característica, la educación aparece como un factor importante en el uso de anticonceptivos, de allí que las usuarias que tienen mayor nivel de educación, tienen más probabilidad de empezar a usar anticonceptivos a edades tempranas de su ciclo reproductivo. El factor paridad no tiene significancia en el uso de anticonceptivos, después del primer hijo, para el total o para mujeres sin ninguna educación. Sin embargo, hay aumento en el uso con la paridad para mujeres con educación. El estatus de trabajo controlado por el nivel educativo, no tiene significancia en el uso de anticonceptivos. Las mujeres sin empleo, con educación primaria completa, tienen una prevalencia de uso de anticonceptivos doble de las que tienen las mujeres empleadas con menos de primaria completa.

El cuadro 21, indica el porcentaje de mujeres que usan algún anticonceptivo por región, grupo étnico, edad, educación, estatus de trabajo.

Para el departamento de Guatemala, el 40.5% de mujeres, usan anticonceptivos, mientras que para el interior del país, ese porcentaje se reduce en el área ladina al 21.6%, y en el área indígena al 4.0%. El indígena tiene menos probabilidad de hacer uso de anticonceptivos, por su baja escolaridad y por sus patrones culturales que son determinantes.*

Para cualquier región o grupo étnico, el uso aumenta a medida que aumenta la educación. La variable estatus de trabajo, no es significativa en el uso de anticonceptivos, ni por área ni por grupo étnico. Las mujeres no empleadas del departamento de Guatemala tienen una prevalencia de uso más alta que las mujeres empleadas del Interior, lo que señala la importancia de la accesibilidad.

El cuadro 22, indica el perfil demográfico de las mujeres en edad fértil que están usando esterilización, según grupo de edad y número de hijos vivos. La distribución porcentual, indica que el segmento de mujeres que han usado la esterilización, están comprendidas entre los grupos de mayor edad, ya que su promedio de edad es de 34.4 años y el número promedio de hijos vivos es de 4.3 por mujer.

2. Fuente de Obtención de Anticonceptivos:

Los servicios de Planificación Familiar en el departamento de Guatemala, son prestados principalmente por APROFAM, Clínicas Independientes y Clínicas del Ministerio de Salud Pública.

En el interior del país, es el Ministerio de Salud Pública quien presta los servicios.

Sin embargo, el sistema logístico de Distribución de Anticonceptivos para todas las áreas de Salud del Interior del país está bajo la responsabilidad de APROFAM (Distribución Directa de Anticonceptivos)

* Perspectivas para la Planificación Familiar en Areas Rurales (APROFAM - Centro de Estudios de la Comunidad y la Familia - Universidad de Chicago 1978

Por medio de este sistema se ha logrado que cada Centro o Puesto de Salud, mantenga una existencia regular de anticonceptivos con el objeto de proporcionar el servicio en el momento que se solicite y que por ninguna circunstancia falte el material anticonceptivo.

La Campaña de Divulgación de APROFAM, por medio de la radio, orienta a la población blanco a solicitar los servicios de Planificación Familiar al Centro o Puesto de Salud más cercano a su domicilio.

El cuadro 23, indica el porcentaje de distribución de mujeres (usuarias), casadas o unidas en edad fértil, que actualmente están usando anticonceptivos, según fuente de obtención, por región y grupo étnico. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, es la fuente más usada (37.4%) en la adquisición de anticonceptivos, para el total de mujeres que actualmente están usando anticonceptivos, en las tres áreas tomadas. Así, para el departamento de Guatemala, el porcentaje es del 21.1%, para el interior del país, segmento poblacional ladino 49.2%; y para el segmento indígena 37.9%. En el país, las clínicas médicas privadas y las farmacias privadas son la fuente de servicios para un 25.8% o sea para 1 de cada 4 usuarias.

La Asociación Pro-Bienestar de la Familia (APROFAM), es fuente de servicios para el 11.5% del total de usuarias, pero es la segunda en importancia para el departamenteo de Guatemala (18.7%). El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), también es fuente de servicios importante (11.1%), en el departamento de Guatemala.

En el área indígena fué mencionada como fuente de servicio importante la Distribución Comunitaria Rural (10.3%)

El cuadro 24, presenta la distribución porcentual de mujeres casadas o unidas en edad fértil, que actualmente usan anticonceptivos según método usado y fuente del servicio. El 50.7% de las mujeres usan esterilización, el 48.3% de las mujeres usan método oral (pastilla) y el 50.7%, de las mujeres usan DIU (espiral), obtuvieron los servicios por medio del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, que es la fuente más importante que la población identifica.

En cuanto a la esterilización, en orden de importancia, le siguen la Asociación Pro-Bienestar de la Familia (18.3%), los médicos privados (15.0%) y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) (14.6%).

Las clínicas médicas privadas y APROFAM, también son fuente importante en cuanto a inserción de DIU (espiral). Las farmacias particulares son la segunda fuente más importante para el método oral (26.9%) y la fuente primaria para la obtención de condones .

3. Conocimientos sobre la disponibilidad de los servicios de P.F.

En el cuadro 25, se presentan los porcentajes correspondientes a las mujeres casadas que no están usando actualmente anticonceptivos, según razones para el no uso. Para el total de población estudiada, un poco más de un tercio de no usuarias (36.0%), informaron razones relacionadas con embarazo, fecundidad y actividad sexual; pero varía mucho por región y grupo étnico, con un máximo de 60.5% para el departamento de Guatemala, y un mínimo de 23.5% para indígenas del Interior. Entre otras razones, la más importante en el área indígena es la falta de conocimiento de métodos anticonceptivos (35.6%). Para mujeres del departamento de Guatemala y para las ladinas del Interior, el más importante es el miedo a efectos colaterales.

El cuadro 26, presenta el porcentaje de no usuarias, que desean un método anticonceptivo y conocen donde obtener el método.

Casi un tercio (31.8%), de mujeres entrevistadas, que no usan ningún anticonceptivo desean usarlo y de éste número de mujeres 42.9%, saben donde conseguir el método.

No hay gran diferencia por región y grupo étnico en el porcentaje de mujeres no usuarias, que desean usar algún método anticonceptivo pero entre ellas existe una gran diferencia en el porcentaje de las que saben donde obtener el método. En el departamento de Guatemala 63.9%, tienen conocimiento de esa disponibilidad, comparado con 50.7% de las mujeres ladinas en el Interior del país y solamente 29.7% de las indígenas.

En cuanto a edad, encontramos por lo menos que un tercio de las no usuarias, entre 25 y 39 años de edad desean usar algún método, pero la edad no tiene gran importancia en el conocimiento de la disponibilidad (varía entre 34.% y 46%)

En cuanto a nivel educativo, era de esperarse, a mayor educación, mayores conocimientos sobre obtención. Como se espera, las mujeres que han usado alguna vez anticonceptivos, saben en un alto porcentaje donde conseguirlos (78.8%), en comparación con las que nunca han usado (35.9%).

El cuadro 27, muestra el porcentaje de mujeres que no están usando actualmente anticonceptivos y que desean usar, según experiencias pre-vias en el uso de anticonceptivos, región y grupo étnico.

El deseo de usar anticonceptivos es más alto para mujeres con experiencia previa en uso anticonceptivos independiente de la región étnico.

El cuadro 28, muestra el porcentaje de mujeres que no usan anticonceptivos, pero que tienen conocimiento de su disponibilidad, clasificados según deseo que tienen de usar anticonceptivos, por región y grupo étnico.

El 36.7% de no usuarias tienen conocimiento de disponibilidad de anticeptivos. Para el departamento de Guatemala, 61.0% tiene conocimiento de la disponibilidad de anticonceptivos. Hay que tomar en cuenta que en ésta área, hay concentración de servicios e información, mientras que para el Interior del país, la disponibilidad de servicios es menor, de allí que para el área ladina el 44.1%, tiene el conocimiento, mientras que para el área indígena solo lo tiene el 22.8%

En este segmento de población hay que tomar en cuenta las diferentes lenguas y patrones culturales que pueden obstaculizar la comunicación. Para el grupo de mujeres que desean usar anticonceptivos, al departamento de Guatemala le correspondió el más alto conocimiento de disponibilidad con un 63.9%, ya que para el Interior del país, al sector ladino le correspondió el 49.6%, y al sector indígena el 29.5%

El grupo de mujeres que no desean hacer uso de anticonceptivos, tiene menos conocimientos sobre la disponibilidad, pero guardando siempre el mismo orden de importancia que las mujeres que sí desean usar anticonceptivos.

El cuadro 29, presenta mujeres en edad fértil actualmente casadas o unidas, que no están usando anticonceptivos, pero que desean usarlos según el método preferido y la fuente de obtención, que conocen. Según la distribución porcentual, el método de más alta preferencia es la pastilla, para las tres áreas de población: 1. Departamento de Guatemala (21.6%), Interior del país; 2. Ladinos (27.2%); 3. Indígena, (43.3%).

Para el país, el 33.2% prefiere la pastilla, mientras que a la inyección le corresponde la segunda preferencia (12.2%), a la esterilización la tercera (10.2%). La distribución porcentual muestra que la esterilización, es un método que tiene mucha preferencia en el departamento de Guatemala (16.6%), y en el grupo ladino del interior del país (15.1%); y se asocian con mujeres que desean limitar su familia. El porcentaje de mujeres que no saben qué método escoger, es consistente para las tres áreas que se estudiaron.

La fuente de obtención de anticonceptivos más conocida, es el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, principalmente para el Interior del país, donde la cobertura de servicios es mayor, y la población sabe que el Ministerio de Salud da servicios de Planificación Familiar; para el departamento de Guatemala, y en especial para el área metropolitana, la fuente de obtención de anticonceptivos más conocida es APROFAM (38.1%), mientras que en segundo lugar, un 17% mencionaron a los médicos y farmacias privadas.

4. Deseo de Embarazo

En el cuadro 30, se presenta información sobre planificación del último embarazo, según región, grupo étnico, paridad y educación las definiciones usadas aquí son las siguientes:

1. Embarazo planeado, deseado en el momento del embarazo.

2. Embarazo no previsto, corresponde a un embarazo que no había sido planeado, pero es un hijo deseado.
3. Embarazo no deseado, corresponde a un embarazo que sucede cuando la pareja ya tiene el número de hijos que desean y no desean más.

Las primeras 2 categorías juntas representan embarazos deseados y la combinación de las dos últimas corresponde a embarazos no planeados. En el país, el 19% de mujeres manifestó que no había planificado su último embarazo; de estos, el 12% declaró que no quería tener más hijos, y el 7% que deseaba espaciar los hijos, pero tuvo un embarazo no previsto. Para el departamento de Guatemala, 27% de los dos últimos embarazos no fueron planificados, comparado con el 23% entre ladinos en el Interior y sólomente 11% entre indígenas. Para el área indígena podemos comentar en terminos generales, que el bajo porcentaje de embarazos no planeados informados, talvés tiene relación con la dificultad de comprender conceptos que no son bien definidos en su lenguaje. En cuanto a la paridad en la medida que aumenta el número de hijos, aumenta el porcentaje de embarazos no deseados.

Al estudiar la población de mujeres informantes más detenidamente, en el cuadro 31, se ve el porcentaje de mujeres que manifestaron el deseo de un embarazo actual. El 13.7% del total de mujeres casadas de 15-44 años, estaban embarazadas y esta cifra varía entre 13% y 14% en todos los grupos estudiados. Un 22.9% de las mujeres desean un embarazo y el porcentaje de ellas que actualmente desean un embarazo varió desde el 14% en el departamento de Guatemala al 20% entre mujeres ladinas en el Interior, hasta 30% entre las mujeres indígenas. En cuanto a paridad se encontró que un 87% de mujeres informantes sin hijos, ya están embarazadas o quieren estarlo, demostrando que en nuestro medio social existe una **Presión** para que las mujeres recién casadas tengan pronto hijos. El porcentaje que no desea embarazo, tiene una correlación inversa con la paridad y la educación. Entre tanto el 20% de las mujeres con 3 hijos y el 16% con 4 o más hijos desean un embarazo, mostrando con ello que por lo menos 1/5 no está satisfecha con un número reducido de hijos, según la información que ellas dieron.

5. Demanda de Servicios de Esterilización

El cuadro 32, muestra para las mujeres que no quieren más hijos y están interesadas en la esterilización, el porcentaje que tiene conocimientos de la disponibilidad del servicio de esterilización. Según educación, región y grupo étnico. Del total de mujeres informantes se encontró que un poco más de la mitad (54.8%), tiene conocimiento de la disponibilidad del servicio o el lugar donde obtener la información. El 66.2% de las mujeres entrevistadas, con alguna educación manifestó que tiene el conocimiento del servicio, comparado con el 42% de mujeres sin ninguna educación.

Vemos que la diferencia en conocimientos es más importante según educación, así, de las mujeres con alguna educación, en el departamento de Guatemala, el 71.3% de mujeres, y para el Interior del país 62.7 para mujeres del grupo ladino en el Interior del país tenían algún conocimiento de la disponibilidad del servicio comparado con el 49.1% y 38.5% sin ninguna educación respectivamente.

El cuadro 33, muestra el porcentaje de mujeres casadas y unidas actualmente en edad fértil, que tiene interés en la esterilización y no desean tener más hijos, según fuente de obtención de servicio que conocen. La distribución porcentual, muestra que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, es la fuente conocida más importante de servicios de esterilización (71.4%), especialmente para mujeres ladinas en el Interior del país (90.8%). En el departamento de Guatemala, la Asociación Pro-Bienestar de la Familia (APROFAM), es la fuente conocida más importante para la adquisición de servicios de esterilización (43.4%).

El cuadro 34, muestra el porcentaje de mujeres, que aún no tienen los hijos que desean, pero que cuando los tengan, van a tener interés en la esterilización, según la fuente de obtención de la información o servicio. Los resultados son muy parecidos con el cuadro anterior, aunque hay más énfasis en APROFAM en el departamento de Guatemala y médicos privados para el grupo en el Interior. Los cuadros siguientes, 35 y 36, muestran la distribución porcentual de las diferentes razones que dieron las informantes que no desean tener más hijos,

- . pero que no están interesadas en la esterilización, según región, grupo étnico y nivel educativo respectivamente..

El 40.8% de las mujeres manifestó como razón fundamental el miedo (temor) a la operación quirúrgica. Este miedo disminuyó según su nivel educativo, a menor nivel educativo, mayor miedo o temor a la operación; y fué dado como razón por más de la mitad de indígenas (57%). Las otras razones que dieron en orden de importancia fueron, infertilidad (12.7%), no tienen consentimiento del esposo (11%), y prefiere otro método reversible (8%). Solamente el 6% manifestó no tener interés en la operación por razones religiosas.

6. Aceptación de los programas de Distribución Comunitaria de Anticonceptivos:

Este capítulo estudia el grado de conocimientos y aceptación (interés) del programa de Distribución Comunitaria de Anticonceptivos. (D.C.A.), de las usuarias o no usuarias.

El cuadro 37, presenta características que determinan el interés por el Programa de Distribución Comunitaria, por parte de todas las mujeres en edad fértil casadas o unidas actualmente (se excluye a mujeres que ya están esterilizadas.)

Del total de las mujeres entrevistadas, el 48.6% si está interesada en este tipo de programa. No hay mucha diferencia por área o grupo étnico en el porcentaje de mujeres sin interés, pero un alto porcentaje (32.9%) de mujeres indígenas del Interior del país, no pudo determinar si le interesaba o no el programa de Distribución Comunitaria. La edad no es característica importante que determine el interés por el Programa D.C., la educación si tiene correspondencia, pues a mayor nivel de escolaridad, más interés, pero el 28% de las mujeres sin ninguna educación no sabía si tiene interés y la mayoría de ésta categoría fué indígena. El estatus de empleo no determina el interés por el Programa de Distribución Comunitaria .

El cuadro 38, muestra el porcentaje de mujeres casadas o unidas actualmente en edad fértil, que tienen interés en el Programa de Distribución Comunitaria, para usuarias o no usuarias, y tiempo que utilizan para llegar a la fuente del servicio actual. Es importante no tar que para las mujeres que usan actualmente anticonceptivos, influye más el interés por el programa que en las mujeres que no los usan y que la accesibilidad de la fuente de obtención (distancia), no tiene mayor influencia como generalmente se piensa.

El cuadro 39, se refiere al porcentaje de mujeres en edad fértil casadas o unidas actualmente, que viven a menos de 30 minutos de una fuente de obtención de anticonceptivos. Es importante señalar que solamente el 48% de mujeres del área indígena necesitan menos de 30 minutos para llegar a una fuente de servicio.

El cuadro 40, presenta las razones por las cuales las mujeres casadas no están interesadas en un Programa de Distribución Comunitaria de Anticonceptivos, por área y grupo étnico. A las mujeres informantes que no estaban interesadas en hacer uso de los servicios del programa de Distribución Comunitaria, por ser dado por una persona de la comunidad, se le preguntó cuales eran las razones y las 3 más importantes fueron:

- No tener confianza en una persona que no es empleada directa de una institución de salud (médico, enfermera, T.S., Etc. (26.0%) especialmente en el departamento de Guatemala (37.0%)
- Razones religiosas (12.0%), expresadas especialmente por mujeres del Interior del país, tanto ladinas (10%), como indígenas (17%)
- Falta de confidencialidad (10.0%), pues no desean que una persona de su comunidad se entere de problemas íntimos.

El cuadro 41, presenta las razones por las cuales las mujeres casadas o unidas actualmente en edad fértil no están interesadas en el Programa de Distribución Comunitaria de Anticonceptivos, por educación. Para las mujeres con menor nivel educativo (sin ninguna educación), la razón más importante para no hacer uso de los servicios del programa, es la falta de confianza en una persona que no es empleada directa de una institución de salud.

razones religiosas, falta de confidencialidad y "no le gusta, o no quiere", sin explicar la razón principal. Para las mujeres con primaria completa o más, la razón principal fué la falta de confianza; en el personal que no es de salud.

7. . Características de las mujeres que necesitan los servicios de Planificación Familiar.

El cuadro 42, presenta una estimación del porcentaje de mujeres de 15-44 años de edad, que necesitan de los servicios de Planificación Familiar. La definición de "necesita servicios", incluye mujeres que no están actualmente embarazadas y actualmente no desean un embarazo, y que además usan métodos no eficaces (ducha vaginal), o no usan ningún método, por razones que no tienen nada que ver con el embarazo, sub-fecundidad o actividad sexual. Usando ésta definición el 26.8% de todas las mujeres necesitan servicios de Planificación Familiar, lo que significa en términos absolutos, unas 375,000 mujeres

En términos generales, del área indígena, 37.4% necesitan servicios de anticoncepción para evitar embarazos no planificados, en comparación con el 25.0% del área ladina y sólomente el 13.3% del departamento de Guatemala, las mujeres de 25 años y más están necesitando de los servicios de Planificación Familiar, especialmente en el área indígena, donde casi la mitad del total los necesitan.

Según el estado civil, 35.2% (más de un tercio), de las mujeres actualmente casadas necesitan de los servicios de Planificación Familiar. También la necesitan el 13.8% que estuvieron casadas anteriormente, y casi el 5.7% de las que nunca han estado casadas o unidas.

En el mismo cuadro, según la paridad, 52.8% de las mujeres que han tenido más de 6 hijos están necesitando los servicios de Planificación Familiar. Es importante hacer notar que un buen porcentaje de las mujeres que solamente tienen 1 a 2 hijos, necesitan de los servicios de Planificación Familiar pensando en espaciar sus hijos.

En este mismo cuadro, aparece también la educación de la mujer según área de residencia. A medida que disminuye la educación así aumenta la necesidad de los servicios de Planificación Familiar, prueba elocuente es que el 38.0% del total corresponde a las mujeres sin ninguna educación. Siendo aún mayor en el Interior del país, mientras que las que han cursado primaria completa solo constituye el 6.5%.

El cuadro 43, muestra la distribución porcentual de mujeres de 15-44 años de edad que necesitan de los servicios de Planificación Familiar, se nota que casi 90% viven en el Interior del país con una proporción similar entre mujeres ladinas e indígenas. Solamente 10% residen en el departamento de Guatemala. La mayoría de mujeres están actualmente casacas o unidas y 25% de las mújeres que tienen 6 ó más hijos necesitan servicios; es una población blanco favorable para adoptar métodos definitivos.

C. CONCLUSIONES

1. La fecundidad es todavía alta en Guatemala, con una tasa bruta de nacimientos estimada de 44 por 1,000. La tasa es más baja en el departamento de Guatemala (34 por 1,000), donde los hallazgos de la encuesta apoyan la conclusión de que la fecundidad ha declinado recientemente. En el Interior del país, no hay gran diferencia en la fecundidad entre ladinos (45 por 1,000) e indígenas (47 por 1,000), aunque el uso de anticonceptivos es muy diferente entre los dos grupos. Sin embargo, un análisis más detallado sobre fecundidad (J.E. Anderson: Determinants of Fertility in Guatemala, Center for Disease Control, Atlanta, Georgia, U.S.A.), muestra que la prevalencia de la lactancia es mucho más alta y de duración más larga entre las mujeres indígenas, después de una año de edad. Si las mujeres indígenas tuvieran el mismo nivel de lactación que las ladinas, tendrían una tasa global de fecundidad 22% más alta que la tasa de las ladinas, en lugar de ser aproximadamente igual.
2. El 19% de las mujeres entrevistadas manifestaron que no habían planificado el último embarazo, y un tercio (34%) de las mujeres con 6 ó más hijos tienen embarazos no planeados uno de cada cuatro de los embarazos de mujeres en el área ladina, fueron no planeados. De los anteriores resultados se puede estimar que en 1975, 45,000 mujeres tuvieron en el país embarazos no planificados y de estos 28,000 no fueron deseados. Es preocupante el alto porcentaje de mujeres que tienen embarazos no deseados o planeados.
3. De las mujeres entrevistadas, casadas o unidas de 15-44 años, un 48% expresó no querer tener más hijos. De ellas aproximadamente el 55% tiene interés en métodos quirúrgicos, pero solamente el 65% y 52% de las mismas en el departamento de Guatemala y el Interior respectivamente, sabe donde obtener estos sabe donde obtener estos servicios. De este mismo grupo, más de 70% de las que tienen tres o más hijos, ya no querían tener otro hijo.

La falta de conocimiento de disponibilidad de servicios quirúrgicos representa una barrera para la obtención de servicios, estos deben incrementarse a la población, con una adecuada campaña de comunicación masiva en el departamento de Guatemala, así como también en las áreas rurales.

4. La razón principal para no aceptar métodos quirúrgicos por parte de las mujeres que ya tienen todos los hijos que quieren, y que no desean tener más hijos, es el temor a la intervención quirúrgica (41.% a nivel nacional). Además, esta razón fué dada por 57% de las mujeres indígenas en contraste con el 29% de ladinas. Es recomendable tener en cuenta esta barrera para futuras campañas de información y educación orientadas a eliminar los temores a la intervención. Uno de los medios que hay que tener presente, y que se considera efectivo, es el de la usuaria satisfecha.

5. Las complicaciones del aborto espontáneo o inducido siguen siendo un problema de salud pública en el país.
 En la encuesta, 13% de las mujeres casadas o unidas manifestaron que tuvieron por lo menos un aborto espontáneo o inducido, entre ladinas, este porcentaje resultó de un 18%. El 57% de las mujeres con historia de aborto tuvieron complicaciones necesitando atención médica después del aborto, y el 64% de ellas fueron hospitalizadas. Aunque en total 37% de las mujeres con aborto fueron hospitalizadas a nivel nacional, en el departamento de Guatemala, ese porcentaje fué de 58% en comparación con un 29% y 12% en mujeres ladinas é indígenas, respectivamente, con historia de aborto. Queda demostrado una vez más que la falta de accesibilidad a servicios médicos es más notoria en las áreas rurales.

6. En el uso de anticonceptivos entre mujeres casadas o unidas de 15-44 años, casi una de cada 5 (18%) mujeres son usuarias activas. La prevalencia en el departamento de Guatemala, donde hay más disponibilidad de servicios, alcanza el 40% con el 22% para mujeres ladinas.

y 4% para indígenas en el Interior.

La cobertura global actual para el Interior es 14% en comparación de una prevalencia estimada de 7% en el Interior en 1975. Este aumento se asocia en tiempo, con el inicio del programa de Distribución Directa en el cual la disponibilidad de anticonceptivos ha aumentado de 126 a 569 centros y puestos de salud en los últimos años.

7. Casi 3/4 (72%) de las usuarias activas están usando métodos eficaces (esterilización, pastillas y DIU) siendo la esterilización el más usado (1/3 de todas las usuarias activas) talvés por la falta de disponibilidad de métodos reversibles. El nivel educativo se ha considerado como uno de los más importantes factores que determinan el uso de anticonceptivos a nivel nacional. Así el 65% de las mujeres con 7 años o más de escolaridad (secundaria) usan anticonceptivos, en comparación con el 23% de usuarias con menos de 6 años de escolaridad y sólomente 7% de usuarias sin ninguna educación. Sin embargo, en el departamento de Guatemala, donde hay más disponibilidad y accesibilidad de servicios 37% de mujeres con menos de 6 años de escolaridad y 17% de mujeres sin ninguna educación usan anticonceptivos.
8. El 32% de mujeres que no usan métodos informaron que quieren usar un método anticonceptivo. El 10% de estas mujeres que no usan, y que desean usar anticonceptivos expresaron su preferencia por métodos irreversibles, y un 33% manifestó su preferencia por métodos orales. Sin embargo, sólomente el 43% saben donde se pueden obtener servicios de anticoncepción. Este conocimiento de disponibilidad alcanza el 64% en el departamento de Guatemala, pero baja en el Interior donde el 51% de mujeres ladinas y sólomente el 30% de mujeres indígenas saben donde pueden obtener servicios. Además 1/3 (38%) de mujeres ladinas, más de la mitad (52%) de indígenas en el Interior, viven a una distancia de más de 30 minutos de una fuente conocida de servicios

lo cual indica que existen problemas derivados de la falta de accesibilidad a los servicios y plantea la necesidad de incrementar los programas de Distribución Comunitaria de Anticonceptivos, así como la facilidad de transporte para las personas que solicitan métodos irreversibles. Casi la mitad (46%) de las mujeres en el Interior, manifestaron que tendrían interés en programas de Distribución Comunitaria de Anticonceptivos.

9. El 12% de las mujeres que no usan métodos anticonceptivos, manifestaron que no los usan por temor a efectos colaterales o miedo a los mismos. Probablemente, este hecho se debe a la poca o mala información. Es recomendable tomar en cuenta ésta circunstancia para futuros programas de información, educación y comunicación. Un desafío mayor, es el hecho de que 36% de las mujeres indígenas no usan anticonceptivos, manifestaron que no tienen conocimiento de métodos anticonceptivos. Sólomente un 5% de las mujeres que no usan métodos expresaron razones religiosas, y menos de 4% de las no usuarias dieron como razón el hecho de que el marido no les permite el uso de anticeptivos.

10. En resumen, se puede estimar que en Guatemala, las mujeres casadas o unidas de 15 - 44 años, que están usando anticonceptivos, llegan a 190,000 (usuarias activas), como se observa, en la sección B-7, de éste informe "Características de las mujeres que necesitan los servicios de Planificación Familiar". Existe una cantidad adicional de mujeres no usuarias, que tienen la necesidad de servicios para evitar embarazos no planificados y la gran mayoría (90%) de ellas residen en el Interior del país. El 52% de las 375,000, equivalentes a 195,000 mujeres, tienen 4 ó más hijos y serían candidatas para adoptar métodos permanentes del control de la fecundidad.

Si todas las mujeres recibieran servicios para evitar un embarazo no planificado, aproximadamente el 53% de mujeres casadas estarían usando anticonceptivos, y la tasa bruta de natalidad decaería, como efecto secundario, hasta 27 a 29 por 1,000 una decli-nación de más o menos 36% de la tasa actual.

C U A D R O #1

Estatus de las mujeres entrevistadas
por área y grupo étnico
Encuesta sobre Prevalencia de Uso de Anticonceptivos
Guatemala, 1978

<u>Selección de hogares</u>	<u>Total</u>	<u>Guatemala</u>	<u>Interior</u>	
			<u>Ladino</u>	<u>Indígena</u>
Total de hogares				
Número	<u>3.607</u>	<u>1.061</u>	<u>1.425</u>	<u>1.121</u>
Porcentaje	<u>100.0</u>	<u>100.0</u>	<u>100.0</u>	<u>100.0</u>
Informantes elegibles identificados	79.4	77.5	79.1	81.7
Informantes no elegibles identificados	12.3	14.4	13.0	9.5
Casa deshabitada	3.9	4.1	4.8	2.7
Se negó a responder	0.9	1.7	0.5	0.6
No se le encontró después de 3 visitas	1.6	1.7	2.1	0.7
Otros	1.9	0.6	0.5	4.8
 <u>Selección Individual</u>				
Total posible de informantes*				
Número	2,953	858	1,164	931
Porcentaje	100.0	100.0	100.0	100.0
Entrevista completa	90.9	86.7	92.3	93.0
No se le encontró después de 3 visitas	1.9	2.1	2.6	0.9
Se negó a responder la informante	3.2	5.5	1.4	3.1
Informantes no en casa	4.0	5.7	3.7	3.0

*Incluye hogares, con informante elegible identificada, más informantes que se negaron a responder, o en los que no se encontró a la informante después de 3 visitas.

C U A D R O #4

Distribución porcentual de nacimientos en el año
más reciente por edad de la madre
Encuesta de 1978 y datos de estadísticas vitales de 1974
Guatemala, 1978

A. Nacimientos, encuesta 1978

<u>Edad</u>	<u>Total</u>	<u>Depto. de Guatemala</u>	<u>Interior</u>	
			<u>Ladino</u>	<u>Indígena</u>
15 - 19 años	17.3	13.2	16.3	20.2
20 - 24 años	28.2	31.2	26.4	29.4
25 - 29 años	25.4	29.7	25.1	24.2
30 - 34 años	16.8	16.9	16.9	16.7
35 - 39 años	9.5	8.3	12.6	6.0
40 - 44 años	2.5	0.7	2.7	2.7
45 - 49 años	<u>0.3</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>	<u>0.8</u>
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0

B. Nacimientos, Estadísticas Vitales 1974

15 - 19 años	16.8	15.6	16.9	17.4
20 - 24 años	30.5	33.0	29.3	31.2
25 - 29 años	22.4	24.7	21.9	21.9
30 - 34 años	15.1	14.6	15.6	14.6
35 - 39 años	10.5	8.2	11.3	10.4
40 - 44 años	4.0	3.4	4.2	3.9
45 - 49 años	<u>0.7</u>	<u>0.5</u>	<u>0.8</u>	<u>0.6</u>
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0

C U A D R O #5

Promedio de hijos nacidos vivos
 por edad de la madre, área y grupo étnico
 Encuesta de 1978 y Censo de 1973
 Guatemala, 1978

<u>Edad de la Madre</u>		<u>Total</u>	<u>Depto. de Guatemala</u>	<u>Interior</u>	
<u>Encuesta 1978</u>				<u>Ladino</u>	<u>Indígena</u>
15 - 19	años	0.4	0.2	0.4	0.5
20 - 24	años	1.7	1.1	1.7	1.9
25 - 29	años	3.2	2.4	3.4	3.6
30 - 34	años	4.6	3.6	4.7	5.2
35 - 39	años	5.6	4.0	6.0	5.9
40 - 44	años	6.5	5.8	7.3	6.2
45 - 49	años	<u>6.8</u>	<u>4.5</u>	<u>7.4</u>	<u>7.2</u>
15 - 49	años	3.4	2.4	3.6	3.6

<u>Censo 1973</u>		<u>Total</u>	<u>Urbano</u>	<u>Rural</u>	
				<u>Ladino</u>	<u>Indígena</u>
15 - 19	años	0.3	0.2	0.4	0.4
20 - 24	años	1.6	1.2	1.8	1.8
25 - 29	años	3.1	2.5	3.6	3.4
30 - 34	años	4.5	3.8	5.1	4.7
35 - 39	años	5.6	4.8	6.3	5.7
40 - 44	años	6.3	5.5	7.1	6.5
45 - 49	años	<u>6.5</u>	<u>5.5</u>	<u>7.5</u>	<u>6.9</u>
15 - 49	años	3.1	2.6	3.6	3.4

C U A D R O #6

Estimaciones de la tasa general de fecundidad (TGF)
 Tasa global de fecundidad (TGF) y la tasa bruta
 de natalidad (TBN) por área y grupo étnico
 Encuesta de 1978
 Guatemala 1978

	<u>Total</u>	<u>Depto. de Guatemala</u>	<u>Interior</u>	
			<u>Área Ladina</u>	<u>Área Indígena</u>
T G F' (por 1,000 mujeres 15-44 años de edad)	208	140	224	229
T G F (por mujeres)	5.9	3.8	6.5	6.4
T B N (por 1,000 antes)	44.3	34.0	44.6	46.7
95% intervalo de confianza TBN	41.4-47.2	28.9-39.1	40.1-49.1	41.3-52.1

C U A D R O #7

Promedio de hijos nacidos vivos por edad observada (Pi) y esperada (Fi), según las tasas de nacimiento, en el año anterior. Encuesta de 1978
Guatemala 1978

Edad de Informantes	Total			Depto. de Guatemala			Interior					
							Ladino			Indígena		
	Pi	Fi	Pi/Fi	Pi	Fi	Pi/Fi	Pi	Fi	Pi/Fi	Pi	Fi	Pi/Fi
15 - 19	.38	.32	1.20	.16	.11	1.55	.39	.35	1.12	.51	.42	1.23
20 - 24	1.66	1.46	1.13	.98	.89	1.10	1.76	1.50	1.18	1.94	1.77	1.10
25 - 29	3.16	2.97	1.07	2.23	2.01	1.11	3.37	3.09	1.09	3.51	3.41	1.03
30 - 34	4.48	4.30	1.04	3.31	2.93	1.13	4.76	4.57	1.04	4.83	4.83	1.00
35 - 39	5.64	5.26	1.07	4.10	3.50	1.17	6.15	5.69	1.08	5.75	5.78	.99
40 - 44	6.25	5.75	1.09	5.10	3.75	1.36	7.08	6.32	1.12	5.89	6.23	.95
45 - 49	6.43	5.89	1.09	4.67	3.80	1.23	7.13	6.46	1.10	6.43	6.42	1.00
Promedio de razones Pi/Fi*			1.08			1.18			1.10			1.01

*El Promedio de razones (Pi/Fi) excluye mujeres de 15 a 19 años de edad.

C U A D R O #8

Porcentaje de hijos nacidos vivos que sobreviven
 por área y grupo étnico, Encuesta de 1978
 Guatemala, 1978

<u>Edad</u>	<u>Total</u>	<u>Depto. de Guatemala</u>	<u>Interior</u>	
			<u>Ladino</u>	<u>Indígena</u>
15 - 19 años	.89	.92	.85	.91
20 - 24 años	.89	.95	.89	.88
25 - 29 años	.85	.90	.84	.85
30 - 34 años	.85	.89	.85	.84
35 - 39 años	.81	.92	.81	.77
40 - 44 años	.78	.91	.77	.73
45 - 49 años	<u>.77</u>	<u>.85</u>	<u>.80</u>	<u>.71</u>
15 - 49 años	.82	.90	.82	.79

C U A D R O #9

Número total de embarazos informados
 abortos reportados y nacidos muertos informados
 Porcentaje de embarazos por edad, área y grupo étnico
 Encuesta de 1978
 Guatemala 1978

Total de embarazos Informados

	<u>Total</u>	<u>Depto. de Guatemala</u>	<u>Interior</u>	
			<u>Ladino</u>	<u>Indígena</u>
15 - 19 años	0.5	0.3	0.5	0.6
20 - 24 años	2.0	1.3	2.0	2.2
25 - 29 años	3.6	2.7	3.7	4.1
30 - 34 años	5.1	4.0	5.2	5.5
35 - 39 años	6.2	4.5	6.6	6.5
40 - 44 años	7.1	6.5	7.9	6.6
45 - 49 años	7.3	5.0	8.0	7.5
15 - 49 años	3.7	2.8	4.0	3.9

Abortos informados (espontáneos o inducidos)
Como porcentaje de embarazos

15 - 19 años	4.4	3.3	7.0	1.6
20 - 24 años	4.5	6.5	6.8	1.4
25 - 29 años	3.8	6.4	3.7	2.9
30 - 34 años	4.8	6.6	6.7	1.8
35 - 39 años	6.9	9.7	6.9	5.5
40 - 44 años	5.8	10.3	6.7	2.8
45 - 49 años	5.9	10.1	7.9	1.1
15 - 49 años	5.4	8.3	6.5	2.6

Nacidos muertos informados como porcentaje de embarazos

15 - 19 años	1.1	1.7	1.3	0.8
20 - 24 años	1.1	1.8	1.0	1.0
25 - 29 años	2.7	1.3	2.2	4.0
30 - 34 años	2.9	2.8	2.2	3.8
35 - 39 años	1.7	1.2	1.6	2.3
40 - 44 años	2.6	1.9	1.8	3.8
45 - 49 años	1.2	0.6	0.2	2.9
15 - 49 años	2.1	1.6	1.5	3.0

C U A D R O #10

Porcentaje de mujeres
actualmente lactando
por número de meses, desde el último nacimiento vivo
Guatemala 1978

<u>Duración</u> (en meses)	<u>Total</u>	<u>Depto. de</u> <u>Guatemala</u>	<u>Interior</u>		<u>Número de Casos</u>			
			<u>Ladino</u>	<u>Indígena</u>	<u>Total</u>	<u>Guatemala</u>	<u>Ladino</u>	<u>Indígena</u>
0 - 3	89	88	90	89	171	31	72	68
4 - 6	84	68	80	91	142	27	64	51
5 - 9	85	78	84	88	144	32	59	53
10 - 12	74	48	76	86	136	33	61	42
13 - 15	70	37	63	90	146	30	60	56
16 - 18	65	31	61	85	127	27	55	45
19 - 21	48	41	33	58	110	21	29	60
22 - 24	58	--	--	--	40	--	--	--

C U A D R O #11

Porcentaje de mujeres de 15 a 44 años de edad
que han tenido por lo menos un aborto espontáneo o inducido
por estado civil, área y grupo étnico
Guatemala, 1978

<u>Estado Civil</u>	<u>Total</u>	<u>Depto. de Guatemala</u>	<u>Interior</u>	
			<u>Ladino</u>	<u>Indígena</u>
Casada	13.2 (1,915)	20.4 (473)	16.0 (767)	6.8 (675)
Separada/viuda/div.	16.9 (180)	18.1 (61)	23.0 (74)	3.9 (45)
Soltera	0.1 (383)	0.3 (154)	0.0 (143)	0.0 (86)
TOTAL	10.6 (2,478)	13.6 (688)	12.9 (984)	5.6 (806)

NOTA: Los números entre paréntesis corresponden al número de casos no ponderados.

C U A D R O #12

Porcentaje de mujeres actualmente casadas
de 15 a 44 años de edad, un aborto
espontáneo o inducido por área, grupo étnico y edad
Educación y estatus de empleo
(proporción que ha tenido por lo menos un aborto)
Guatemala, 1978

	<u>Total</u>	<u>Depto. de Guatemala</u>	<u>Interior</u>	
			<u>Ladino</u>	<u>Indígena</u>
<u>Edad:</u>				
15 - 19 años	4.2 (205)	5.7 (34)	6.3 (81)	1.9 (90)
20 - 24 años	8.4 (429)	12.3 (101)	12.2 (160)	3.3 (168)
25 - 29 años	11.6 (427)	17.5 (115)	12.0 (177)	7.9 (135)
30 - 34 años	14.6 (362)	17.7 (102)	20.0 (136)	6.7 (124)
35 - 39 años	10.2 (307)	27.8 (80)	19.5 (143)	15.9 (84)
40 - 44 años	23.0 (185)	42.1 (41)	29.3 (68)	9.0 (76)
<u>Educación de la Mujer</u>				
Ninguno	11.4 (1,031)	14.0 (105)	18.3 (345)	6.8 (581)
Primaria incomp.	17.6 (529)	32.2 (140)	15.8 (304)	8.0 (85)
Primaria comp.	12.5 (355)	16.0 (218)	9.5 (116)	* (11)
<u>Status de Empleo</u>				
Actualmente empleado	14.9 (462)	25.9 (143)	16.2 (160)	7.0 (159)
No empleado	12.7 (1,453)	17.9 (330)	15.9 (605)	6.7 (518)
TOTAL	13.2 (1,915)	20.4 (473)	16.0 (765)	6.8 (677)

NOTA: Los números entre paréntesis corresponden al número de casos no ponderados.

* N<25

C U A D R O #13

Complicaciones después del aborto más reciente para
 mujeres de 15 a 44 años de edad con una
 historia de aborto por área y grupo étnico
 Guatemala, 1978

<u>Area, grupo étnico</u>	<u>Porcentaje que recibió atención</u>	<u>Porcentaje de Hospitalizados</u>	<u>Número de casos no ponderados</u>
Total	56.7	36.5	(300)
Depto. de Guatemala	79.0	68.2	(109)
Interior:			
Ladino	55.0	29.2	(145)
Indígena	28.8	11.5	(46)

C U A D R O #14.

Lugar de tratamiento para mujeres de 15 a 44 años de edad,
con complicaciones después del aborto más reciente, por área
y grupo étnico

(Distribución Porcentual)
Guatemala, 1978)

<u>Lugar de tratamiento</u>	<u>Total</u>	<u>Depto. de Guatemala</u>	<u>Interior</u>	
			<u>Ladino</u>	<u>Indígena</u>
Hospital	56.4	71.6	46.6	53.3
Partera	17.9	7.2	23.9	26.7
Doctor Privado	13.2	14.1	16.8	0.0
Centro de Salud	4.5	2.1	3.4	20.0
Familia	3.7	0.0	6.8	0.0
Otros	4.3	5.1	4.5	0.0
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0
Número de mujeres (número de casos no ponderados)	(180)	(87)	(80)	(13)

C U A D R O #15

Porcentaje de mujeres de 15 a 44 años de edad que actualmente usan anticonceptivos para varios denominadores
Guatemala, 1978

<u>Denominador Usado</u>	<u>Porcentaje de mujeres</u>	<u>Número de mujeres</u>
Total de mujeres	13.4	2,478
Mujeres Ca/Un/Sep/Viu/Div.	17.2	2,095
Mujeres actualmente casadas o unidas	18.2	1,915
Mujeres casadas o unidas actualmente "expuestas"*	21.5	1,609

*Excluye sub-fecundidad y mujeres embarazadas actualmente.

C U A D R O #16

Porcentaje de mujeres actualmente casadas de 15 a 44* años de edad, que actualmente usan anticonceptivos, por área, grupo étnico y método Guatemala, 1978

<u>Método</u>	<u>Total</u>	<u>Depto. de Guatemala</u>	<u>Interior</u>	
			<u>Ladino</u>	<u>Indígena</u>
<u>Usan Actualmente:</u>	<u>18.2</u>	<u>40.5</u>	<u>21.6</u>	<u>4.0</u>
Esterilización	6.4	13.0	7.7	1.6
Orales	5.4	9.5	6.6	2.2
Ritmo	2.6	6.9	2.3	1.1
DIU	1.3	4.6	0.6	0.7
Condón	0.7	2.4	0.7	0.0
Otros**	1.7	4.1	2.1	0.3
<u>No usan Actualmente:</u>	<u>81.8</u>	<u>59.5</u>	<u>80.1</u>	<u>94.1</u>
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0
Número de casos (no ponderados)	1,915	473	765	677

*En ésta tabla y en las siguientes, las mujeres que viven en unión consensual (unión de hecho) estable, están incluidas como actualmente casadas.

**Otros métodos, incluyen inyección, espuma, jaleas tabletas, diafragma y retiro.

C U A D R O #17

Porcentaje de mujeres actualmente casadas
de 15 a 49 años, que usan anticonceptivos
por grupo de edad y método
Guatemala, 1978

Uso actual y Método	Porcentaje de mujeres por edad							
	Total	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49
<u>Usan Actualmente</u>	<u>19.4</u>	<u>4.8</u>	<u>12.7</u>	<u>20.9</u>	<u>23.5</u>	<u>27.7</u>	<u>14.5</u>	<u>13.4</u>
Esterilización	6.8	0.0	1.6	4.0	10.4	13.6	8.8	9.0
Orales	5.5	1.1	6.3	8.2	7.0	4.4	1.8	0.5
Ritmo	2.7	3.0	1.2	2.7	2.2	6.1	0.8	0.3
DIU	1.7	0.2	1.1	1.9	1.9	0.9	1.3	0.3
Condón	0.9	0.2	0.3	1.5	1.3	0.5	0.0	2.3
Otros*	1.7	0.2	2.2	2.6	0.6	2.2	1.8	1.0
<u>No usan Actualmente</u>	<u>80.6</u>	<u>95.2</u>	<u>87.3</u>	<u>79.1</u>	<u>76.5</u>	<u>72.3</u>	<u>85.5</u>	<u>86.6</u>
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Número de casos	2,077**	205	429	427	362	307	185	161

*Otros métodos incluyen inyección, espuma, jalea, tabletas, diafragma y retiro.

**Una mujer que no tiene dato de edad se excluye.

C U A D R O #18

Porcentaje de mujeres actualmente casadas de 15 a 44 años de edad
que usan anticonceptivos por educación y método
Guatemala, 1978

<u>Uso Actual y método</u>	<u>Educación</u>			
	<u>Nin- quino</u>	<u>Primaria Incompleta</u>	<u>Primaria Completa</u>	<u>Secundaria ó más</u>
<u>Usa Actualmente</u>	<u>6.9</u>	<u>22.6</u>	<u>38.8</u>	<u>65.3</u>
Esterilización	2.6	8.4	13.4	15.6
Orales	2.3	7.4	9.0	18.1
Ritmo	0.9	2.9	4.4	13.3
DIU	0.6	1.5	3.1	4.5
Condón	0.0	1.0	0.3	5.9
Otros*	0.5	1.4	5.5	7.9
<u>No usan Actualmente</u>	<u>93.1</u>	<u>77.4</u>	<u>61.2</u>	<u>34.7</u>
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0
Número de casos (no ponderados)	(1,031)	(529)	(179)	(176)

* Otros métodos incluye inyección, espuma jalea, tableta,
diafragma y retiro.

C U A D R O #19

Porcentaje de mujeres actualmente casadas de 15 a 44 años de edad que usan anticonceptivos por estatus actual de empleo y método Guatemala, 1978

<u>Uso actual y método</u>	<u>Empleado</u>		<u>Sin empleo</u>
	<u>Fuera de la casa</u>	<u>Dentro de la casa</u>	
<u>Usa Actualmente</u>	<u>28.2</u>	<u>19.1</u>	<u>16.6</u>
Esterilización	6.8	6.1	6.2
Orales	8.0	5.7	5.0
Ritmo	6.8	2.7	2.1
DIU	2.7	3.0	0.9
Condón	1.3	0.0	0.8
Otros*	2.6	1.6	1.6
<u>No usa Actualmente</u>	<u>71.8</u>	<u>80.9</u>	<u>83.4</u>
TOTAL	100.0	100.0	100.0
Número de casos (Promedio)	(213)	(246)	(1,453)

* Otros métodos incluyen inyección, espuma, jalea, tabletas, diafragma y retiro.

C U A D R O #20

Porcentaje de mujeres actualmente casadas
de 15 a 44 años de edad, que usan anticonceptivos
por educación, grupo de edad, número de hijos vivos y
estatus actual de empleo
Guatemala, 1978

<u>Categorías</u>	<u>Total</u>	<u>Educación de la Mujer</u>		
		<u>Ninguno</u>	<u>Primaria Incompleta</u>	<u>Primaria Completa+</u>
TOTAL	18.2 (1,915)	6.9 (1,031)	22.6 (529)	51.4 (355)
<u>Edad</u>				
15 - 19	4.8 (205)	0.8 (113)	2.6 (57)	22.5 (35)
20 - 24	12.7 (429)	4.4 (210)	9.5 (129)	42.5 (90)
25 - 29	21.0 (427)	9.7 (222)	23.3 (120)	53.4 (85)
30 - 34	23.5 (362)	6.5 (189)	34.8 (103)	62.0 (70)
35 - 39	27.7 (307)	10.3 (170)	44.9 (80)	65.5 (57)
40 -44	14.5 (185)	8.2 (127)	16.2 (40)	* (18)
<u>Hijos vivos</u>				
0 - 1	10.8 (448)	2.0 (207)	6.1 (118)	33.8 (123)
2 - 3	21.3 (710)	7.0 (349)	22.8 (202)	58.3 (159)
4 - 5	20.4 (463)	9.2 (280)	28.0 (127)	69.0 (56)
6 ó más	18.8 (294)	8.7 (195)	36.7 (82)	* (17)
<u>Actualmente empleado</u>				
Empleado	23.3 (462)	8.4 (220)	26.7 (123)	53.3 (119)
No empleado	16.6 (1,453)	6.5 (811)	21.4 (406)	50.4 (236)

Los número entre paréntesis corresponde al número de casos no ponderados (N)

*N<25

C U A D R O #21

Porcentaje de mujeres actualmente casadas, de 15 a 44 años de edad, que usan anticonceptivos por área, grupo étnico y por grupo de edad, Educación y estatus actual de empleo Guatemala, 1978

<u>Categorías</u>	<u>Total</u>	<u>Depto. de Guatemala</u>	<u>Ladino</u>	<u>Indígena</u>
TOTAL	18.2 (1,915)	40.5 (473)	21.6 (767)	4.0 (675)
<u>Edad</u>				
15 - 19 años	4.8 (205)	15.3 (34)	5.2 (81)	1.9 (90)
20 - 24 años	12.7 (429)	29.1 (101)	16.3 (160)	3.3 (168)
25 - 29 años	21.0 (427)	38.7 (115)	24.1 (177)	6.4 (135)
30 - 34 años	23.5 (362)	53.2 (102)	27.7 (136)	3.7 (124)
35 - 39 años	27.7 (307)	54.7 (80)	29.6 (143)	4.6 (84)
40 - 44 años	14.5 (185)	32.1 (41)	18.3 (68)	3.4 (76)
<u>Educación</u>				
Ninguno	6.9 (1,031)	17.0 (105)	11.2 (345)	3.0 (581)
Primaria incompleta	22.6 (529)	37.1 (140)	22.1 (304)	8.0 (85)
Primaria completa y más	51.4 (355)	54.3 (228)	50.4 (116)	* (11)
<u>Status de empleo</u>				
Actualmente empleado	23.3 (462)	44.8 (143)	29.8 (160)	3.6 (159)
No empleado	16.6 (1,453)	38.6 (330)	19.4 (605)	4.1 (518)

Los números entre paréntesis corresponden al número promedio de mujeres.

*N<25

C U A D R O #22

Perfil demográfico de mujeres de 15 a 44 años de edad
que están operadas (Esterilización femenina)
Guatemala, 1978

<u>Edad</u>	<u>Distribución Porcentual</u>
15 - 19	0.0
20 - 24	5.4
25 - 29	13.6
30 - 34	30.3
35 - 39	35.7
40 - 44	15.0
Número de hijos	
<u>vivos</u>	
0 - 1	3.4
2	8.9
3	22.1
4	23.7
5	18.9
6	14.1
7+	8.9
T O T A L	100.0
(Número no ponderado de mujeres)	(129)
Edad promedio de mujeres	34.4
Promedio de hijos vivos	4.3

C U A D R O #23

Fuente de anticonceptivos por área, grupo étnico
para usuarias actuales de anticonceptivos
mujeres actualmente casadas de 15-44 años de edad
(Distribución Porcentual)
Guatemala, 1978

<u>Fuente de Anticonceptivos</u>	<u>Total</u>	<u>Depto. de Guatemala</u>	<u>Interior</u>	
			<u>Ladino</u>	<u>Indígena</u>
Ministerio de Salud	37.4	21.1	49.2	37.9
APROFAM	11.5	18.7	8.0	0.0
Inst. de Seguridad Social	5.7	11.1	2.1	3.3
Distribución Comunitaria	1.3	0.4	0.5	10.3
Clínica Privada	13.2	14.4	11.8	17.2
Farmacia Privada	12.6	12.6	13.9	3.4
Otros ¹	2.7	3.4	2.2	3.7
No aplica ²	15.6	18.3	12.3	24.1
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0
Número de casos (no ponderados)	385	194	163	28

¹Incluye Farmacia municipal y otros

²Están usando ritmo y retiro

C U A D R O #24

Fuente de anticonceptivos por área y grupo étnico
 por método para usuaria que usa actualmente anticonceptivos
 mujeres actualmente casadas de
 15 a 44 años de edad
 (Distribución Porcentual)
 Guatemala, 1978

<u>Fuente de Anticonceptivos</u>	<u>Total</u>	<u>Esterilización</u>	<u>Oral</u>	<u>DIU</u>	<u>Condón</u>
Ministerio de Salud	37.4	50.7	48.3	50.6	14.1
APROFAM	11.5	18.3	9.4	19.1	7.7
Instituto de Seguridad Social	5.7	14.6	2.1	0.0	0.0
Distribución Comunitaria	1.3	0.0	1.0	2.1	7.0
Clínica Doctor Privado	13.2	15.0	9.8	28.2	7.7
Farmacia Privada	12.6	0.0	26.9	0.0	45.5
Otras Fuentes ¹	2.7	1.3	2.6	0.0	18.0
No aplica ²	15.6	-----	-----	-----	-----
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Número de Casos (no ponderados)	(385)	(129)	(114)	(34)	(16)

¹Incluye farmacia municipal y otras

²Los que usan ritmo y retiro

C U A D R O #25

Razones para no usar actualmente anticonceptivos por área y grupo étnico, mujeres actualmente Casadas de 15 a 44 años de edad (Distribución Porcentual) Guatemala, 1978

<u>Razones</u>	<u>Total</u>	<u>Depto. de Guatemala</u>	<u>Interior</u>	
			<u>Ladino</u>	<u>Indígena</u>
<u>Razones relacionadas con embarazo, fecundidad y actividad sexual</u>	<u>36.0</u>	<u>60.5</u>	<u>41.5</u>	<u>23.5</u>
Desea otro embarazo	11.4	12.5	13.0	9.6
Embarazo actual	11.7	23.2	13.3	6.9
Post-parto	6.0	11.3	7.2	3.2
Menopausia	0.8	0.0	1.3	0.4
Sub-fecundidad	5.1	8.1	6.3	3.1
Sexualmente inactiva	1.0	5.4	0.4	0.3
<u>Otras Razones</u>	<u>64.0</u>	<u>39.5</u>	<u>58.5</u>	<u>76.5</u>
Miedo a efectos colaterales	8.9	8.7	12.1	5.9
Miedo a los anticonceptivos	2.8	4.5	2.9	2.1
No quiere no le gusta	2.6	2.7	2.8	2.3
Razones de salud	0.8	2.6	1.0	0.1
Otras razones personales	10.5	4.9	12.2	10.4
Falta de conocimiento de métodos anticonceptivos	20.2	5.3	8.6	35.6
Razones religiosas	5.0	4.5	4.6	5.5
Otras razones	11.3	3.3	12.2	13.2
No sabe	1.9	3.0	2.1	1.4
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0
Número de casos (no ponderados)	1,350	279	602	649

C U A D R O # 26

Porcentaje de no usuarias que desean
usar un método anticonceptivo y conocimiento
de su disponibilidad, mujeres actualmente casadas,
de 15 a 44 años de edad
Guatemala, 1978

<u>Características de informantes</u>	<u>% de no usuarias que desean usar un método anticonceptivo</u>	<u>% de quienes desean usar y conocen donde obtener el método ant.</u>
TOTAL	31.8 (1,530)	42.9 (486)
<u>Area y Grupo étnico</u>		
Depto. de Guatemala	30.5 (279)	63.9 (85)
Interior: Ladino	34.2 (602)	50.7 (209)
Indígena	29.8 (649)	29.7 (192)
<u>Edad</u>		
15 - 19 años	22.4 (193)	34.1 (46)
20 - 24 años	27.4 (366)	46.4 (100)
25 - 29 años	35.8 (330)	41.8 (120)
30 - 34 años	44.2 (268)	45.1 (112)
35 - 39 años	36.9 (218)	43.9 (78)
40 - 44 años	19.0 (155)	38.7 (30)
<u>Educación</u>		
Ninguna	32.1 (961)	36.6 (306)
Primaria Completa	34.4 (398)	53.8 (141)
Primaria Completa o más.	22.2 (171)	60.9 (39)
<u>Empleado Actualmente</u>		
Empleado	31.8 (337)	46.7 (108)
No empleado	31.7 (1,193)	41.9 (378)
<u>Experiencia de Anticonceptivos (uso previo)</u>		
Nunca ha usado antes	30.4 (1,307)	35.9 (396)
Ha usado antes	40.9 (223)	78.8 (90)

Los números entre paréntesis corresponden al número de casos no ponderados.

C U A D R O #27

Porcentaje de no usuarias que desean usar un método anticonceptivo por uso previo, área y grupo étnico mujeres actualmente casadas de 15 a 44 años Guatemala, 1978

<u>Región y grupo étnico</u>	<u>Total de no usuarias</u>	<u>Número de no usuarias que:</u>	
		<u>Usó anticoncept. en el pasado</u>	<u>Nunca ha usado anticonceptivos</u>
TOTAL	31.8 (1,530)	40.9 (203)	30.4 (1,307)
Departamento de Guatemala	30.5 (279)	38.3 (109)	25.8 (170)
Interior:			
Ladino	34.2 (602)	41.2 (87)	33.1 (515)
Indígena	29.8 (649)	46.7 (27)	29.0 (622)

NOTA: Los números entre paréntesis corresponden al número de casos no ponderados.

C U A D R O #28

Porcentaje de no usuarias que tienen conocimiento de la disponibilidad de anticonceptivos, por deseo de usar un método y área y grupo étnico mujeres actualmente casadas de 15 a 44 años de edad Guatemala, 1978

<u>Región/grupo étnico</u>	<u>Porcentaje con conocimiento de la disponibilidad</u>		
	<u>Total de No usuarias</u>	<u>NO usuarias que:</u>	
		<u>Desean usar Anticonceptivos</u>	<u>No desean usar Anticonceptivos</u>
TOTAL	36.7 (1,526)	42.9 (486)	33.9 (1,040)
Depto. de Guatemala	61.0 (277)	63.9 (85)	60.3 (192)
Interior:			
Ladino	44.1 (600)	49.6 (209)	41.4 (391)
Indígena	22.8 (649)	29.5 (192)	20.0 (457)

NOTA: Los números que están entre paréntesis corresponden al número de casos no ponderados.

*Del total de 1,530 mujeres, 4 casos son omitidos porque se ignora su estatus en cuánto al deseo de usar un método anticonceptivo.

C U A D R O #29

Mujeres que no están usando actualmente anticonceptivos que desean
 Usar un método, por Método preferido y Fuente de Servicio
 que conocen, por Región y Grupo étnico. Mujeres
 actualmente casadas de 15-44 años de edad
 (Distribución Porcentual)
 Guatemala, 1978

<u>Método Preferido</u>	<u>Total</u>	<u>Guatemala</u>	<u>Interior</u>	
			<u>Ladino</u>	<u>Indígena</u>
Pildora	33.2	21.6	27.2	43.3
Inyección	12.2	13.4	15.1	8.6
Esterilización	10.2	16.6	15.1	2.9
Ritmo	2.3	0.9	0.9	3.8
DIU	1.9	7.5	1.3	1.0
Condón	0.1	1.2	0.0	0.0
Cualquier método	7.0	5.0	4.7	10.0
Otros métodos	2.0	4.7	2.6	0.5
No sabe cual escoger	30.8	28.1	32.3	30.0
Desconocido	0.3	1.1	0.4	0.0
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0
Número de casos (no ponderados)	(486)	(65)	(209)	(192)
<u>Fuente de obtención que conocen</u>				
Ministerio de Salud (PDD)	74.8	34.8	84.3	82.3
APROFAM	9.2	38.1	3.5	1.6
Instituto de Seguridad Soc.	1.5	8.3	0.0	0.0
Distribuidor Comunitario	1.3	1.8	0.0	3.2
Doctor Privado	6.8	9.7	5.2	8.1
Farmacia Privada	5.5	7.3	6.1	3.2
Otros	0.9	0.0	0.9	1.6
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
Número de casos (No ponderados)	(218)	(55)	(106)	(57)

C U A D R O #30

Estado de la planificación del último embarazo por
 área, grupo étnico, paridad y educación para mujeres actualmente
 casadas, de 15 a 44 años de edad
 Guatemala, 1978

<u>Características</u>	<u>Embarazo Planeado</u>	<u>Emb. no Previsto</u>	<u>Emb. no Deseado</u>	<u>Total</u>	<u>No. de mujeres (no ponderado)</u>
<u>TOTAL</u>	81.0	7.0	12.0	100.0	(1,859)*
<u>Area y grupo étnico</u>					
Depto. de Guatemala	74.0	10.1	15.9	100.0	(462)
Interior: Ladino	76.6	8.2	15.2	100.0	(750)
Indígena	89.4	4.3	6.3	100.0	(647)
<u>Paridad</u>					
0	98.5	1.5	0.0	100.0	(61)
1	93.1	5.0	1.9	100.0	(264)
2	85.0	11.2	3.8	100.0	(325)
3	85.8	8.6	5.6	100.0	(295)
4 - 5	80.0	8.3	11.7	100.0	(440)
6+	68.2	4.4	27.2	100.0	(474)
<u>Educación</u>					
Ninguno	81.8	6.1	12.1	100.0	(1,003)
Primaria Incompleta	79.5	7.7	12.8	100.0	(511)
Primaria completa	81.0	10.7	8.3	100.0	(172)
Secundaria+	80.4	7.6	12.0	100.0	(173)

*Del total de 1,915 casos, se excluyeron 56 mujeres que nunca han estado embarazadas.

C U A D R O #31

Deseo de otro embarazo actualmente
por área, grupo étnico, paridad, educación
estatus de empleo, para mujeres actualmente embarazadas
de 15 a 44 años de edad
(Distribución Porcentual)
Guatemala, 1978

<u>Características</u>	<u>Embarazo Actual</u>	<u>Mujeres no embarazadas</u>			<u>Total*</u>
		<u>Embarazo Deseado</u>	<u>No desea Embarazo</u>	<u>No sabe</u>	
TOTAL	13.7	22.9	59.3	4.1	100.0 (1,915)
<u>Area/grupo étnico</u>					
Depto. de Guatemala	14.4	13.8	69.9	1.9	100.0 (473)
Interior: Ladino	13.5	20.1	63.2	3.1	100.0 (765)
Indígena	13.5	30.2	49.8	6.5	100.0 (677)
<u>Paridad</u>					
0	41.1	46.4	10.9	1.6	100.0 (117)
1	17.7	38.0	40.7	3.6	100.0 (264)
2	16.6	24.7	54.1	4.6	100.0 (325)
3	12.3	20.5	62.4	4.8	100.0 (295)
4+	8.4	15.7	71.5	4.4	100.0 (914)
<u>Educación</u>					
Ninguna	14.2	25.3	55.1	5.4	100.0 (1,031)
Primaria Incompleta	12.6	22.2	61.8	3.4	100.0 (529)
Primaria completa y más	13.6	15.3	70.1	1.0	100.0 (355)
<u>Empleado Actualmente</u>					
Empleado	12.5	22.8	61.8	2.9	100.0 (462)
No empleado	14.0	22.9	56.5	4.6	100.0 (1,453)

*Los números entre paréntesis corresponden al número de casos no ponderados.

C U A D R O #32

Porcentaje con conocimiento de la disponibilidad del servicio de esterilización ó lugar de información sobre esterilización por educación, área y grupo étnico en las mujeres actualmente casadas de 15 a 44 años que no quieren más hijos y que están interesadas en la esterilización Guatemala, 1978

<u>Area y Grupo étnico</u>	<u>Educación de las mujeres</u>		
	<u>Total</u>	<u>Ninguno</u>	<u>Primaria in completa+</u>
Total	54.8 (300)	42.4 (128)	66.2 (172)
Departamento de Guatemala	64.8 (105)	49.1 (28)	71.3 (39)
Interior:			
Ladino	50.9 (153)	38.5 (66)	62.7 (87)
Indígena	54.0 (42)	46.3 (34)	* (8)

*N 25

Los números entre paréntesis corresponden al número de casos no ponderados.

C U A D R O #33

Mujeres actualmente casadas de 15 a 44 años de edad
que no desean más hijos, y que están interesadas
en la esterilización y conocen donde obtener información,
sobre la operación, por área, grupo étnico y fuente de información
(Distribución Porcentual)
Guatemala, 1978

<u>Fuente de Información</u>	<u>Total</u>	<u>Depto. de Guatemala</u>	<u>Interior</u>	
			<u>Ladino</u>	<u>Indígena</u>
Ministerio de Salud	71.4	35.5	90.8	70.4
APROFAM	16.2	43.4	2.3	14.8
Instituto de Seguridad Social	1.1	3.9	0.0	0.0
Doctor Privado	10.2	16.0	5.7	14.8
Otras fuentes	0.9	1.2	1.1	0.0
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0
Número de casos (no ponderados)	(170)	(69)	(80)	(21)

C U A D R O #34

Mujeres que están interesadas en la esterilización, cuando tengan todos los hijos que desean y que conocen donde obtener información sobre la operación por área y grupo étnico y fuente de información
 Mujeres actualmente casadas de 15 a 44 años de edad
 (Distribución Porcentual)
 Guatemala, 1978

<u>Fuente de Información</u>	<u>TOTAL</u>	<u>Depto. de Guatemala</u>	<u>Interior</u>	
			<u>Ladino</u>	<u>Indígena</u>
Ministerio de Salud	57.8	23.6	69.1	70.6
APROFAM	21.3	53.6	9.3	17.6
Instituto de Seguridad Social	2.2	6.2	1.0	0.0
Doctor Privado	16.0	16.6	16.5	11.8
Otras fuentes	2.7	0.0	4.1	0.0
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0
Número de casos (no ponderados)	(156)	(60)	(81)	(15)

C U A D R O #35

Razones para no estar interesadas en la esterilización
 por parte de las mujeres, actualmente casadas de
 15 a 44 años, que no quieren más hijos, por área y grupo étnico
 (Distribución Porcentual)
 Guatemala, 1978

<u>Razones</u>	<u>Total</u>	<u>Depto. de Guatemala</u>	<u>Interior</u>	
			<u>Ladino</u>	<u>Indígena</u>
Miedo a la operación quirúrgica	40.8	25.5	31.5	56.9
Infertilidad/subfecundidad	11.6	11.3	15.2	7.8
No tiene consentimiento/esposo	11.0	11.6	14.2	7.3
Prefiere otro método	7.6	17.2	6.9	4.4
Razones religiosas	5.7	3.6	5.0	7.4
Miedo a efectos colaterales	5.6	5.0	7.3	3.9
No piensa que pueda quedar embarazada	3.9	1.3	8.3	0.5
No sabe de la operación	3.2	1.5	2.3	4.9
No quiere o no le gusta	2.9	5.4	1.8	2.9
No está segura de tener los hijos que desea	2.3	10.3	1.4	0.0
Razones de accesibilidad	1.3	0.6	1.9	1.0
Razones de Salud	1.1	0.8	1.8	0.5
No está sexualmente activa	0.8	3.3	0.5	0.0
Otras razones	1.3	1.9	1.9	0.5
No sabe	0.9	0.7	0.0	2.0
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0
Número de casos (no ponderados)	(481)	(110)	(187)	(184)

C U A D R O #36

Razones para no estar interesadas en la esterilización
 mujeres actualmente casadas de 15 a 44 años
 que no quieren más hijos, por educación
 (Distribución Porcentual)
 Guatemala, 1978

<u>Razones</u>	<u>Educación</u>		
	<u>Total</u>	<u>Ninguno</u>	<u>Primaria Incompleta ó más</u>
Miedo a la operación quirúrgica	40.8	47.8	28.2
Infertilidad/Subfecundidad	11.6	12.1	10.4
No tiene consentimiento/esposo	11.0	8.6	15.3
Prefiere otro método reversible	7.6	4.9	12.5
Razones religiosas	5.7	7.0	3.4
Miedo a efectos colaterales	5.6	4.2	8.0
No piensa que pueda quedar embarazada	3.9	3.5	4.7
No sabe de la operación	3.2	4.2	1.4
No quiere o no le gusta	2.9	3.0	2.6
No está segura de tener los hijos que desea	2.3	0.6	5.9
Razones de Accesibilidad	1.3	0.9	1.9
Razones de Salud	1.1	1.4	0.5
No está sexualmente activa	0.8	0.3	1.6
Otras razones	1.3	0.3	2.0
No sabe	0.9	0.9	0.9
TOTAL	100.0	100.0	100.0
Número de casos (no ponderados)	(481)	(292)	(189)

C U A D R O #37

Interés en el programa de Distribución Comunitaria (D.C.A.)
mujeres actualmente casadas de 15 a 44 años, por área, grupo étnico
grupo de edad, educación y estatus de empleo
(Distribución Porcentual)
Guatemala, 1978

<u>Características</u>	<u>Interesados en el Programa DC</u>			<u>Total*</u>
	<u>Si</u>	<u>No</u>	<u>No sabe</u>	
TOTAL	48.6	29.5	21.9	100.0 (1,786)
<u>Area y Grupo étnico</u>				
Depto. de Guatemala	59.8	30.3	9.9	100.0 (411)
Interior: Ladino	52.1	31.5	16.4	100.0 (705)
Indígena	40.2	27.0	32.9	100.0 (670)
<u>Edad</u>				
15 - 19 años	45.4	26.3	28.3	100.0 (205)
20 - 24 años	50.5	28.0	21.4	100.0 (421)
25 - 29 años	51.6	27.4	21.0	100.0 (407)
3 30 - 34 años	52.6	29.4	18.0	100.0 (324)
35 - 39 años	48.6	31.2	20.2	100.0 (264)
40 - 44 años	35.0	38.5	26.5	100.0 (165)
<u>Educación</u>				
Ninguna	43.4	28.6	28.0	100.0 (1,003)
Primaria Incomp.	54.5	30.7	14.8	100.0 (482)
Primaria Completa	59.3	31.0	9.7	100.0 (301)
<u>Estatus de Empleo</u>				
Empleado actualmente	52.6	29.4	18.0	100.0 (425)
No empleado	47.3	29.5	23.2	100.0 (1,361)

*Los números entre paréntesis corresponden al número de casos no ponderados.

NOTA: Este cuadro excluye a las mujeres operadas.

C U A D R O #38

Interés en el Programa de Distribución Comunitaria (D.C.A.)
de mujeres actualmente casadas de 15 a 44 años
por estatus de uso de anticonceptivos
y tiempo para llegar a la fuente de anticonceptivos
(Distribución Porcentual)
Guatemala, 1978

<u>Tiempo (en minutos) para llegar a la fuente de anticonceptivos</u>	<u>Total</u>	<u>Usan Actual mente Anticon ceptivos*</u>	<u>No usan ac- tualmente an ticonceptivos**</u>
TOTAL	61.2 (751)	68.1 (186)	59.2 (565)
Menos de 15	64.5 (215)	76.4 (61)	60.3 (154)
15 - 30	55.3 (155)	57.0 (38)	54.8 (117)
Más de 30	61.7 (381)	67.4 (87)	60.2 (294)

NOTA: Los números entre paréntesis corresponden al número de casos no ponderados,

* Excluye a las mujeres ya operadas

** Incluye a las mujeres que no están usando anticonceptivos actualmente,
pero que tiene conocimiento de su disponibilidad.

C U A D R O #39

Porcentaje de mujeres actualmente casadas de 15 a 44 años de edad,
que viven a menos de 30 minutos de una fuente de anticoncepti-
tivos por área y grupo étnico, estatus de uso de anticonceptivos
Guatemala, 1978

Area y grupo étnico	<u>Total</u>	<u>Usuaría</u> <u>Actual**</u>	<u>Usuaría No</u> <u>Actual***</u>
TOTAL	62.2 (751)	71.5 (186)	59.5 (565)
Depto. de Guatemala	76.5 (257)	76.0 (94)	76.7 (163)
Interior:			
Ladino	61.6 (338)	69.7 (79)	59.2 (259)
Indígena	48.2 (156)	* (13)	47.1 (143)

NOTA: Los números que están entre paréntesis corresponden al número de casos no ponderados.

*N<25

**Se excluye a mujeres ya operadas

***Mujeres no usuarias que tiene el conocimiento de disponibilidad

C U A D R O #40

Razones para no estar interesadas en el programa de
Distribución Comunitaria, mujeres actualmente casadas de
15 a 44 años de edad por área y grupo étnico
(Distribución Porcentual)
Guatemala, 1978

<u>Razones para no estar inte resadas en el Programa de Distribución Comunitaria</u>	<u>Total</u>	<u>Depto. de Guatemala</u>	<u>Interior</u>	
			<u>Ladino</u>	<u>Indígena</u>
No confía en una persona que no sea médico, enfermera, T.S.	26.4	37.4	21.6	27.6
Razones religiosas	11.7	4.1	10.4	16.8
Confidenciabilidad	9.8	10.7	9.6	9.7
Está embarazada o desea más niños	8.7	5.3	10.0	8.7
No quiere o no le gusta	8.7	4.1	9.2	10.2
Subfecundidad o menopausia	6.6	8.2	7.6	4.6
El esposo no lo permite	8.5	5.3	9.6	8.7
Temor a efectos colaterales	5.8	2.5	8.4	4.1
Prefiera Clínica/Farmacia	3.1	5.5	3.6	1.0
Otras razones	7.0	11.7	6.0	6.1
No sabe	3.7	5.3	4.0	2.5
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0
Número de Casos (no ponderados)	(517)	(115)	(219)	(183)

NOTA: Se excluyó a mujeres ya operadas

C U A D R O #41

Razones para no estar interesadas en el Programa de Distribución Comunitaria de Anticonceptivos, (D.C.A.)
mujeres actualmente casadas de 15 a 44 años de edad por educación.
(Distribución Porcentual)
Guatemala, 1978

<u>Razones para no estar inte</u> <u>resadas en el Programa de</u> <u>Distribución Comunitaria</u>	EDUCACION			
	<u>Total</u>	<u>Ninguna</u>	<u>Primaria</u> <u>Incompleta</u>	<u>Primaria</u> <u>Completa+</u>
No confía en una persona que no es médico, enfermera, T.S.	26.4	21.9	25.5	45.6
Razones religiosas	11.7	14.8	9.9	3.2
Confidencialidad	9.8	12.1	6.5	7.1
Está embarazada o desea más hijos	8.7	9.2	11.2	2.9
No quiere no le gusta	8.7	11.8	5.5	2.6
Subfecundidad o menopausia	6.6	5.9	5.6	7.6
El esposo no lo permite	8.5	9.7	8.7	3.9
Temor a efectos colaterales	5.8	4.9	9.9	1.9
Prefiere Clínica/farmacia	3.1	1.3	3.9	8.0
Otras razones	7.0	5.9	8.4	8.1
No sabe	3.7	1.5	5.0	9.1
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0
Número de Casos (no ponderados)	(517)	(280)	(143)	(94)

NOTA: Se excluyó a mujeres operadas.

C U A D R O #42

Porcentaje del total de mujeres de 15-44 años de edad que necesitan los servicios* de planificación familiar, por área y grupo étnico y características seleccionadas, Guatemala, 1978

<u>Características</u>	<u>Total</u>	<u>Depto. de Guatemala</u>	<u>Interior</u>	
			<u>Ladino</u>	<u>Indígena</u>
TOTAL	26.8 (2,478)	13.3 (688)	25.0 (984)	37.4 (806)
<u>Edad</u>				
15 - 19 años	10.1 (467)	1.7 (130)	10.8 (186)	15.1 (151)
20 - 24 años	23.5 (533)	11.1 (140)	21.5 (199)	31.7 (194)
25 - 29 años	29.1 (490)	16.8 (143)	25.9 (202)	42.2 (145)
30 - 34 años	37.7 (408)	22.4 (123)	36.4 (153)	48.3 (132)
35 - 39 años	35.9 (356)	11.6 (100)	34.9 (161)	56.4 (95)
40 - 44 años	42.7 (244)	34.4 (52)	36.0 (83)	52.8 (89)
<u>Estado Civil</u>				
Actualmente Casada	35.2 (1,915)	20.4 (473)	33.4 (765)	44.1 (677)
Unida	13.8 (180)	9.7 (61)	12.0 (77)	21.2 (42)
Soltera	4.7 (383)	1.6 (154)	4.2 (142)	9.5 (87)
<u>Paridad</u>				
0	4.3 (517)	0.8 (183)	3.7 (195)	8.8 (139)
1	22.7 (378)	9.1 (124)	22.2 (133)	31.7 (121)
2	24.9 (407)	16.4 (125)	22.5 (158)	33.9 (124)
3	36.1 (367)	18.5 (93)	35.7 (139)	44.5 (135)
4	39.3 (281)	22.2 (76)	31.0 (105)	65.6 (100)
5	42.2 (217)	23.0 (32)	36.4 (92)	53.1 (93)
6+	52.8 (311)	45.8 (55)	50.5 (162)	60.0 (94)
<u>Educación</u>				
Ninguna	38.0 (1,217)	36.8 (130)	35.0 (418)	40.1 (669)
Primaria Incompleta	24.1 (662)	15.2 (179)	25.6 (370)	28.3 (113)
Primaria Completa	6.5 (599)	4.9 (379)	7.6 (196)	12.1 (24)

*Necesita servicios, se define, como mujeres que no están actualmente embarazadas y actualmente no desean un embarazo, quienes están usando métodos no eficaces o no están usando ningún método por cualquier motivo o razón que no esté relacionado con el embarazo, subfecundidad o actividad sexual.

NOTA: Los números entre paréntesis corresponden al número de casos no ponderados.

C U A D R O #43

Distribución porcentual de las mujeres de 15 a 44 años de edad, que necesitan los servicios* de planificación familiar por Grupo étnico y Características seleccionadas Guatemala, 1978

<u>Características</u>	<u>Total</u>	<u>Depto. de Guatemala</u>	<u>Interior</u>	
			<u>Ladino</u>	<u>Indígena</u>
TOTAL (684 casos)**	100.0	10.4	42.4	47.2
<u>Edad</u>				
15 - 19 años	9.0	0.3	4.5	4.2
20 - 24 años	18.6	1.7	7.3	9.6
25 - 29 años	19.1	2.4	8.0	8.8
30 - 34 años	20.6	2.6	8.7	9.3
35 - 39 años	18.0	1.2	9.1	7.7
40 - 44 años	14.7	2.2	4.9	7.6
<u>Estado Civil</u>				
Actualmente Casada	92.3	9.3	39.1	43.9
Unida	3.8	0.7	1.6	1.6
Soltera	3.9	0.4	1.6	1.9
<u>Paridad</u>				
0	4.4	0.2	1.8	2.4
1	11.9	1.1	4.7	6.1
2	13.3	1.9	5.4	6.0
3	18.1	1.7	7.6	8.8
4	14.4	1.6	4.7	8.1
5	12.5	0.8	4.9	6.9
6+	25.3	3.1	13.3	8.9
<u>Educación</u>				
Ninguna	70.5	5.3	23.7	41.4
Primaria completa	23.7	2.9	15.6	5.3
Primaria incompleta o más	5.8	2.2	3.1	0.5

*Necesita servicios, se define, como mujeres que no están actualmente embarazadas y actualmente no desean un embarazo, quienes están usando métodos no eficaces o no están usando ningún método por cualquier motivo o razón; que no está relacionado con el embarazo, subfecundidad o actividad sexual

**Número de mujeres en la muestra, que necesitan de los servicios de Planificación Familiar.