

EXTENSION PRODUCCION OVINA

FN 100002



EDAD DE LAS OVEJAS

FOILETO No 2



ASOCIACION NACIONAL DE CRIADORES DE OVEJAS

PN-AA4-173



Financiado por:

MAG

El Gobierno del Ecuador

USAID

La Agencia para el
Desarrollo Internacional

Administrado por:

La Universidad de Florida

Asistencia Técnica:

La Universidad del Estado
de Utah

*Darrell H. Matthews, Utah State University
Asesor en Ovejas*

*James W. Stevens, Utah State University
Asesor en Extensión*

*Alfonso Mosquera Arcos
Gerente de A.N.C.O.*

*Julio Escudero C.
Presidente de A.N.C.O.*

*Raúl Montalvo Jácome
Agente de Extensión A.N.C.O./M.A.G.*

*Noel Madrid Alvarado
Administrador de Hacienda A.N.C.O./M.A.G.*

*Marco León Vinuesa
Administrador de Hacienda A.N.C.O./M.A.G.*

*Traducido de folletos publicados por el Instituto Internacional
de Ovejas y Cabras, Universidad del Estado de Utah, Logan, Utah,
84322, U.S.A.*


Impreso en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, Quito.

SERIES PARA EL MANEJO DE LAS OVEJAS MEJORADAS

EDAD DE LAS OVEJAS

Desde el nacimiento hasta la madurez y vejez, los animales tienen diversas etapas de desarrollo y comportamiento. Las ovejas jóvenes responden más eficientemente a la alimentación de lo que hacen las viejas. Las más jóvenes usualmente son más saludables y más productivas que las viejas.

La edad de las ovejas puede ser bastante bien determinada examinando el desarrollo de los dientes y las condiciones de la boca.



1. Boca de la cría

La cría tiene 8 dientes frontales (incisivos). Estos son temporales o dientes de "leche". Estos son reemplazados de una manera regular por dientes más grandes y fuertes cuando la oveja tiene más edad.



2. Boca de un año

Los dos dientes centrales temporales han sido reemplazados por dos dientes más grandes permanentes, al año de edad aproximadamente.



Esta oveja tiene un año, es mejor comprarlas de esta edad porque va a tener cinco o seis años de producción en el rebaño.



3. Boca de dos años

A los dos años de edad, los cuatro dientes centrales permanentes han crecido y están completamente desarrollados.



4. Boca de 3 años

A los tres años de edad, los seis dientes centrales permanentes están desarrollados completamente en fuerza y tamaño.



5. Boca de 4 años

A los cuatro años de edad los ocho dientes delanteros temporales han sido reemplazados por ocho dientes definitivos. Este estado se llama boca completa.



Boca con dientes separados



Pérdida del juego dental

A partir de los cinco años los dientes empiezan a desaparecer, se dañan, se pierden, se rompen o muestran otros defectos conocidos como "Boca Rota".



Las ovejas "Boca Rota" deben ser desechadas del rebaño y reemplazadas con más jóvenes, con animales más productivos. Esto debe ser hecho especialmente cuando la comida es dura, carrasposa en textura, o cuando la alimentación es difícil.



7. Boca normal

Cuando la mandíbula inferior (con dientes) se encuentra con la mandíbula superior (con encía) se juntan. La función de masticar es más eficiente y deseable.



8. Prognatismo superior

Cuando la mandíbula inferior (con los dientes) se coloca delante o detrás de la encía superior se dice que tiene una boca prognática superior y algunas veces es llamada boca de loro.

Una boca prognática es un defecto hereditario. Retire a esos animales y ovejas de su rebaño y prepárelos para el mercado.



9. Prognatismo inferior

Cuando la mandíbula inferior (con los dientes) se extiende más allá de la mandíbula superior (con encía) se dice que el animal tiene una boca prognática inferior.

Deseche estos animales con boca prognática y
prepárelos para el mercado.

Un rebaño productivo debe constar de animales
con boca y dentadura saludables y sin defectos.

Recuerde en la oveja "la raza entra por la boca"