

BRÛLAGE ET ENFOUISSEMENT DES DÉCHETS MÉDICAUX

La gestion des déchets compris des outils de vaccination ainsi que des équipements de protection individuelle (EPI) peut être différent dans chaque situation ou localité. Il est probable que ce soient les fonctionnaires locaux qui décideront la meilleure manière de gérer les déchets tels que des boîtes de sûreté pour objets tranchants et d'autres articles qui ont pu être en contact avec des oiseaux ou leurs déchets. Ils décideront si le brûlage ou l'enfouissement de ces déchets médicaux est la meilleure idée.

Si vous ENFOUISSEZ de l'équipement médical et de l'EPI utilisé, maintenez les points suivants dans l'esprit² :

- Le trou d'enfouissement doit être creusé loin des secteurs habités par des humains et des animaux et loin des sources d'eau (puits, lacs, étangs, fleuves).
- Le trou d'enfouissement doit être assez grand pour y mettre tous les déchets médicaux, et ajouter au moins 0.6 mètre (2 pieds) de sol sur les déchets.
- Couvrez les déchets médicaux avec 40 centimètres de sol, et puis semez au dessus une couche solide de chaux éteinte avant de remplir le trou. Ceci aidera à prévenir que les animaux (tels que des chiens, des chats et des porcs) creusent et exposent les déchets.



Si vous BRÛLEZ de l'équipement médical et de l'EPI utilisé, maintenez les points suivants dans l'esprit³ :

- Les déchets médicaux peuvent être entassés sur un bûcher et brûlés avec du liquide inflammable. Arrangez les déchets et du carburant de sorte qu'assez d'air puisse circuler par-dessous de la pile et atteindre ainsi le feu le plus chaud possible dans la période la plus courte.
- Après avoir fini d'entasser les déchets, versez du diesel ou du mazout (pas de l'essence) sur le bûcher et placez des chiffons imbibés en kérosène tous les 10 mètres autour du trou.
- Pour allumer le feu, marchez contre le vent en allumant chacun des chiffons autour du trou.
- Assurez-vous que quelqu'un contrôle le feu à tout moment pour vérifier qu'assez de carburant est employé, et que tous les articles qui tombent hors le feu y sont remplacés encore.
- Les cendres peuvent être enfouies comme décrit dans la section ci-dessus.



Rappelez-vous toujours DE SURVEILLER VOTRE SANTÉ PENDANT AU MOINS 7 JOURS après la vaccination.

Notifiez votre fournisseur de soins de santé local si vous développez un quelconque de ces symptômes :

- De la fièvre au dessus de 38°C
- Mal de gorge ou toux
- Détresse ou insuffisance respiratoire



Mentionnez aussi que vous avez participé à la vaccination des volailles.

^{2,3} V. Martin, A. Forman, J. Lubroth, «Préparation pour faire face à la grippe aviaire fortement pathogène. Un manuel pour des pays à risque». 16 février 2006.

GRIPPE AVIAIRE (D'OISEAU) :

Un guide pour ceux chargés de surveiller la vaccination de la volaille



Il y a beaucoup de manières de protéger les oiseaux contre la grippe aviaire (d'oiseau). La vaccination en est une. Si vos fonctionnaires locaux recommandent de vacciner, suivez toujours leurs instructions.

Bien que la vaccination puisse aider à empêcher les oiseaux de tomber malades ou mourir, ils peuvent toujours devenir infectés et propager la maladie même après la vaccination. En conséquence, même si vous vaccinez vos oiseaux, il est important de prendre aussi d'autres mesures pour les protéger.

Si vous participez à une campagne de vaccination de la volaille, ce livret vous fournira quelques informations importantes pour aider à empêcher et limiter la propagation de la grippe aviaire (d'oiseau).

