

GESTION DES CADAVRES DES OISEAUX ET D'AUTRES PIÈCES ANIMALES

La gestion des déchets compris des équipements de protection individuelle (EPI), des outils, ainsi que des cadavres des oiseaux et leurs pièces peut être différente dans chaque situation ou localité. Il est probable que ce soient les fonctionnaires locaux qui décideront la meilleure manière de se débarrasser des oiseaux morts et d'autres articles qui ont pu être en contact avec du sang ou d'autres pièces animales.

Si vous ENFOUISSEZ des cadavres d'oiseaux, des EPI utilisés et d'autres outils contaminés, maintenez les points suivants dans l'esprit³ :

- Le trou d'enfouissement doit être creusé loin des secteurs habités par des humains et des animaux et loin des sources d'eau (puits, lacs, étangs, fleuves).
- Le trou d'enfouissement doit être assez profond pour que l'on puisse y mettre tous les oiseaux morts, et ajouter au moins 0.6 mètre (2 pieds) de sol au dessus des cadavres.
- Couvrez les cadavres avec 40 centimètres de sol, et puis semez au dessus une couche solide de chaux éteinte avant de remplir le trou. Ceci aidera à prévenir que les animaux (tels que des chiens, des chats et des porcs) creusent et exposent les poulets morts ou leurs pièces. Ne mettez pas de la chaux vive directement sur les cadavres parce qu'elle ralentit, et peut même empêcher, la décomposition.



Si vous BRÛLEZ des cadavres d'oiseaux, des EPI utilisés, ainsi que d'autres outils contaminés, maintenez les points suivants dans l'esprit⁴ :

- Les déchets cadavres peuvent être entassés sur un bûcher et brûlés avec du liquide inflammable. Arrangez les cadavres et le carburant de sorte qu'assez d'air puisse circuler par-dessous de la pile pour atteindre ainsi le feu le plus chaud possible dans la période la plus courte.
- Après avoir fini d'entasser les cadavres, versez du diesel ou du mazout (pas de l'essence) sur la pile et placez des chiffons imbibés en kérosène tous les 10 mètres autour du bûcher.
- Pour allumer le feu, marchez contre le vent en allumant chacun des chiffons autour du trou.
- Assurez-vous que quelqu'un contrôle le feu à tout moment pour vérifier que l'on utilise assez de carburant, et que tous les cadavres et pièces animales qui tombent hors le feu y sont remplacés encore.
- Les cendres peuvent être enfouies comme décrit dans la section ci-dessus.



Rappelez-vous toujours DE SURVEILLER VOTRE SANTÉ PENDANT AU MOINS 7 JOURS après l'opération d'abattage.

Notifiez votre fournisseur de soins de santé local si vous développez un quelconque de ces symptômes :

- De la fièvre au dessus de 38°C
- Mal de gorge ou toux
- Détresse ou insuffisance respiratoire



Mentionnez aussi que vous avez participé dans l'abattage des volailles.

ABATTAGE DE LA VOLAILLE POUR CONTENIR LA GRIPPE AVIAIRE (D'OISEAU)

Un guide pour ceux chargés de surveiller l'abattage de la volaille



Quand il y a une flambée de grippe aviaire (grippe d'oiseau), il y a beaucoup de mesures qui peuvent être prises pour contenir la diffusion du virus. Un de ces mesures c'est l'abattage des oiseaux infectés, des oiseaux qui ont été en contact étroit avec les oiseaux infectés, ainsi que des oiseaux qui sont suspectés d'être infectés.

Si vous participez à des activités d'abattage, ce livret-ci vous fournira quelques renseignements importants que vous devriez connaître.

^{3,4} V. Martin, A. Forman, J. Lubroth, «Préparation pour faire face à la grippe aviaire fortement pathogène. Un manuel pour des pays à risque». 16 février 2006.

