

REPUBLICA DOMINICANA

**ENCUESTA
DEMOGRAFICA
Y
DE
SALUD
1986**

**INFORME
PRELIMINAR**

CONSEJO NACIONAL DE POBLACION Y FAMILIA- CONAPOFA

DEMOGRAPHIC AND HEALTH SURVEYS- DHS
At the Westinghouse
Institute for Resource Development- IRD



1. INTRODUCCION

Este informe preliminar de la Encuesta Demográfica y de Salud (DHS), tiene por objetivo poner rápidamente en manos de las autoridades dominicanas algunos de los resultados más relevantes de esta investigación. Las cifras presentadas permiten tener una visión global de la situación actual del país con respecto a la fecundidad, la planificación familiar y algunos indicadores de salud materno-infantil.

Los datos de este informe son preliminares en el sentido que se pueden producir ligeros cambios en algunas cifras después que los datos de la encuesta hayan sido totalmente corregidos y analizados. Tales cambios, sin embargo, no afectarán mayormente las cifras presentadas aquí.

El informe final y comprensivo de los resultados será publicado en agosto de 1987.

2. METODOLOGIA

La encuesta DHS fue llevada a cabo por el Consejo Nacional de Población y Familia (CONAPOFA); institución con una larga trayectoria en el área de investigaciones de este tipo (1975, 1980, 1983, 1984, 1986). La Agencia Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos proporcionó el financiamiento para la realización del presente estudio; mientras que la asistencia técnica internacional fue ejecutada por el Instituto para el Desarrollo de Recursos de Westinghouse. La encuesta contempló visitar alrededor de 8000 viviendas con el propósito de entrevistar unas 8000 mujeres con edades comprendidas entre 15 y 49 años, de las cuales realmente se pudo lograr entrevistar en forma completa a 7649.

La muestra es representativa de todo el país, no autoponderada, y permite además obtener estimaciones a nivel de cada una de las ocho regiones de salud en que está dividido el país y que son las siguientes:

Región 0	(<u>Distrito Nacional</u>)
Región 1	(Monte Plata, Peravia, <u>San Cristóbal</u>)
Región 2	(Espaillat, La Vega, Monseñor Nouel, Puerto Plata, <u>Santiago</u>)
Región 3	(Duarte, Juan Sánchez Ramírez, María Trinidad Sánchez, Salcedo, <u>Samaná</u>)
Región 4	(Baoruco, <u>Barahona</u> , Independencia, Pedernales)
Región 5	(Hato Mayor, El Seybo, La Altagracia, <u>La Romana</u> , San Pedro de Macoris)
Región 6	(<u>Azua</u> , Elias Piña, San Juan)
Región 7	(Dajabón, <u>Monte Cristi</u> , Santiago Rodríguez, Valverde).

*En las tabulaciones, las mujeres serán identificadas por medio de su número y el nombre de la provincia subrayado.

Las estimaciones a nivel nacional son obtenidas mediante la ponderación de los resultados de cada una de las ocho regiones. El trabajo de campo fue llevado a cabo del 8 de septiembre al 10 de diciembre de 1986 por nueve equipos, compuestos por cuatro entrevistadoras y dos supervisores cada uno.

3. FECUNDIDAD

La República Dominicana ha vivido un marcado descenso en la fecundidad de su población desde mediados de los años 60; habiéndose estimado tasas globales de fecundidad de 7.1, 5.8 y 4.7 para los periodos 1965-69, 1970-74 y 1975-79 respectivamente. Esta tendencia de descenso se ha mantenido con rigor, habiendo alcanzado una tasa global de fecundidad de 3.8 para el periodo 1981-86, según los datos de la presente encuesta (ver Cuadro 1). Esto corresponde aproximadamente a un descenso del 19 por ciento en un periodo de alrededor de cinco años.

CUADRO 1

PROMEDIO DE NIÑOS NACIDOS VIVOS Y SOBREVIVIENTES POR EDAD DE LA MADRE Y TASAS ESPECIFICAS Y GLOBAL DE FECUNDIDAD PARA LOS CINCO AÑOS ANTERIORES A LA ENCUESTA

Edad Actual de la Madre	Número medio de Niños		Tasa Especifica de Fecundidad
	Nacidos Vivos	Sobrevivientes	
15 - 19	0.20	0.18	104
20 - 24	1.05	0.96	211
25 - 29	2.25	2.08	196
30 - 34	3.46	3.12	128
35 - 39	4.61	4.05	80
40 - 44	5.52	4.79	34
45 - 49	7.03	5.98	7
TOTAL	2.40	2.13	-
TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD (TGF)			3.8

Alrededor del 90 por ciento de los nacidos vivos se encontraba con vida en el momento de la encuesta.

Aunque el país no tiene una gran extensión geográfica, se pueden observar marcadas diferencias en la fecundidad por región. Se destacan las regiones 0 y II, en las cuales se ubican el Distrito Nacional y Santiago respectivamente, con una tasa global de 3.3 cada una para los últimos cinco años y que constituyen el valor más bajo de este indicador de la fecundidad (ver Cuadro 2). La fecundidad más alta es observada en la región VI con una tasa global de 5.3, seguida de cerca de la región IV con 4.9. Las restantes regiones tienen una tasa global de fecundidad cercana a 4.

CUADRO 2


TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD (TGF) EN LOS ULTIMOS CINCO ANOS Y PROMEDIO DE NACIDOS VIVOS (NV) EN MUJERES DE 40 - 44 ANOS DE EDAD POR REGION

Región	Tasa Global de Fecundidad(TGF)	Promedio Nacidos Vivos (NV) 40-44
0 (Distrito Nacional)	3.3	4.6
I (San Cristobal)	4.2	6.3
II (Santiago)	3.3	5.2
III (Samaná)	4.4	6.7
IV (Barahona)	4.9	6.7
V (La Romana)	4.2	5.8
VI (Azua)	5.3	7.0
VII (Monte Cristi)	4.0	5.5

41

La comparación por región del promedio de nacidos vivos en mujeres de 40-44 años de edad con la tasa global de fecundidad, permite evaluar indirectamente con qué ritmo ha bajado la fecundidad en cada una de las regiones en el pasado reciente. Son las regiones I, II y III donde la baja ha sido más fuerte, ya que la tasa global de fecundidad constituye solamente alrededor de un 67 por ciento del promedio de nacidos vivos en mujeres de 40-44 años. Para las otras regiones el decremento es menor ya que esta proporción alcanza una cifra cercana al 75 por ciento. Sin embargo, las cifras demuestran claramente que la fecundidad está bajando prácticamente en todas las regiones del país, aunque algunas regiones todavía tienen niveles de fecundidad relativamente elevados (ver Figura 1).

Figura 1. República Dominicana, 1986. Tendencias de la Fecundidad



4. INTENCIONES REPRODUCTIVAS

Del total de mujeres actualmente casadas o unidas el 65 por ciento declaró que no desea tener más hijos; cifra que alcanza un 20 por ciento en las mujeres de 15-19 años, y que sube fuertemente con la edad de la mujer hasta alcanzar casi el 80 por ciento en el grupo de edad 30-34 (ver Cuadro 3). Indudablemente la mayor parte de las mujeres dominicanas de menos de 30 años quieren tener más hijos. Entre las mujeres de 30 años o más que si quieren más hijos la mayoría desea tenerlos pronto y no esperar. En cambio, las mujeres de 15-24 años, demuestran un marcado interés en el espaciamiento del próximo nacimiento cuando éste es deseado.

En síntesis, el 70 por ciento o más de las mujeres actualmente casadas o unidas en cada grupo de edad tienen necesidad de uso de anticonceptivos, ya que no quieren más hijos o desean espaciar el próximo nacimiento.

CUADRO 3

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LAS INTENCIONES REPRODUCTIVAS
POR EDAD DE LA MUJER
MUJERES ACTUALMENTE UNIDAS/CASADAS

Intención Reproductiva	Edad Actual							Todas
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	
No quiere más hijos	21	41	59	76	85	85	91	65
Desea espaciar*	45	33	19	7	1	1	1	16
Quiere hijo pronto**	29	23	19	16	12	10	8	17
No sabe***	5	3	3	1	2	4	0	3
Total	100	100	100	100	100	100	100	100
Número de casos	334	812	846	754	594	435	358	4137

*Quiere esperar por lo menos 2 años antes de tener otro hijo.

**Quiere tener (otro) hijo dentro de 2 años.

***No sabe cuando quiere tener el otro hijo.

6

5. CONOCIMIENTO Y USO DE METODOS ANTICONCEPTIVOS

Como se ve claramente en el Cuadro 4, casi todas las mujeres conocen por lo menos un método anticonceptivo; los métodos más conocidos son: la píldora, el DIU, las inyecciones, el condon, y la esterilización femenina, todos estos métodos son conocidos por más del 70 por ciento de las mujeres (ver Cuadro 4).

Igualmente casi todas las mujeres conocen por lo menos una fuente de suministro de algún método anticonceptivo. Para la píldora, el DIU, el condón y la esterilización femenina tres cuartas partes o más de las mujeres conocen por lo menos una fuente de suministro.

Del total de las mujeres, 49 por ciento ha usado algún método alguna vez; cifra que alcanza 73 por ciento en las mujeres actualmente casadas/unidas. Los métodos de mayor uso fueron la píldora y la esterilización femenina, aunque también el DIU, el condón, el retiro y la abstinencia periódica han sido usados por entre un 9 y 17 por ciento de las mujeres actualmente casadas/unidas.

En cuanto al uso actual, un 50 por ciento de las mujeres actualmente casadas/unidas están usando algún método. De ellas casi el 70 por ciento está usando la esterilización femenina (33 por ciento en el total) y la mayor parte del resto está usando la píldora. La esterilización femenina y la píldora son los únicos métodos importantes en cuanto al uso actual, en tercer lugar aparece con un uso bastante bajo el DIU (solo el tres por ciento de las mujeres casadas).



CUADRO 4

PORCENTAJE DE MUJERES QUE CONOCEN METODOS ANTICONCEPTIVOS ESPECIFICOS, FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE ESTOS METODOS, LOS HAN USADO ALGUNA VEZ Y LOS ESTAN USANDO ACTUALMENTE PARA TODAS LAS MUJERES Y LAS CASADAS UNIDAS


Métodos	Porcentaje que conoce		Porcentaje que conoce fuente de abastecerse		Porcentaje que usó alguna vez		Porcentaje que está usando	
	Todas	Casadas	Todas	Casadas	Todas	Casadas	Todas	Casadas
Píldora	97	98	92	95	31	46	5	9
Implante	31	35	25	29	*	*	*	*
DIU	85	90	77	84	8	12	2	3
Inyección	70	75	61	65	1	2	*	*
Diafragma /Jalea	57	68	53	64	4	7	*	*
Condón	84	88	74	80	11	17	1	1
Esteril. Femenina	97	98	94	96	21	33	21	33
Esteril. Masculina	45	46	39	39	*	*	*	*
Absti. Periódica	50	53	44	47	6	9	1	1
Retiro	54	62	-	-	9	14	1	2
Otros	11	13	-	-	2	3	*	*
Cualquier Método	99	99	98	99	49	73	31	50
Número de Mujeres	7650	4137	7650	4137	7650	4137	7650	4137

*Todos estos métodos son usados por menos de un uno (1) por ciento de las respectivas mujeres. En las mujeres actualmente casadas/unidas hay 6 que usan Norplant, 2 inyecciones, 9 diafragma/jalea, 2 esterilización masculina y 17 que usan otros métodos.

8.

Las diferenciales importantes en el uso de anticonceptivos son pocos. Como es de esperarse, hay menos uso en las mujeres más jóvenes, en las mujeres con pocos hijos, y en las de bajo nivel de educación. También en las regiones IV, V y VI el uso es un poco más bajo que en las demás regiones. En cuanto a métodos específicos se nota la preferencia de las mujeres jóvenes y de baja paridez por métodos temporales, mientras el resto de las mujeres está claramente concentrado en el uso de la esterilización femenina (ver Cuadro 5).

El uso por región está representado en la Figura 2. Se puede observar claramente que en todas las regiones del país la mezcla de métodos usados por las mujeres es muy similar y que en todas las áreas del país domina la esterilización femenina como método anticonceptivo.



CUADRO 5

PORCENTAJE DE MUJERES QUE ESTA USANDO ACTUALMENTE UN METODO ANTICONCEPTIVO
POR METODO Y VARIABLE DE BASE. PARA MUJERES ACTUALMENTE CASADAS/UNIDAS

Variable de Base	Porcentaje total que está usando	Píldora	DIU	Condón	Est. Femenina	Abs. Periódica	Retiro	Otro	No está usando	Total	N
Edad											
Menos de 30	42	14	4	1	18	-	2	3	58	100	2196
30 y ó	59	3	2	2	50	1	1	*	41	100	1940
Hijos Sobrev.											
0 - 2	34	14	4	2	9	2	2	1	66	100	1881
3 - 4	66	6	2	2	53	1	2	*	34	100	1204
5 y ó	61	2	2	1	53	1	2	*	49	100	1052
Area											
Rural	46	7	2	1	32	1	2	1	54	100	1625
Urbana	52	10	3	2	34	2	1	*	48	100	2512
Región											
0	50	8	4	3	31	2	2	*	50	100	1373
I	51	8	2	2	37	1	1	*	49	100	239
II	53	11	3	1	34	1	2	1	47	100	932
III	51	7	2	*	37	2	1	2	49	100	485
IV	46	11	2	*	31	1	1	*	54	100	232
V	45	10	3	*	28	1	2	1	55	100	286
VI	42	6	2	*	29	1	2	2	58	100	360
VII	53	8	1	*	42	*	*	2	47	100	227
Educación											
Ninguna	35	2	1	1	26	1	2	2	65	100	272
Primaria	49	7	2	1	37	1	1	*	51	100	2245
Intermed.	49	10	3	1	31	1	1	2	51	100	518
Secund.	55	16	5	2	25	3	1	3	45	100	728
Univers.	57	12	7	4	27	5	1	1	43	100	305
No sabe	45	3	2	*	38	*	2	*	55	100	67
Total General											
Total General	50	9	3	1	33	1	2	1	50	100	4137

* Menos de un por ciento.

El hecho que la mayoría de las usuarias de anticonceptivos usa la esterilización femenina determina en gran parte la fuente de abastecimiento de los métodos. Como se puede apreciar en el Cuadro 6, más del 80 por ciento de las usuarias de algún método lo obtienen en un hospital público o una clínica privada. Para la píldora tienen también importancia la promotora de salud (16 por ciento) y la farmacia (17 por ciento); para el condón la farmacia (42 por ciento) y para la abstinencia periódica la clínica privada y los amigos/familiares. Sin embargo, los últimos dos métodos son de poco uso como se vió en el Cuadro 5.

CUADRO 6

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE ANTICONCEPTIVOS POR METODO INDIVIDUAL. PARA MUJERES QUE ACTUALMENTE ESTAN USANDO EL METODO RESPECTIVO

Fuente de Abastecimiento	Método					Todos Métodos
	Píldora	DIU	Esteril. Femenina	Condón	Abstin. Periódica	
Hospital Público	40	66	40	32	2	41
Hospital IDSS/FFAA	1	5	4	-	-	3
Profamilia Promotora de Salud	3	2	-	6	2	1
Clínica Privada	16	1	-	5	4	3
	8	21	55	-	23	42
Farmacia Consultorio Médico	17	-	-	42	-	4
Amigos/Familiares	1	1	1	-	9	2
Otros	10	3	-	6	34	3
No sabe	3	1	-	5	26	1
	2	-	-	4	-	-
Total	100	100	100	100	100	100
Número de Usuarías	411	151	1586	57	57	2272

Las razones para dejar de usar un método anticonceptivo fueron muy variadas y difíciles de captar. Se destacan el deseo de embarazarse (8 por ciento) preocupaciones de salud (16 por ciento), sexo infrecuente (10 por ciento) y otras razones (29 por ciento) (ver Cuadro 7). Cabe destacar que el costo del método, accesibilidad y una serie de problemas médicos específicos no fueron mencionados sino por unas pocas de las mujeres como razones para dejar el método.

CUADRO 7

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LAS RAZONES PARA DEJAR DE USAR UN METODO DESDE EL NACIMIENTO DEL ULTIMO NACIDO VIVO, POR EDAD DE LA MUJER. MUJERES QUE NO USAN ACTUALMENTE, PERO DEJARON DE USAR EN EL INTERVALO ABERTO

Razones de Dejar	Edad Actual de la Mujer		Todas las Edades
	Menos de 30	30 y más	
Para Embarazarse	8	9	8
Método Falló	-	1	-
Sangrado Excesivo	3	6	4
Desaprobación/Esposo	3	2	3
Temor al Cáncer	1	-	1
Preocupaciones de Salud	16	16	16
Náuseas/Mareo	6	1	4
Infección Vaginal	4	2	3
Problemas de Peso	4	1	3
Expulsión del DIU	2	-	1
Ardor	-	-	-
Problemas/Estómago	7	4	6
Calambre/Dolor	2	-	1
Sexo Infrecuente	9	12	10
Mancha la Piel	2	2	2
Temor/Olvido	3	1	2
Disminuye Sexualidad	-	1	-
Accesibilidad	1	2	1
Costo	2	1	1
Ineficaz	1	-	-
Infecundidad/Menopausia	-	3	1
Otros	26	34	29
No Sabe	2	3	2
Total	100	100	100
Número de no-usuarias	260	180	440

La mitad de las mujeres actualmente casadas o unidas no están usando anticonceptivos. Algunas de ellas están embarazadas, otras ya no pueden tener más hijos y todavía otras estarán en el proceso de decisión de usar un método, o esterilizarse.

Entre las mujeres que no quieren tener más hijos, todavía un 38 por ciento no está usando ningún método anticonceptivo, cifra que es mayor en las mujeres de menos de 30 años de edad (44) que en las mayores (34). A medida que la mujer tiene un mayor nivel de educación, menor es la proporción que no está usando un método anticonceptivo entre las que no quieren tener más hijos (ver Cuadro 8).

En general el comportamiento de las mujeres dominicanas con respecto a sus deseos de fecundidad no es del todo racional. Las mujeres que desean tener un niño pronto, sin embargo, en gran medida no están usando anticonceptivos.

Las cifras del Cuadro 8 indican que hay todavía una gran demanda para uso de anticonceptivos en todos los sectores del país, si es que las mujeres realmente quieren implementar su deseo reproductivo.

La Figura 3 representa esta situación por las 8 regiones del país, mostrando que por lo menos un tercio de las mujeres que no desean tener un otro hijo, sin embargo, no están usando ningún método anticonceptivo, y dos tercios de las mujeres que quieren esperar por lo menos dos años antes de tener otro hijo.

CUADRO 8

PORCENTAJE DE MUJERES QUE NO ESTAN USANDO ANTICONCEPTIVOS
POR INTENCIONES REPRODUCTIVAS Y VARIABLES DE BASE
MUJERES ACTUALMENTE CASADAS UNIDAS

Variable de Base	Intenciones Reproductivas				Total	N
	No quiere más hijos	Desea esperar*	Quiere Hijo pronto**	No sabe		
Edad						
Menos de 30	44	64	76	82	58	2196
30 y más	34	64	90	85	42	1940
Area						
Rural	42	71	85	88	54	1625
Urbana	35	60	78	79	48	2512
Región						
0 (Distrito Nacional)	38	61	78	67	49	1373
I (San Cristóbal)	37	62	79	-	49	239
II (Santiago)	35	61	74	89	47	932
III (Samaná)	36	64	89	-	49	485
IV (Barahona)	39	71	84	-	54	232
V (La Romana)	46	56	89	-	55	286
VI (Azua)	43	81	89	-	58	360
VII (Monte Cristi)	32	71	88	-	47	227
Educación						
Ninguna	55	81	93	-	64	272
Primaria	40	72	85	4	51	2245
Intermedia	30	68	88	-	51	518
Secundaria	29	55	68	-	45	728
Universitaria	27	47	71	-	43	305
No Sabe	46	-	-	-	55	67
Total General	38	64	81	83	50	4137


*Quiere esperar por lo menos 2 años antes de tener (otro) hijo).

**Quiere (otro) hijo dentro de 2 años.

-Menos de 25 casos.

142

Figura 3. Republica Dominicana, 1986. Porcentaje de mujeres que no usan anticoncepcion segun intencion reproductiva



6. SALUD MATERNO INFANTIL

Para todo el país el 25 por ciento de los niños nacidos vivos en los últimos cinco años tuvieron diarrea por lo menos una vez durante las dos últimas semanas (14 más 11). No se presentan diferencias importantes en esta cifra, oscilando en todos los sub-grupos alrededor de 22 a 28 por ciento (Cuadro 9).

Un poco más de la tercera parte de los niños con episodios de diarrea declarada recibió un paquete de rehidratación oral, variando ésto en forma más notoria por educación de la madre con valores que van desde un 28 por ciento en madres sin educación hasta 46 por ciento en madres con alguna educación universitaria.

15-

CUADRO 9

PORCENTAJE DE TODOS LOS NIÑOS VIVOS NACIDOS EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS QUE HAN TENIDO DIARREA EN LAS ÚLTIMAS 24 HORAS, LAS ÚLTIMAS DOS SEMANAS Y EL PORCENTAJE QUE RECIBIÓ REHIDRATACIÓN ORAL PARA EL ÚLTIMO EPISODIO DE DIARREA, POR VARIABLES DE BASE

Variable de Base	De Todos los Niños		
	Diarrea las últimas 24 horas	Diarrea las últimas dos semanas	Recibió rehidratación oral para último episodio de diarrea
<u>Edad</u>			
Menos de 30	15	12	37
30 y más	11	11	39
<u>Area</u>			
Rural	13	11	35
Urbana	14	12	39
<u>Región</u>			
0 (Distrito Nacional)	14	12	39
I (San Cristóbal)	11	11	34
II (Santiago)	15	12	47
III (Samaná)	16	12	30
IV (Barahona)	12	11	32
V (La Romana)	13	9	33
VI (Azua)	13	9	33
VII (Monte Cristi)	8	16	33
<u>Educación</u>			
Ninguna	14	7	21
Primaria	14	12	39
Intermedia	15	13	31
Secundaria	13	13	41
Universitaria	8	7	46
No sabe	10	12	36
Total General	14	11	38

La vacunación de los niños en la República Dominicana no está bien documentada. Solo un 14 por ciento de los niños nacidos en los últimos cinco años tenían una tarjeta de salud donde se anotan las vacunas. En la región 0 y en mujeres con educación secundaria o más esta cifra alcanza de un 20 a 30 por ciento (ver Cuadro 10).

En los niños con tarjeta de salud, menos de la mitad ha recibido un ciclo completo de vacunas y la vacunación contra el sarampión es particularmente baja, como así también las segundas y terceras dosis de DPT y Polio.

Ultimamente se han llevado a cabo en el país una serie de campañas de vacunación y por esto la situación efectiva debe ser mejor que la descrita en el Cuadro 10. Sin embargo, las madres no reciben tarjetas de vacunas durante estas campañas y por consiguiente es bien posible que no completen el ciclo necesario de vacunas, ni tampoco se puede verificar si las vacunas y revacunas fueron dadas oportunamente.

CUADRO 10

PORCENTAJE DE TODOS LOS NIÑOS DE 1 AÑO O MÁS DE EDAD . .
 QUE TIENEN UNA TARJETA DE VACUNAR Y TIPO DE VACUNA
 RECIBIDA SEGUN LA TARJETA. POR VARIABLE DE BASE,
 SOLO PARA NIÑOS NACIDOS DESDE ENERO 1980

Variable de Base	Todos niños vivos de 1 año o más								
	Tiene Tarjeta	BGC	D P T			P O L I O			Sarampión
			1	2	3	1	2	3	
<u>Edad</u>									
Menos de 30	14	7	12	9	6	12	7	5	3
30 y más	14	7	11	10	7	12	9	5	5
<u>Area</u>									
Rural	10	4	8	6	4	8	4	3	2
Urbana	17	10	15	13	8	15	10	6	4
<u>Región</u>									
0 (Distr. Nacional)	20	11	18	15	9	18	10	5	4
I (San Cristóbal)	15	8	11	9	5	11	9	7	3
II (Santiago)	17	10	15	12	8	14	11	7	5
III (Samaná)	4	1	4	3	2	3	3	2	0
IV (Barahona)	5	1	5	3	2	5	4	2	1
V (La Romana)	15	5	8	6	5	8	5	5	1
VI (Azua)	8	5	6	4	3	6	4	3	1
VII (Monte Cristi)	10	6	9	7	6	9	7	4	4
<u>Educación</u>									
Ninguna	3	1	2	1	1	3	1	1	0
Primaria	10	6	8	6	4	8	5	3	2
Intermedia	17	7	15	12	7	13	8	5	4
Secundaria	20	11	19	16	11	19	13	8	5
Universitaria	31	19	28	26	19	30	21	12	10
No sabe	12	2	10	10	2	5	5	2	4
Total General	14	7	12	10	6	12	8	5	3

La atención a la madre durante el embarazo y el parto ha llegado a niveles muy altos. Alrededor de un 90 por ciento o más de las madres recibieron vacunas contra tétanos, controlaron su embarazo por medio de personal médico calificado y recibieron asistencia al parto de personal especializado en el área médica.

Esta situación es bastante uniforme en todo el país por lo que no se observan grandes diferencias a nivel regional. Los niveles más bajos se presentan en las mujeres sin educación. En sentido general estas cifras demuestran claramente que el programa de atención a la madre está llegando a todos los rincones del país.

CUADRO 11

PORCENTAJE DE TODOS LOS NACIMIENTOS EN LOS ULTIMOS CINCO ANOS CUYAS MADRES RECIBIERON INYECCION CONTRA EL TETANOS, ATENCION PRENATAL DE UN MEDICO O PARTERA CALIFICADA, Y ASISTENCIA AL ALUMBRAMIENTO DE PARTE DE UN MEDICO O PARTERA CALIFICADA; POR VARIABLES DE BASE

Variable de Base	Tétanos	Asistencia Prenatal	Asistencia al Alumbramiento
Edad			
Menos de 30	88	96	91
30 y más	85	93	86
Area			
Rural	86	93	83
Urbana	89	96	95
Región			
0 (Distrito Nacional)	84	95	97
I (San Cristóbal)	92	97	93
II (Santiago)	90	97	91
III (Samaná)	87	97	86
IV (Barahona)	87	93	81
V (La Romana)	87	93	87
VI (Azua)	90	89	76
VII (Monte Cristi)	92	98	88
Educación			
Ninguna	77	84	74
Primaria	86	94	87
Intermedia	91	96	96
Secundaria	92	99	98
Universitaria	93	100	99
No sabe	81	86	81
Total General	87	95	90

20'

INDICE

1.	INTRODUCCION.....	1
2.	METODOLOGIA.....	2
3.	FECUNDIDAD.....	3
4.	INTENCIONES REPRODUCTIVAS.....	7
5.	CONOCIMIENTO Y USO DE METODOS ANTICONCEPTIVOS.....	9
6.	SALUD MATERNO INFANTIL.....	20

21