

República de El Salvador, C.A.

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD FAMILIAR: 1998

FESAL-98

INFORME PRELIMINAR

MUNICIPALIDADES SOSTENIBLES

Asociación Demográfica Salvadoreña
Centers for Disease Control and Prevention

En colaboracion con

- Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
- Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social
- Ministerio de Relaciones Exteriores
- Instituto Salvadoreño del Seguro Social
- Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
- Fondo de Poblacion de las Naciones Unidas
- Organizacion Panamericana de la Salud/Instituto de Nutricion de Centroamerica y Panama
- Direccion General de Estadistica y Censos
- Proyecto de Salud Materno Infantil

Financiado por

- Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional

Con la Participacion de

- Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
- Organizacion Panamericana de la Salud/Instituto de Nutricion de Centroamerica y Panama

marzo de 1999

Tabla 1 1

Resultado de las visitas y entrevistas, por municipio seleccionado

<u>Resultado para viviendas</u>	Total (pais)	Municipio			
		San Francisco <u>Menendez</u>	<u>Berlin</u>	<u>Jiquilisco</u>	<u>Corinto</u>
Con elegible identificada *	65 1	66 4	66 1	62 4	68 0
Sin elegible	19 9	20 8	24 3	25 3	17 2
Vivienda desocupada	103 91	7 6	11 1	11 5	
Moradores ausentes	2 2	2 1	0 5	0 8	0 8
Rechazo	2 5	1 6	1 5	0 4	2 5
Total	100 0	100 0	100 0	100 0	100 0
No de vivienda	(20,760)	(750)	(750)	(750)	(750)
<u>Resultado para mujeres elegibles</u>					
Entrevista completa	93 5	93 2	96 8	97 2	95 7
Entrevista incompleta	0 0 0 0	0 0	0 0	0 2	
Seleccionada ausente	5 0 5 0	1 6	2 1	1 2	
Rechazo individual	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Otro	1 4	1 8	1 6	0 6	2 9
Total	100 0	100 0	100 0	100 0	100 0
No de elegibles	(13,512)	(498)	(496)	(468)	(510)

* Incluye mujeres en edad fértil (MEF) con entrevistas completas, entrevistas incompletas seleccionada ausente, rechazo individual y otras razones personales de la MEF seleccionada

Tabla 2 2

Tasa global de fecundidad (TGF), según municipio seleccionado
para el periodo 1993 - 1998 *

<u>Municipio</u>	<u>TGF</u>	<u>No de mujeres</u> <u>(No ponderado)</u>
Total (pais)	3 58	(12,634)
<u>Municipio</u>		
San Francisco Menendez	4 98	(464)
Berlin	4 39	(480)
Jiquilisco	3 56	(455)
Corinto	5 60	(488)

* Comprende de marzo de 1993 a febrero de 1998

Tabla 3 3

Uso actual de métodos anticonceptivos, por residencia, según municipio seleccionado
Mujeres casadas/unidas de 15 a 44 años de edad

<u>Municipio</u>	<u>Total</u>		<u>Residencia</u>			
			<u>Urbana</u>		<u>Rural</u>	
Total (país)	59 8	(7,452)	67 8	(3,327)	51 3	(4 125)
San Francisco Menendez	40 3	(292)	*	(15)	39 3	(277)
Berlín	43 3	(297)	51 3	(126)	37 5	(171)
Jiquilisco	59 5	(272)	53 9	(64)	61 5	(208)
Corinto	25 6	(273)	37 1	(49)	23 0	(224)

* Menos de 25 casos

NOTA Las cifras entre parentesis son los numeros de casos no ponderados

Tabla 3 4

Uso actual de metodos anticonceptivos y metodo que usa segun municipio seleccionado
Mujeres casadas/unidas de 15 a 44 años de edad

<u>Municipio</u>	Uso actual y método anticonceptivo									<u>No usa actualmente</u>	<u>Total</u>	<u>No de casos (No ponderado)</u>
	<u>Usa actualmente</u>	<u>Esterilizacion femenina</u>	<u>Inyeccion</u>	<u>Orales</u>	<u>Ritmo/ Billings</u>	<u>Retiro</u>	<u>Condón</u>	<u>DIU</u>	<u>Otros *</u>			
Total (pais)	59 8	32 5	8 9	8 1	3 0	2 6	2 5	1 5	0 7	40 2	100 0	(7 452)
San Francisco Menendez	40 3	18 2	9 5	7 6	2 5	0 0	1 4	0 0	1 1	59 7	100 0	(292)
Berlin	43 3	21 7	7 2	7 0	2 4	2 9	2 1	0 0	0 0	56 7	100 0	(297)
Jiquilisco	59 5	36 7	8 5	5 3	1 8	1 8	3 5	1 5	0 6	40 5	100 0	(272)
Corinto	25 6	18 2	2 1	1 8	0 6	1 8	1 2	0 0	0 0	74 4	100 0	(273)

* Incluye vasectomia, norplant, vaginales y metodo de lactancia amenorrea

Tabla 3 7

Fuente de metodos anticonceptivos, segun municipio seleccionado
Mujeres casadas/unidas de 15 a 44 años de edad que usan anticonceptivos

<u>Municipio</u>	Fuente								<u>Total</u>	<u>No de casos (No ponderado)</u>
	<u>MSPAS</u>	<u>ISSS</u>	<u>ADS</u>	<u>Farmacia</u>	<u>La Pareja</u>	<u>Clinica/ Medico privado</u>	<u>Otras *</u>	<u>No Sabe</u>		
Total (pais)	47 1	18 3	15 5	6 7	4 0	3 3	4 7	0 5	100 0	(4,111) **
San Francisco Menendez	63 2	3 5	11 1	11 1	0 7	2 1	7 6	0 7	100 0	(116)
Berlín	47 5	3 7	29 0	4 9	5 6	1 2	7 4	0 6	100 0	(137)
Jiquilisco	61 6	6 4	12 3	8 4	4 4	2 5	2 5	2 0	100 0	(161)
Corinto	56 3	1 2	26 4	6 9	5 7	0 0	2 3	1 2	100 0	(65)

* Incluye la iglesia, instituciones educativas y amigos/parientes, entre otros

** Se excluye 1 caso que no reporto la fuente donde obtiene el metodo

Tabla 3 0

Razon para no usar metodos anticonceptivos por municipio seleccionado
Mujeres casadas/unidas de 15 a 44 años de edad que no usan anticonceptivos

Municipio	Razón para no usar													Sub- total	Total	No de casos (No ponderado)
	Razones relacionadas con embarazo fertilidad o actividad sexual						Razones no relacionadas									
	Embarazada actualmente	Postparto/ Amamantando	Menopausia/ Subfecundidad/ Operada	Desco de embarazo	Inactividad sexual	Sub total	Miedo a efectos colaterales	Tuvo efectos colaterales	Companero se o pone	Razones religiosas	Otras razones *	No sabe/ No responde				
Total (pais)	23 2	16 9	9 6	8 0	7 5	65 2	12 2	2 2	5 0	2 7	11 5	1 1	33 6	100 0	(3 340)	
San Francisco Menendez	20 7	21 6	16 0	2 8	4 7	65 7	13 1	2 8	4 2	6 1	7 5	0 5	33 8	100 0	(176)	
Berlin	19 8	22 6	5 2	9 4	4 7	61 8	19 8	2 8	5 2	3 3	5 7	1 4	36 8	100 0	(160)	
Jiquilisco	27 5	19 6	9 4	10 1	5 1	71 7	10 9	5 8	0 7	1 4	9 4	0 0	28 3	100 0	(111)	
Corinto	18 2	27 3	6 7	2 4	14 2	68 8	10 7	0 4	7 9	1 6	9 1	1 6	29 6	100 0	(208)	

* Incluye fatalismo/no le gusta, falta de información, descuido, falta de recursos economicos y otras razones no especificadas

Tabla 3 10

Deseo de usar métodos anticonceptivos en el presente o el futuro, según municipio seleccionado
Mujeres casadas/unidas de 15 a 44 años de edad que no usan anticonceptivos y
no reportaron problemas de fertilidad

<u>Municipio</u>	<u>Porcentaje que desea usar anticonceptivos</u>		<u>Porcentaje de las que desean usar, que conoce fuente</u>	
Total (país)	52.3	(3,046)	89.4	(1,444)
San Francisco Menendez	43.0	(150)	84.4	(67)
Berlín	45.8	(152)	82.6	(72)
Jiquilisco	50.4	(100)	93.7	(48)
Corinto	30.9	(193)	78.1	(65)

NOTA Las cifras entre paréntesis son los números de casos no ponderados

Tabla 3 11

Poblacion blanco no cubierta con servicios de planificacion familiar, de acuerdo con el criterio de necesidad de servicios,*
segun municipio seleccionado mujeres de 15 a 44 años de edad

<u>Municipio</u>	<u>Subtotal necesitan</u>	No necesitan					<u>Subtotal No necesitan</u>	<u>Total</u>	<u>No de casos (No ponderado)</u>
		<u>Inactividad sexual</u>	<u>Usa anticonceptivos</u>	<u>Embarazada actualmente</u>	<u>Desea embarazo</u>	<u>Menop /Subfertil/ Operada</u>			
Total (pais)	83	416	383	59	40	20	917	1000	(11687)
San Francisco Menendez	145	417	269	83	39	48	855	1000	(421)
Berlin	151	387	308	83	50	21	849	1000	(449)
Jiquilisco	72	368	431	77	38	14	928	1000	(403)
Corinto	164	533	170	75	36	22	836	1000	(444)

* Se definen como mujeres que necesitan los servicios de planificación familiar las que No reportaron subfertilidad, no están embarazadas no desean un embarazo en este momento, son activas sexualmente y no estan usando un método anticonceptivo

Tabla 5 1

Uso del examen de detección precoz del cáncer cervicouterino, según municipio seleccionado
Mujeres de 15 a 49 años de edad, que han tenido al menos una relación sexual

<u>Municipio</u>	Recibió examen			
	<u>Último año</u>	<u>Últimos 2 años</u>	<u>Alguna vez</u>	<u>No de casos (No ponderado)</u>
Total (país)	47 3	65 1	79 2	(10 334)
San Francisco Menendez	32 8	43 2	54 2	(391)
Berlín	29 1	46 5	62 3	(395)
Jiquilisco	47 8	61 1	78 9	(393)
Corinto	45 3	57 5	69 0	(395)

Tabla 5 2

Indicadores del uso del control prenatal, según municipio seleccionado
Nacidos(as) vivos(as) de marzo de 1993 a febrero de 1998

Municipio	Tuvo control	No de casos * (No ponderado)	Trimestre de embarazo al primer control				No de controles recibidos					No de casos ** (No ponderado)
			Total	Primero	Segundo	Tercero	1 - 3	4 - 6	7 - 9	10 o más	No sabe/ No recuerda	
Total (país)	76 0	(8,481)	100 0	75 2	22 6	2 2	12 2	46 1	39 0	2 1	0 6	(6,390)
San Francisco Menendez	64 7	(384)	100 0	72 9	23 2	3 9	16 7	48 7	33 7	1 0	0 0	(250)
Berlín	75 6	(341)	100 0	59 3	35 3	5 4	20 1	53 0	24 9	2 1	0 0	(264)
Jiquilisco	73 3	(283)	100 0	69 7	26 6	3 7	13 9	46 3	39 8	0 0	0 0	(207)
Corinto	62 0	(423)	100 0	59 0	33 6	7 3	22 0	50 2	26 6	0 0	0 0	(262)

* Corresponde a los nacidos vivos en el periodo de referencia, excluyendo 7 casos para el total que no reportaron si recibieron control

** Corresponde a los casos que utilizaron el control

Tabla 5 4

Recepcion de toxoide tetanico, segun municipio seleccionado
Nacidos(as) vivos(as) de marzo de 1993 a febrero de 1998

<u>Municipio</u>	<u>Porcentaje que recibio toxoide</u>	<u>No de casos (No ponderado)</u>
Total (pais)	89 6	(8,481) *
San Francisco Menendez	88 4	(384)
Berlin	87 6	(341)
Jiquilisco	88 3	(283)
Corinto	81 2	(423)

* Se excluyen 7 casos que no reportaron si recibieron toxoide

Tabla 5 5

Lugar de atención del parto, según municipio seleccionado
Nacidos(as) vivos(as) de marzo de 1993 a febrero de 1998

<u>Municipio</u>	<u>Atención intrahospitalaria</u>				<u>Atención extrahospitalaria</u>					<u>Total</u>	<u>No de casos (No ponderado)</u>
	<u>MSPAS</u>	<u>ISSS</u>	<u>Hospital privado</u>	<u>Subtotal</u>	<u>Casa con partera</u>	<u>Casa con otros</u>	<u>Casa con nadie</u>	<u>Otro</u>	<u>Subtotal</u>		
Total (país)	43 3	11 7	3 0	58 0	32 4	3 1	5 2	1 3	42 0	100 0	(8,481) *
San Francisco Menendez	19 0	1 1	0 4	20 5	67 6	4 6	6 5	0 4	79 5	100 0	(384)
Berlín	27 6	4 7	2 0	34 4	51 8	4 7	8 8	0 2	65 6	100 0	(341)
Jiquilisco	54 9	6 6	0 6	62 2	33 3	1 5	2 4	0 6	37 8	100 0	(283)
Corinto	9 5	0 2	0 2	9 9	83 3	2 3	4 6	0 0	90 1	100 0	(423)

* Se excluyen 7 casos que no reportaron el lugar de atención del parto

Tabla 5 7

Indicadores del uso del control postparto, según municipio seleccionado
Partos de nacidos(as) vivos(as) de marzo de 1993 a febrero de 1998

Municipio	Tuvo control	No de casos * (No ponderado)	Meses al primer control				Lugar del control				Total	No de casos ** (No ponderado)
			Menos de 1	1	2	3 ó más	Establecimiento MSPAS	Establecimiento ISSS	Hospital/ Clínica privada	Otro		
Total (país)	44 7	(5,070)	23 1	65 2	6 2	5 5	67 2	20 1	11 2	1 5	100 0	(2,249)
San Francisco Menendez	35 0	(208)	41 4	41 4	8 3	8 9	87 3	0 6	8 3	3 8	100 0	(74)
Berlín	41 2	(194)	47 4	42 7	1 7	8 2	88 9	3 5	7 6	0 0	100 0	(83)
Jiquilisco	29 4	(168)	32 6	63 0	2 2	2 2	81 5	9 8	8 7	0 0	100 0	(52)
Corinto	20 3	(238)	25 7	59 0	12 4	2 9	98 1	0 0	1 9	0 0	100 0	(49)

*/ Corresponde a los nacidos vivos en el periodo de referencia, seleccionados en forma aleatoria, excluyendo 1 caso para el total que no reportó si recibió el control

**/ Corresponde a los casos que utilizaron el control excluyendo 1 caso que no reportó el mes ni el lugar del primer control

Tabla 7 1

Niños que fueron amamantados, según municipio seleccionado
Últimos nacidos(as) vivos(as) en los 5 años previos a la entrevista

<u>Municipio</u>	<u>Amamantados</u>	No de casos <u>(No ponderado)</u>
Total (país)	94 0	(5,715)
San Francisco Menendez	95 4	(241)
Berlín	93 7	(228)
Jiquilisco	96 5	(194)
Corinto	94 0	(261)

Tabla 7 4

Indicador antropométrico talla por edad, según municipio seleccionado
Niños(as) de 3 a 59 meses de edad

<u>Municipio</u>	Desviaciones estandares de la referencia mediana *				<u>Total</u>	<u>No de casos (No ponderado)</u>
	<u>Total <-2 00</u>	<u><-3 00</u>	<u>-2 00 a -2 99</u>	<u>>-2 00</u>		
Total (pais)	23 3	5 7	17 6	76 7	100 0	(6,522)
San Francisco Menendez	28 1	5 9	22 2	71 9	100 0	(293)
Berlin	23 3	4 7	18 6	76 7	100 0	(261)
Jiquilisco	17 5	5 2	12 3	82 5	100 0	(230)
Corinto	32 6	7 7	24 9	67 4	100 0	(323)

* Usando NCHS/CDC/OMS como referencia internacional

Tabla 7 5

Indicador antropometrico peso por talla, segun municipio seleccionado
Niños(as) de 3 a 59 meses de edad

<u>Municipio</u>	Desviaciones estándares de la referencia mediana *				<u>Total</u>	<u>No de casos (No ponderado)</u>
	<u>Total < 2 00</u>	<u><-3 00</u>	<u>-2 00 a -2 99</u>	<u>>-2 00</u>		
Total (pais)	1 1	0 1	1 0	98 9	100 0	(6,522)
San Francisco Menendez	3 2	0 0	3 2	96 8	100 0	(293)
Berlin	2 1	0 6	1 5	97 9	100 0	(261)
Jiquilisco	3 7	0 7	3 0	96 3	100 0	(230)
Corinto	1 0	0 0	1 0	99 0	100 0	(323)

* Usando NCHS/CDC/OMS como referencia internacional

Tabla 7 6

Indicador antropométrico peso por edad, según municipio seleccionado
Niños(as) de 3 a 59 meses de edad

<u>Municipio</u>	<u>Desviaciones estándares de la referencia mediana *</u>				<u>Total</u>	<u>No de casos (No ponderado)</u>
	<u>Total < 2 00</u>	<u><-3 00</u>	<u>-2 00 a -2 99</u>	<u>>-2 00</u>		
Total (país)	11 1	0 8	10 9	88 3	100 0	(6,522)
San Francisco Menendez	18 4	2 4	15 9	81 6	100 0	(293)
Berlín	8 0	0 0	8 0	92 0	100 0	(261)
Jiquilisco	12 3	0 7	11 6	87 7	100 0	(230)
Corinto	13 8	0 7	13 1	86 2	100 0	(323)

* Usando NCHS/CDC/OMS como referencia internacional

Tabla 7 7

Nivel de anemia, según municipio seleccionado
Niños(as) de 12 a 59 meses de edad

<u>Municipio</u>	<u>Nivel de anemia</u>	<u>No de casos (No ponderado)</u>
<u>Total (pais)</u>	30 5	(5,078)
San Francisco Menendez	36 3	(238)
Berlin	30 5	(190)
Jiquilisco	31 9	(186)
Corinto	22 1	(243)

Tabla 7 8

Nivel de retinol, según municipio seleccionado
Niños(as) de 12 a 59 meses de edad

<u>Municipio</u>	<u>Nivel de retinol (µg/dl)*</u>			<u>No de casos (No ponderado)</u>
	<u>< 20</u>	<u>20 - 29 9</u>	<u>> = 30</u>	
Total (pais)	3 8	44 2	52 0	(4,808)
San Francisco Menendez	4 5	39 1	56 4	(211)
Berún	0 9	32 3	66 8	(173)
Jiquilisco	3 5	48 0	48 5	(174)
Corinto	1 7	29 4	68 9	(232)

* µg/dl = microgramos por decilitros

Tabla 7 9

**Nivel de anemia, según municipio seleccionado
Madres de niños de 3 a 59 meses de edad**

<u>Municipio</u>	<u>Nivel de anemia</u>	<u>No de casos (No ponderado)</u>
Total (país)	16 3	(4,562)
San Francisco Menendez	14 7	(195)
Berlín	8 0	(170)
Jiquisno	24 6	(168)
Corinto	12 6	(204)

Tabla 7 10

Nivel de retinol, según municipio seleccionado
Madres de niños de 3 a 59 meses de edad

<u>Municipio</u>	<u>Nivel de retinol (µg/dl) *</u>			<u>No de casos (No ponderado)</u>
	<u>< 20</u>	<u>20 - 29 9</u>	<u>> = 30</u>	
<u>Total (pais)</u>	0 9	14 1	85 0	(4,496)
San Francisco Menendez	1 2	14 3	84 5	(190)
Berlin	0 0	8 9	91 1	(169)
J quilisco	0 5	12 7	86 8	(166)
Corinto	0 0	8 2	91 8	(202)

* µg/dl= microgramos por decilitros

Tabla 8 1

Prevalencia de diarrea e infecciones respiratorias, segun municipio seleccionado
Niños(as) menores de 5 años de edad que viven con la entrevistada

<u>Municipio</u>	Prevalencia de <u>diarrea</u>	Prevalencia de <u>infecciones respiratorias</u>	No de casos <u>(No ponderado)</u>
Total (pais)	19 9	32 9	(5,149)
San Francisco Menendez	15 8	40 4	(213)
Berlin	31 9	41 4	(210)
Jiquilisco	21 0	25 4	(173)
Corinto	20 2	29 9	(234)

Tabla 8 5

Inmunización completa con BCG, DPT, Polio o Sarampión o las cuatro vacunas, según municipio seleccionado
Niños(as) menores de 5 años de edad con o sin carné de vacunación que viven con la entrevistada

<u>Municipio</u>	<u>BCG *</u>	<u>DPT **</u>	<u>Polio **</u>	<u>Sarampión */***</u>	<u>Todas ***</u>
Total (casos)	94 8 (5,149)	85 1 (4,610)	85 1 (4,610)	86 5 (4,356)	78 6 (4 356)
San Francisco Menendez	96 4 (213)	89 6 (193)	88 6 (193)	90 8 (181)	81 8 (181)
Berlín	85 8 (210)	75 0 (188)	75 0 (188)	69 5 (178)	63 8 (178)
Jiquilisco	96 8 (173)	81 4 (159)	81 0 (159)	84 0 (148)	76 7 (148)
Corinto	82 0 (234)	78 8 (216)	78 4 (216)	78 7 (208)	65 4 (208)

* Se considera inmunización completa con una dosis

** Excluye niños de 0 - 5 meses de edad y se considera inmunización completa con la tercera dosis

*** Excluye niños de 0 - 8 meses de edad

NOTA. Las cifras entre parentesis son los numeros de casos no ponderados

Tabla 8 6

Inmunización completa con BCG, DPT, Polio, o Sarampión o las cuatro vacunas,
según carne, por municipio seleccionado
Niños(as) menores de 5 años de edad, para quienes mostraron carne de vacunación

<u>Municipio</u>	<u>BCG *</u>	<u>DPT **</u>	<u>Polio **</u>	<u>Sarampion */***</u>	<u>Todas ***</u>
Total (país)	88 0 (3 235)	91 0 (2,877)	90 8 (2,877)	89 9 (2,688)	77 3 (2,688)
San Francisco Menendez	90 6 (153)	98 0 (138)	98 0 (138)	92 4 (129)	84 1 (129)
Berlin	93 0 (110)	90 7 (100)	88 9 (100)	80 2 (97)	72 6 (97)
Jiquilisco	98 4 (105)	85 9 (97)	85 9 (97)	95 1 (89)	85 8 (89)
Corinto	85 3 (153)	88 8 (140)	88 1 (140)	87 8 (133)	71 7 (133)

* Se considera inmunización completa con una dosis

** Excluye niños de 0 - 5 meses de edad y se considera inmunización completa con la tercera dosis

*** Excluye niños de 0 - 8 meses de edad

NOTA Las cifras entre parentesis son los numeros de casos no ponderados

Tabla 8 7

Indicadores del uso del control del niño, según municipio seleccionado
Nacidos(as) vivos(as) desde marzo de 1993 a febrero de 1998

Municipio	Indicadores											
	Tuvo control	No de casos * (No ponderado)	Edad al primer control (meses)				Lugar del control				Total	No de casos ** (No ponderado)
			Menos de 1	1	2	3 ó más	MSPAS	Hospital ISSS	Privado	Otro		
Total (país)	91 5	(5,071)	36 3	46 7	11 5	5 5	80 4	12 9	5 7	1 0	100 0	(4,690)
San Francisco Menendez	84 4	(208)	52 9	32 0	8 2	6 9	96 0	0 8	1 6	1 6	100 0	(178)
Berlín	85 8	(194)	44 4	37 9	11 0	6 7	94 4	3 4	2 2	0 0	100 0	(169)
Jiquilisco	93 6	(168)	38 9	39 6	16 0	5 5	86 0	8 2	5 5	0 3	100 0	(157)
Corinto	82 2	(238)	22 6	37 7	23 1	16 5	97 6	0 0	0 9	1 4	100 0	(202)

* Corresponde a los nacidos vivos en el periodo de referencia, seleccionados en forma aleatoria

** Corresponde a los casos que utilizaron el control

Tabla 9 4

Conocimiento de las vias documentadas del contagio del SIDA segun municipio seleccionado
Mujeres de 15 a 49 años de edad que han oido hablar del SIDA

<u>Municipio</u>	<u>Vias documentadas de contagio</u>							<u>No de casos (No ponderado)</u>
	<u>Relaciones sexuales</u>		<u>Al usar jeringas va usadas</u>	<u>Al recibir sangre</u>	<u>Niño nacido de madre con SIDA</u>	<u>Al dar pecho madre con SIDA</u>		
	<u>Hombre con mujer</u>	<u>Hombre con hombre</u>						
Total (pais)	98.2	96.9	97.4	96.7	96.1	91.7	(11.281)	
San Francisco Menendez	98.5	93.5	96.7	95.7	95.5	93.1	(417)	
Berlin	98.2	96.2	96.8	95.9	95.9	94.2	(438)	
Jiquilisco	99.3	98.6	98.7	98.7	98.4	95.9	(397)	
Corinto	99.1	97.1	95.7	96.0	95.7	96.6	(310)	

Tabla 9 1

Conocimiento de la existencia del SIDA segun municipio seleccionado
Mujeres de 15 a 49 años de edad

Municipio	Han oído hablar del SIDA			No de casos (No ponderado)
	Total	Espontáneo	Dirigido	
Total (pars)	90 8	47 6	43 3	(12 633)
San Francisco Menéndez	89 5	41 0	48 5	(464)
Berlin	91 7	44 6	47 1	(480)
Iquihisco	88 6	46 8	41 8	(455)
Corinto	63 3	25 0	38 3	(488)

Tabla 9 2

Indicadores del conocimiento del SIDA y percepcion del riesgo de contraerlo, segun municipio seleccionado
Mujeres de 15 a 49 años de edad que han oido hablar del SIDA

<u>Municipio</u>	Porcentaje de mujeres que creen que			<u>No de casos (No ponderado)</u>
	<u>Una persona Puede estar contagiada sin presentar sintomas</u>	<u>Existe curacion para el SIDA</u>	<u>Ella tiene algun riesgo de contraerlo</u>	
Total (pais)	75 6	14 6	28 2	(11,281)
San Francisco Menendez	67 2	21 1	20 4	(417)
Berlin	73 8	17 5	30 4	(438)
Jiquilisco	64 9	15 9	20 8	(397)
Corinto	60 0	14 8	20 2	(310)

Tabla 9 3

Conocimiento de dos o mas mecanismos para evitar el SIDA, segun municipio seleccionado
Mujeres de 15 a 49 años de edad que han oido hablar del SIDA

Municipio	Menciona dos o mas mecanismos	No de casos * (No ponderado)
Total (pais)	48 3	(11,280)
San Francisco Menendez	49 6	(417)
Berlin	43 4	(438)
Jiquilisco	48 8	(397)
Corinto	37 1	(310)

* Se excluye 1 caso para el total que no informo sobre el conocimiento de mecanismos para evitar el SIDA